

### ALGEBRA 1, Lista 3

Konwersatorium 23.10.2017 i Ćwiczenia 25.10.2017.

0S. Materiał teoretyczny: rząd elementu grupy, podgrupa generowana przez podzbiór lub element grupy. Grupa cykliczna: definicja i klasyfikacja z dokładnością do izomorfizmu. Mnożenie permutacji w postaci dwuwierszowej i w postaci iloczynu cykli. Permutacja odwrotna. Rozkład permutacji na cykle rozłączne. Inwersja w permutacji i transpozycja. Permutacje parzyste i nieparzyste. Znak permutacji.

1S. Dana jest grupa  $G$ .

(a) Załóżmy, że  $a \in G$  i  $aa = a$ . Udowodnić, że  $a = e$ .

(b) Załóżmy, że  $a, b \in G$  i  $ab = e$ . Dowieść, że wtedy  $ba = e$  (więc  $b = a^{-1}$ ).

2S. Niech  $k \in \mathbb{N}, k > 1$  i  $k\mathbb{Z} = \{kn : n \in \mathbb{Z}\}$ . Udowodnić, że:

(a) zbiór  $k\mathbb{Z}$  jest podgrupą grupy  $(\mathbb{Z}, +)$ ;

(b)  $(k\mathbb{Z}, +) \cong (\mathbb{Z}, +)$ .

3S. Rozłożyć permutację  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 6 & 7 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$  na iloczyn cykli rozłącznych. Jaki jest znak tej permutacji? Zapisać permutację  $\sigma^{-1}$  w postaci tabularycznej i jako iloczyn cykli rozłącznych.

4. Wyznaczyć rzędy następujących permutacji z  $S_{10}$ :

(1)S  $(1, 2)(4, 5, 6, 7)$ .

(2)S  $(1, 2, 3)(4, 5, 6, 7)$

(3)K  $\alpha \circ \beta$ , gdzie  $\alpha, \beta \in S_{20}$ ,  $\alpha$  to cykl długości  $k$ , zaś  $\beta$  to cykl długości  $l$  oraz cykle te są rozłączne.

5K. Załóżmy, że  $f : G \rightarrow H$  jest izomorfizmem grup i  $g \in G$ . Udowodnić, że

$$\text{ord}_G(g) = \text{ord}_H(f(g)).$$

6K. Piętnastka to następująca układanka: w ramce z miejscami na 16 kostek umieszczone jest 15 kostek z liczbami od 1 do 15, jedno miejsce pozostaje wolne. W pojedynczym ruchu można przesuwać poziomo lub pionowo kostkę na wolne miejsce, z miejsca sąsiedniego. Udowodnić, że w ten sposób z układu:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

nie można w żadnej liczbie ruchów przejść do układu:

	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

7. Załóżmy, że  $H$  jest nietrywialną podgrupą grupy  $(\mathbb{Z}, +)$ .

(a) Udowodnić, że istnieje liczba dodatnia, która należy do  $H$ .

- (b) Niech  $k$  będzie najmniejszą liczbą dodatnią należącą do  $H$ . Udowodnić, że  $k\mathbb{Z} \subseteq H$ .  
Udowodnić, że  $k\mathbb{Z} = H$ .

Wynioskować stąd, że każda podgrupa grupy  $(\mathbb{Z}, +)$  jest postaci  $k\mathbb{Z}$  dla pewnego  $k \in \mathbb{Z}$ .

8. Załóżmy, że grupa  $G$  jest skończona. Udowodnić, że  $G$  jest cykliczna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje  $a \in G$  taki, że  $\text{ord}(a) = |G|$ .
9. Udowodnić, że każda podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.
10. Doskonale tasowanie zbioru  $2n$  kart do gry to permutacja:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n \\ 2 & 4 & 6 & \dots & 2n & 1 & 3 & \dots & 2n-1 \end{pmatrix}$$

Jaka jest najmniejsza liczba doskonałych tasowań 52 kart, po której karty są w wyjściowym układzie? Jaka jest ta liczba dla 50 kart?

11. Dla wielomianu  $W(x_1, x_2, x_3, x_4)$  i permutacji  $\sigma \in S_4$  definiujemy wielomian  $W^\sigma(x_1, x_2, x_3, x_4)$  wzorem:

$$W^\sigma(x_1, x_2, x_3, x_4) = W(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)}, x_{\sigma(4)})$$

Niech  $G_W = \{\sigma \in S_4 : W = W^\sigma\}$  ( $G_W$  jest zawsze pewną podgrupą  $S_4$ ). Wyznaczyc  $G_W$  dla następujących wielomianów:

- (a)  $(x_1 + x_2)(x_3 + x_4)$ ;  
(b)  $(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)$ ;  
(c)  $(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$ .