

ALGEBRA 1, Lista 6

Ćwiczenia 12.11.2019, Konwersatorium 13.11.2019 i materiał na Kartkówkę 5 (19.11.2019).

0S. Materiał teoretyczny: Homomorfizmy, epimorfizmy, monomorfizmy, endomorfizmy i automorfizmy grup: definicje i przykłady. Twierdzenie Cayley'a. Własności homomorfizmów grup. Jądro i obraz homomorfizmu grup. Dzielnik normalny. Charakteryzacja monomorfizmu grup przy pomocy jądra.

1. Czy następujące grupy są cykliczne?

(a) $S(\mathbb{R}, +)$;

(b) S podgrupa $(\mathbb{Q}, +)$ generowana przez $\{1/2, 1/3\}$;

(c) $K(\mathbb{Q}, +)$;

2K. Załóżmy, że G, H są grupami oraz grupa G jest cykliczna, skończona i generowana przez element a . Załóżmy, że $b \in H$ oraz $\text{ord}(b)$ jest skończony i dzieli $\text{ord}(a)$. Udowodnić, że:

(a) istnieje dokładnie jeden homomorfizm grup $f : G \rightarrow H$ taki, że $f(a) = b$;

(b) każdy endomorfizm \mathbb{Z}_n jest postaci:

$$\varphi_k : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \varphi_k(x) = k \cdot_n x;$$

dla pewnego $k \in \mathbb{Z}_n$.

3K. Załóżmy, że G jest grupą cykliczną, nieskończoną i generowaną przez element a , H jest dowolną grupą oraz $b \in H$. Udowodnić, że:

(a) istnieje dokładnie jeden homomorfizm grup $f : G \rightarrow H$ taki, że $f(a) = b$;

(b) każdy endomorfizm \mathbb{Z} jest postaci:

$$\psi_k : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \psi_k(x) = kx;$$

dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$.

4. Czy istnieją poniższe homomorfizmy grup $f : G \rightarrow H$? Jeśli istnieją, to wyznaczyć obraz i jądro danego homomorfizmu.

(a) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4)$, $H = (\mathbb{Z}, +)$, $f(1) = 1$.

(b) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4)$, $H = (\mathbb{Z}_2, +_2)$, $f(1) = 1$.

(c) $G = H = (\mathbb{R}, +)$, $f(1) = 99$.

(d) $G = (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$, $H = (\mathbb{R}, +)$, $f(8) = 3$.

(e) $G = (\mathbb{Q}, +)$, $H = (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $f(1) = 2$.

(f) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4)$, $H = (\mathbb{Z}_5, +_5)$, $f(1) = 1$.

5. Wyznaczyć wszystkie homomorfizmy $f : G \rightarrow H$, gdzie:

(a) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$;

(b) $G = (\mathbb{Z}_3, +_3)$, $H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$;

(c) $G = (\mathbb{Z}_{10}, +_{10})$, $H = (\mathbb{Z}_6, +_6)$;

(d) $G = H = (\mathbb{Q}, +)$.

6. Czy następująca podgrupa H grupy G jest dzielnikiem normalnym?

(a) $G = D_4$, $H = \{\text{id}, O_{\pi/2}, O_{\pi}, O_{3\pi/2}\}$.

(b) $G = D_4$, $H = \{\text{id}, O_{\pi}\}$.

(c) $G = S_4$, $H = \{\text{id}, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$.

7. Niech

$$H := \{\text{id}, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\} \subset S_4.$$

Udowodnić, że:

(a) H jest podgrupą S_4 ;

(b) H jest dzielnikiem normalnym w S_4 (wskazówka: dla $\sigma \in S_4$ opisać $\sigma(1, 2)(3, 4)\sigma^{-1}$ i następnie skorzystać z odpowiedniego kryterium na dzielnik normalny z wykładu).