

ALGEBRA HOMOLOGICZNA, WYKŁAD 13

Zakładamy, że X jest normalną przestrzenią topologiczną.

Twierdzenie 1

Każdy snop miękki na X jest Γ -acykliczny.

Dowód

Niech \mathcal{F} będzie snopem miękkim

Krok 1

Dla każdego krótkiego ciągu dokładnego

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \xrightarrow{\phi} \mathcal{G} \longrightarrow 0$$

ciąg cięć globalnych

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(X) \xrightarrow{\psi|_X} \mathcal{H}(X) \xrightarrow{\phi|_X} \mathcal{G}(X) \longrightarrow 0$$

jest też dokładny.

Dowód kroku 1

Musimy pokazać, że $\phi|_X : \mathcal{H}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X)$ jest "na". Z zadania 1 listy 10, dla każdego $x \in X$, ciąg źdźbeł

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_x \xrightarrow{\psi|_x} \mathcal{H}_x \xrightarrow{\phi|_x} \mathcal{G}_x \longrightarrow 0$$

jest dokładny. Stąd istnieje otwarte otoczenie $U \ni x$ i $\bar{s} \in \mathcal{H}(U)$ takie, że $\phi|_U(\bar{s})_x = s_x$. Stąd istnieje otoczenie $U' \ni x$, takie że

$$s|_{U'} = \phi|_U(\bar{s})|_{U'} = \phi|_{U'}(\bar{s}|_{U'}).$$

Stąd możemy pokryć X zbiorami otwartymi U_i , taki że dla każdego i , $s|_{U_i} \in \text{im}(\phi|_{U_i})$. Ponieważ X jest przestrzenią normalną, możemy zastąpić pokrycie otwarte (U_i) (oddzielając każdy $x \in U_i$ od $X \setminus U_i$ zbiorami otwartymi) pokryciem domkniętym (C_i) (tzn. X jest sumą wewnątrz C_i) takim, że dla każdego i , $s|_{C_i} = \phi|_{C_i}(\bar{s}_i)$ dla pewnego $\bar{s}_i \in \mathcal{H}(C_i)$.

Być może (\bar{s}_i) nie jest zgodny. Niech $s_{jk} := s_j|_{C_{jk}}$. Zaczynamy poprawiać układ (\bar{s}_i) . Ponieważ $\bar{s}_{12} - \bar{s}_{21} \neq 0$, istnieje $c \in \mathcal{F}(C_{12})$ taki, że $\psi|_{C_{12}}(c) = \bar{s}_{12} - \bar{s}_{21}$. Ponieważ \mathcal{F} jest miękki, istnieje przedłużenie c do $c' \in \mathcal{F}(U_2)$. Poprawiamy \bar{s}_2 do $\bar{s}_2 + c'$. Poprawiamy tak dalej i dalej, aż do dostania zgodnego systemu.

Krok 2

$$H^1(X, \mathcal{F}) = 0.$$

Dowód kroku 2

Weźmy monomorfizm $\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{I}$, gdzie \mathcal{I} jest injektywny i niech $\mathcal{G} := \text{coker}(\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{I})$. Wtedy mamy krótki ciąg dokładny snopów $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{G}$, który daje nam długi ciąg dokładny grup abelowych

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{I}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{I}) \rightarrow \dots$$

Z Kroku 1, $\mathcal{I}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X)$ jest “na”, stąd $\mathcal{G}(X) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F})$ jest odwzorowaniem zerowym. Dlatego $H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{I})$ jest “1-1”. Ale \mathcal{I} jest injektywny, dlatego $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$ i $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$.

Krok 3 (ćwiczenia – lista 10. zad. 5)

Każdy snop injektywny jest miękki.

Krok 4 (ćwiczenia – lista 10. zad. 4)

Jeśli mamy ciąg dokładny $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$, gdzie \mathcal{H} jest też miękki, to \mathcal{G} jest miękki.

Krok 5

\mathcal{F} jest Γ -acykliczny.

Weźmy ciąg dokładny jak w dowodzie kroku 2.

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0.$$

Z Kroku 3 i Kroku 4, snop \mathcal{G} jest miękki.

Z długiego ciągu dokładnego funktorów pochodnych dostajemy acykliczny kompleks

$$0 \rightarrow \Gamma(\mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{I}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{G}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{I}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^2(X, \mathcal{F}) \rightarrow \dots$$

Ponieważ, $H^{>0}(X, \mathcal{I}) = 0$ dostajemy, że $H^i(X, \mathcal{G}) = H^{i+1}(X, \mathcal{F})$ dla $i \geq 1$. Z Kroku 1, $H^1(X, \mathcal{G}) = H^2(X, \mathcal{F}) = 0$ i dalej indukcyjnie $H^{>0}(X, \mathcal{F}) = 0$. \square

Lemat

Jeśli \mathcal{R} jest miękkim snopem pierścieni na X , to każdy snop \mathcal{R} -modułów jest miękki.

Dowód

Niech \mathcal{F} będzie snopem \mathcal{R} -modułów, $D \subseteq X$ domkniętym podzbiorem i $s \in \mathcal{F}$. Wtedy istnieje otwarty $D \subseteq U$ i $s' \in \mathcal{F}(U)$ taki, że $s'|_D = s$.

Weźmy teraz $C \subseteq U$ domknięty, taki że dla $U' := \text{Int}(C)$ mamy $D \subseteq U'$. C istnieje, bo X jest normalna (oddzielamy D od $X \setminus U$).

Niech

$$f_0 \in \mathcal{F}(D \cup (X \setminus U')), \quad f_0|_D := 1_{\mathcal{F}(D)}, \quad f_0|_{X \setminus U'} := 0_{\mathcal{F}(X \setminus U')}$$

(f_0 istnieje, bo X jest normalna).

\mathcal{R} jest miękki, stąd f_0 jest obcięciem pewnego $f \in \mathcal{R}(X)$. Definiujemy $\bar{s} \in \mathcal{F}(X)$

$$\bar{s}|_{X \setminus C} = 0, \quad \bar{s}|_U = f|_{Us'}.$$

$(X \setminus C) \cap U \subseteq X \setminus U'$, stąd $f|_{(X \setminus C) \cap U} = 0$ i $s|_{(X \setminus C) \cap U} = 0$. Stąd \bar{s} jest dobrze określone (przez zgodną rodzinę).

Mamy również $\bar{s}|_F = f|_{Fs'}|_F = 1s = s$. □

Twierdzenie 2

Jeśli X jest gładka, to każdy snop \mathcal{C}_X^∞ -modułów jest miękki.

Jeśli X jest normalną przestrzenią topologiczną, to każdy snop \mathcal{C}_X -modułów jest miękki.

Dowód

Dla X gładkiej, snop \mathcal{C}_X^∞ jest miękki z gładkiego rozkładu jedynek.

Dla X normalnej, snop \mathcal{C}_X jest miękki z twierdzenia Tietze'a.

Wystarczy teraz zastosować twierdzenie 2. □

Wniosek

Jeśli X jest gładka, to

$$H^n(X, \mathbb{R}_X) \cong H_{DR}^n(X).$$

Uwaga

Snop \mathcal{F} nazywamy wiotkim, gdy dla każdego otwartego $U \subseteq X$, $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ jest "na".

Każdy snop wiotki jest miękki stąd również Γ -acykliczny.

Snopy \mathcal{C}_X^∞ , \mathcal{C}_X nie są wiotkie, ponieważ dla $X = \mathbb{R}$ i $U = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, funkcja $1/x \in \mathcal{C}_\mathbb{R}^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ nie przedłuża się nawet do funkcji ciągłej na \mathbb{R} .

Definicja

Niech X będzie przestrzenią topologiczną i A grupą abelową. Dla $U \subseteq X$ otwartego, $k \in \mathbb{N}$ i Δ_k sympleksu standardowego w \mathbb{R}^{k+1} definiujemy

$$U^{S^k} := \text{Hom}_{\text{Top}}(\Delta_k, U), \quad \mathcal{S}_X^k(U, A) := \text{Hom}_{\text{Set}}(U^{S^k}, A).$$

Dla $V \subseteq U$ inkluzja indukuje zanurzenie $V^{S^k} \rightarrow U^{S^k}$, które zadaje nam funkcję obcięcia $\mathcal{S}_X^k(U, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^k(V, A)$.

$\mathcal{S}_X^k(U, A)$ – grupa k -tych kołańcuchów singularnych na U o wartościach w A .

Ponieważ funkcje obcięcia pochodzą od obcięć funkcji dostajemy snop $\mathcal{S}_X^k(\cdot, A)$

Zanurzenie i -tej ściany $\Delta_k \rightarrow \Delta_{k+1}$ daje różniczkę

$$\Delta_U^k : \mathcal{S}_X^k(U, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^{k+1}(U, A),$$

która zadaje kompleks grup abelowych.

$$0 \rightarrow \mathcal{S}_X^0(U, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^1(U, A) \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{S}_X^k(U, A) \rightarrow \dots$$

Kohomologie (n -te) tego kompleksu to $H^n(U, A)$ – *kohomologie singularne* U o współczynnikach w A .

Różniczki są przemienne z funkcjami obcięcia $\mathcal{S}_X^k(U, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^k(V, A)$, stąd dostajemy kompleks snopów

$$0 \rightarrow \mathcal{S}_X^0(\cdot, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^1(\cdot, A) \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{S}_X^k(\cdot, A) \rightarrow \dots$$

Założmy teraz, że X jest *lokalnie ściągalna*, tzn. ma bazę złożoną ze zbiorów otwartych ściągalnych (np. X jest rozmaitością gładką albo ogólniej rozmaitością topologiczną). Wtedy dla każdego $x \in X$ i każdego otwartego $x \in U$ istnieje otwarty $x \in V \subseteq U$ taki, że $H^0(V, A) = A$, $H^{>0}(V, A) = 0$.

Stąd dla V jak wyżej następujący ciąg jest dokładny

$$0 \rightarrow A \rightarrow \mathcal{S}_X^0(V, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^1(V, A) \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{S}_X^k(V, A) \rightarrow \dots$$

Zad. 1 listy 10. jest prawdziwe również dla długich ciągów dokładnych. Stąd następujący ciąg snopów jest dokładny

$$0 \rightarrow A_X \rightarrow \mathcal{S}_X^0(\cdot, A) \rightarrow \mathcal{S}_X^1(\cdot, A) \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{S}_X^k(\cdot, A) \rightarrow \dots$$

Twierdzenie

Powyższy ciąg dokładny jest Γ -acykliczną rezolwentą A_X .

Dowód

Z Uwagi wystarczy pokazać, że każdy snop $\mathcal{S}_X^k(\cdot, A)$ jest wiotki.

Weźmy $U \subseteq X$ otwarty i $f : U^{\mathcal{S}^k} \rightarrow A$. Wtedy f możemy trywialnie rozszerzyć do $\bar{f} : X^{\mathcal{S}^k} \rightarrow A$ (np. kładąc na $X \setminus U$ zero). \square

Wniosek

Dla lokalnie ściąganej przestrzeni X , grupy abelowej A i $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$H^n(X, A) \cong H^n(X, A_X).$$

Definicja

Niech $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ będzie pokryciem X i \mathcal{F} snopem na X . Definiujemy

$$C^k(\mathcal{U}, \mathcal{F}) := \prod_{(i_0, \dots, i_k) \in I^k} \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_k}).$$

Definiujemy teraz różniczkę

$$\delta^k : C^k(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^{k+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

$$\delta^k(c)(i_0, \dots, i_{k+1}) := \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^j c(i_0, \dots, i_{j-1}, i_{j+1}, \dots, i_k) |_{U_{i_0 \dots i_{k+1}}}.$$

Można pokazać, że dostajemy kompleks

$$0 \rightarrow C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \dots,$$

którego k -te kohomologie oznaczamy przez $H^k(\mathcal{U}, \mathcal{F})$.

Jeśli teraz mamy pokrycie $\mathcal{U}' = (U'_j)_{j \in J}$ wpisane w pokrycie \mathcal{U} (tzn. istnieje $f : J \rightarrow I$ takie, że dla każdego $j \in J$, $U'_j \subseteq U_{f(j)}$), to dostajemy odwzorowania $C^k(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^k(\mathcal{U}', \mathcal{F})$ zależne od wyboru wpisanego f i przemienne z różniczkami. Stąd dostajemy homomorfizm grup $H^k(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^k(\mathcal{U}', \mathcal{F})$, który już nie zależy od wyboru f .

Pokrycia wraz z odwróconą relacją wpisanego dają skierowany system prosty i $\hat{H}^k(X, \mathcal{F})$ (kohomologie Čecha) jest granicą prostą grup $H^k(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ względem tego systemu.

Twierdzenie (bez dowodu).

Jeśli X jest parazwarta i \mathcal{F} jest snopem grup abelowych, to

$$H^k(X, \mathcal{F}) \cong \hat{H}^k(X, \mathcal{F}).$$

Definicje

1. Wiązkę nazywamy *liniową* gdy włókna są jednowymiarowe
2. Snop \mathcal{R} -modułów nazywamy *odwracalnym*, gdy jest lokalnie wolny rangi 1.
3. Dla rozmaitości algebraicznej X , $\text{Pic}(X)$ to klasy izomorfizmów odwracalnych snopów \mathcal{O}_X -modułów z działaniem mnożenia tensorowego.

Fakt

1. Snopy odwracalne \mathcal{O}_X -modułów odpowiadają algebraicznym wiązkom liniowym. Podobnie dla wiązek topologicznych, gładkich i analitycznych.
2. $\text{Pic}(X)$ jest grupą abelową (zwaną grupą Picarda).

Dowód

1. Oczywiście.

2. Najlepiej widać to na poziomie wiązek. Wiązki liniowe zadane są przez odwzorowania przejścia $g_{ij} : U_{ij} \rightarrow K^*$ spełniające warunek kocyklu. Iloczyn tensorowy odpowiada mnożeniu w K^* , stąd wiązka odwrotna odpowiada funkcjom $g'_{ij} := g_{ij}^{-1}$. \square

Algebraicznej wiązce liniowej odpowiada element z $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ w następujący sposób. Wiązka zadaje układ funkcji przejścia $g_{ij} : U_{ij} \rightarrow K^*$, który zadaje element $C^1(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X^*)$ dla $\mathcal{U} = (U_i)$. Warunek kocyklu mówi dokładnie, że ten element jest w jądrze różniczki, czyli dostajemy element z $H^1(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X^*)$, a co za tym idzie z $\hat{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*)$, które jest izomorficzne z $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$

Twierdzenie (bez dowodu)

Powyższe odwzorowanie zadaje izomorfizm grup

$$\text{Pic}(X) \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*).$$