

Łamigłówki i zadania na weekend

W łamigłówkach **300**, **301**, **302** i **303** oprócz tworzenia liczb z podanych cyfr wolno użyć w dowolnej ilości pięciu działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie), silni, pierwiastka kwadratowego oraz nawiasów dla oznaczenia kolejności działań.

300. Zapisz liczbę 44 używając cyfr 5, 6 i 7 (każdej tylko raz).

301. Zapisz liczbę 47 używając cyfr 5, 6 i 7 (każdej tylko raz).

302. Zapisz liczbę 48 używając cyfr 5, 6 i 7 (każdej tylko raz).



Autorski Tygodnik Matematyczny
JAROSŁAWA WRÓBLEWSKIEGO

TRAPEZ

Nr 34 (34/2015)

Piątek, 20 listopada 2015 r.

Facebookowy konkurs Trapezu – Zadanie Tygodnia

303. Zapisz jak najmniejszą liczbę całkowitą większą od 4000 używając cyfr 4, 4 i 7. Przez *jak najmniejszą* rozumiemy *najmniejszą spośród liczb zapisanych przez uczestników konkursu*. Tym razem osoby biorące udział w konkursie mogą odpowiadać wielokrotnie.

Nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną

304. Wyznacz największą taką liczbę rzeczywistą dodatnią D , że dla dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich a, b, c, d, e zachodzi nierówność

$$D \cdot (ab + bc + cd + de) \leq a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2.$$

305. Udowodnij, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n zachodzi nierówność

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}.$$

306. Udowodnij, że $\sqrt[33]{2} < 1,024$.

Rozwiązania zadań 292–299

292. $9 = \sqrt{5+76}$ **293.** $24 = \sqrt{576} = (5+6-7)!$ **294.** $37 = 7 \cdot 6 - 5 = 5 \cdot 6 + 7$

295. $14 = \sqrt{5!+76}$

296. Z nierówności między średnią geometryczną i arytmetyczną zastosowaną do 24 liczb, z których jedna jest równa a^{24} , trzy są równe $b^{24}/3$, trzy są równe $c^{24}/3$, osiem jest równych $d^{24}/8$ i dziewięć jest równych $e^{24}/9$, otrzymujemy

$$\frac{ab^3c^3d^8e^9}{\sqrt[24]{3^3 \cdot 3^3 \cdot 8^8 \cdot 9^9}} \leq \frac{a^{24} + b^{24} + c^{24} + d^{24} + e^{24}}{24},$$

czyli po uproszczeniu

$$4 \cdot ab^3c^3d^8e^9 \leq a^{24} + b^{24} + c^{24} + d^{24} + e^{24}, \quad (1)$$

co stanowi daną w treści zadania nierówność ze stałą $D = 4$.

Ponieważ w nierówności (1) zachodzi równość przy $a^{24} = \frac{b^{24}}{3} = \frac{c^{24}}{3} = \frac{d^{24}}{8} = \frac{e^{24}}{9}$, stałej D nie można zwiększyć.

297. Z nierówności między średnią geometryczną i arytmetyczną zastosowaną do liczb a^2 i $q^2 \cdot b^2$, gdzie liczba rzeczywista dodatnia q zostanie dobrana później, otrzymujemy

$$q \cdot ab \leq \frac{a^2 + q^2 \cdot b^2}{2},$$

czyli

$$2q \cdot ab \leq a^2 + q^2 \cdot b^2. \quad (2)$$



Analogicznie uzyskujemy nierówność

$$2q \cdot cd \leq q^2 \cdot c^2 + d^2. \tag{3}$$

Ponadto zastosowanie nierówności między średnią geometryczną i arytmetyczną do liczb $(1 - q^2) \cdot b^2$ oraz $(1 - q^2) \cdot c^2$ prowadzi do

$$2 \cdot (1 - q^2) \cdot bc \leq (1 - q^2) \cdot b^2 + (1 - q^2) \cdot c^2. \tag{4}$$

Dodając stronami nierówności (2), (3) i (4) otrzymujemy

$$2q \cdot ab + 2 \cdot (1 - q^2) \cdot bc + 2q \cdot cd \leq a^2 + b^2 + c^2 + d^2,$$

co będzie stanowić nierówność podaną w treści zadania, jeżeli $q = 1 - q^2$, czyli $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Przy tym stała D jest równa $2q = \sqrt{5} - 1$.

Ponieważ w nierównościach (2), (3) i (4) zachodzi równość przy $a^2 = q^2 \cdot b^2 = q^2 \cdot c^2 = d^2$, stałą D nie można zwiększyć.

298. Daną w treści zadania nierówność możemy przepisać w postaci

$$\frac{(n+1)^n}{n^n} < \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}},$$

czyli

$$(n+1)^{2n+1} < n^n \cdot (n+2)^{n+1}. \tag{5}$$

Mnożąc nierówność (5) stronami przez n otrzymujemy nierówność równoważną

$$n \cdot (n+1)^{2n+1} < n^{n+1} \cdot (n+2)^{n+1},$$

którą możemy zapisać jako

$$(n^2 + n) \cdot (n^2 + 2n + 1)^n < (n^2 + 2n)^{n+1}. \tag{6}$$

Ponieważ po każdej ze stron nierówności (6) występuje iloczyn $n + 1$ czynników o takiej samej sumie równej $n^3 + 3n^2 + 2n$, większą wartość ma ten iloczyn, którego czynniki są równe.

299. Przekształcamy daną w zadaniu nierówność:

$$\sqrt[26]{2} > \frac{128}{125}, \quad 2 > \left(\frac{128}{125}\right)^{26}, \quad 2 > \frac{2^{182}}{5^{78}}, \quad 2 \cdot 5^{78} > 2^{182}, \quad 5^{78} > 2^{181}.$$

Udowodnimy ostatnią nierówność. W tym celu rozważmy 28 liczb, z których 3 są równe $125 - 25 = 100$, a 25 jest równych $125 + 3 = 128$. Na mocy nierówności między średnią geometryczną i arytmetyczną tych liczb otrzymujemy kolejno:

$$\sqrt[28]{100^3 \cdot 128^{25}} < \frac{3 \cdot (125 - 25) + 25 \cdot (125 + 3)}{28}, \quad \sqrt[28]{100^3 \cdot 128^{25}} < 125, \\ 100^3 \cdot 128^{25} < 125^{28}, \quad 2^6 \cdot 5^6 \cdot 2^{175} < 5^{84}, \quad 2^{181} < 5^{78}.$$

Uwaga: Nierówność $2^{181} < 5^{78}$ jest równoważna nierówności $\log_2 5 > 181/78$. Ponieważ $181/78 = 2,32051\dots$, otrzymujemy oszacowanie

$$\log_2 5 > 2,32.$$

W rzeczywistości $\log_2 5 \approx 2.3219$.

