

Łamigłówki i zadania na weekend

W łamigłówkach **426**, **427**, **428** i **429** oprócz tworzenia liczb z podanych cyfr wolno użyć w dowolnej ilości pięciu działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie), silni, pierwiastka kwadratowego oraz nawiasów dla oznaczenia kolejności działań.

426. Zapisz liczbę 25 używając cyfr 1, 8 i 8.

427. Zapisz liczbę 8192 używając cyfr 2, 2 i 4.

428. Zapisz liczbę 204 używając cyfr 4, 6 i 7 (każdej tylko raz). Podaj dwa istotnie różne rozwiązania.



Autorski Tygodnik Matematyczny
JAROSŁAWA WRÓBLEWSKIEGO

TRAPEZ

Nr 54 (14/2016)

Piątek, 8 kwietnia 2016 r.

Facebookowy konkurs Trapezu – Zadanie Tygodnia

429. Zapisz jak najmniejszą liczbę całkowitą większą od 200 używając cyfr 4, 6 i 8 (każdej tylko raz). Przez *jak najmniejszą* rozumiemy *najmniejszą spośród liczb zapisanych przez uczestników konkursu*. Tym razem osoby biorące udział w konkursie mogą odpowiadać wielokrotnie.

Zadania wokół chińskiego twierdzenia o resztach

430. Udowodnij istnienie takiej liczby całkowitej dodatniej n , że dla dowolnej liczby pierwszej $p < 100$ reszta z dzielenia liczby n przez $2p$ jest najmniejszą liczbą pierwszą większą od p .

431. Znajdź liczby całkowite dodatnie a , b , c spełniające równanie

$$a^4 + b^5 = c^6.$$

Rozwiązania zadań 421–425

421. $60 = \frac{(3!)!}{3! + 3!} = \sqrt{(3!)! \cdot 3! - (3!)!}$

422. $243 = \frac{(3!)!}{3} + 3 = \frac{3^3!}{3}$

423. $245 = \frac{(3!)!}{3} + 5$

424. *Rozwiązanie błędne:* Niech $a < b$ będą długościami przyprostokątnych wyjściowego trójkąta prostokątnego. Po wydłużeniu krótszej przyprostokątnej o 200% otrzymamy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych $3a$ i b . Zgodnie z warunkami zadania krótsza przyprostokątna tego trójkąta ma długość $2a$, skąd $b = 2a$. Zatem przeciwprostokątna wyjściowego trójkąta ma długość $a\sqrt{5}$, a trójkąta zmodyfikowanego $a\sqrt{13}$. Wyliczamy bezpośrednio, że $\sqrt{13}/5 \approx 1,61245$.

Odpowiedź: Długość przeciwprostokątnej zwiększyła się o 61,245%.

Rozwiązanie poprawne: A kto powiedział, że jak w trójkącie zmienimy długość jednego boku, to automatycznie jakoś zmieniają się długości dwóch pozostałych boków?

W trójkącie prostokątnym obowiązuje następująca terminologia:

- krótsza przyprostokątna = najkrótszy bok trójkąta
- przeciwprostokątna = najdłuższy bok trójkąta
- dłuższa przyprostokątna = środkowy (ze względu na długość) bok trójkąta

Niech $a < b < c$ będą długościami boków wyjściowego trójkąta prostokątnego. Po wydłużeniu najkrótszego boku o 200% otrzymujemy trójkąt o bokach długości $3a$, b , c . Skoro najkrótszy bok tego trójkąta ma długość $2a$, to musi być $b = 2a$ i $c = a\sqrt{5}$. Zmodyfikowany



trójkąt ma więc boki długości $2a$, $a\sqrt{5}$ i $3a$, jest więc trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej $3a$. Widzimy, że przeciwprostokątna wyjściowego trójkąta ma długość $a\sqrt{5}$, a trójkąta zmodyfikowanego $3a$. Wyliczamy, że $3/\sqrt{5} \approx 1,34164$.

Odpowiedź: Długość przeciwprostokątnej zwiększyła się o 34,164%.

Uwaga: Zadanie w istocie polega na odgadnięciu interpretacji niejasnej treści w sposób zgodny z intencją autora. Wykorzystywanie takich zadań w konkursach powinno być **surowo zakazane przez 365*** dni w roku.

*) Proponowany czas zakazu dotyczy roku przestępnego i obejmuje okresy od 1 stycznia do 31 marca i od 2 kwietnia do 31 grudnia.

425. Jako pierwszy kwadrat magiczny przyjmijmy kwadrat o parami względnie pierwszych wyrazach, np.

37	103	61
91	67	43
73	31	97

Drugim kwadratem niech zaś będzie najprostszy kwadrat magiczny

2	9	4
7	5	3
6	1	8

przeskalowany przez wymnożenie wyrazów przez liczbę $2^p \cdot 3^q \cdot 5^r \cdot 7^s$, czyli kwadrat

$2^{p+1} \cdot 3^q \cdot 5^r \cdot 7^s$	$2^p \cdot 3^{q+2} \cdot 5^r \cdot 7^s$	$2^{p+2} \cdot 3^q \cdot 5^r \cdot 7^s$
$2^p \cdot 3^q \cdot 5^r \cdot 7^{s+1}$	$2^p \cdot 3^q \cdot 5^{r+1} \cdot 7^s$	$2^p \cdot 3^{q+1} \cdot 5^r \cdot 7^s$
$2^{p+1} \cdot 3^{q+1} \cdot 5^r \cdot 7^s$	$2^p \cdot 3^q \cdot 5^r \cdot 7^s$	$2^{p+3} \cdot 3^q \cdot 5^r \cdot 7^s$

Liczby p , q , r i s powinny spełniać następujące układy kongruencji:

$$\left\{ \begin{array}{l} p+1 \equiv 0 \pmod{37} \\ p \equiv 0 \pmod{103} \\ p+2 \equiv 0 \pmod{61} \\ p \equiv 0 \pmod{91} \\ p \equiv 0 \pmod{97} \\ p \equiv 0 \pmod{43} \\ p+1 \equiv 0 \pmod{73} \\ p \equiv 0 \pmod{31} \\ p+3 \equiv 0 \pmod{97} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} q \equiv 0 \pmod{37} \\ q+2 \equiv 0 \pmod{103} \\ q \equiv 0 \pmod{61} \\ q \equiv 0 \pmod{91} \\ q \equiv 0 \pmod{67} \\ q+1 \equiv 0 \pmod{43} \\ q+1 \equiv 0 \pmod{73} \\ q \equiv 0 \pmod{31} \\ q \equiv 0 \pmod{97} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r \equiv 0 \pmod{37} \\ r \equiv 0 \pmod{103} \\ r \equiv 0 \pmod{61} \\ r \equiv 0 \pmod{91} \\ r+1 \equiv 0 \pmod{67} \\ r \equiv 0 \pmod{43} \\ r \equiv 0 \pmod{73} \\ r \equiv 0 \pmod{31} \\ r \equiv 0 \pmod{97} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} s \equiv 0 \pmod{37} \\ s \equiv 0 \pmod{103} \\ s \equiv 0 \pmod{61} \\ s+1 \equiv 0 \pmod{91} \\ s \equiv 0 \pmod{67} \\ s \equiv 0 \pmod{43} \\ s \equiv 0 \pmod{73} \\ s \equiv 0 \pmod{31} \\ s \equiv 0 \pmod{97} \end{array} \right.$$

Powyższe układy kongruencji mają rozwiązanie na mocy chińskiego twierdzenia o resztach.

