

### ANALIZA MATEMATYCZNA 3, NOTATKI Z WYKŁADU 9B

POLE PŁATA (figle płata :)

Wyznamy pole powierzchni płata – to jest części wykresu funkcji  $z = f(x, y)$  nad obszarem  $P \subset \mathbb{R}^2$  domkniętym i ograniczonym, zawartym w dziedzinie funkcji  $f$  (przy założeniu ciągłości pochodnych cząstkowych  $f'_x, f'_y$ ).

POMYSŁ:


Bierzemy 'drobny' podział  $\omega = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$  obszaru  $P$  'głównie' na prostokąty o polach  $\Delta p_i$  ('głównie' tzn. elementy podziału, które nie są prostokątami mają łącznie 'znikome' pole). Wybieramy punkty  $(x_i, y_i) \in P_i$  i w przestrzeni prowadzimy płaszczyznę styczną do wykresu  $f$  w punktach  $(x_i, y_i, f(x_i, y_i))$ . Części tych płaszczyzn utworzone nad prostokątami  $P_i$  wyglądają jak karteczki (równoległoboki) oblepiające tę powierzchnię. Suma ich pól  $\sum_i \Delta s_i$  przybliża szukane pole płata.

'Nad' ustalonym prostokątem z podziału  $\omega$  'żyje' karteczka', tj. równoległobok rozpięty przez (pewne) wektory  $\vec{p}, \vec{q}$

Płaszczyzna styczna jest wyznaczona przez gradient funkcji  $f$ , zatem można przyjąć, że te wektory mają współrzędne:

$$\vec{p} = [\Delta x, 0, f'_x \cdot \Delta x], \quad \vec{q} = [0, \Delta y, f'_y \cdot \Delta y].$$

Stąd obliczamy pole  $\Delta s$  owego równoległoboku (korzystając z prostoty iloczynu skalarnego):



$$\begin{aligned} \Delta s &= |\vec{p}| |\vec{q}| \sin \varphi = |\vec{p}| |\vec{q}| \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{|\vec{p}|^2 |\vec{q}|^2 - (|\vec{p}| |\vec{q}| \cos \varphi)^2} = \\ &= \sqrt{((\Delta x)^2 + (f'_x \Delta x)^2)((\Delta y)^2 + (f'_y \Delta y)^2) - (f'_x \Delta x \cdot f'_y \Delta y)^2} = \dots\dots\dots \\ &= \Delta x \cdot \Delta y \cdot \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} \end{aligned}$$

UWAGA. Powyżej pominięte są indeksy 'i', pochodne cząstk. liczone są w punktach  $(x_i, y_i)$ .

Zatem pole płata  $f$  nad  $P$  jest w przybliżeniu równe

$$\sum_i \Delta s_i = \sum_i \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} \Delta x \Delta y = \sum_i \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} \Delta p_i \approx \boxed{\iint_P \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\omega.}$$

' $\approx$ ' oznacza tu: gdy weźmiemy ciąg coraz drobniejszych podziałów (o maksymalnych średnicach zbieżnych do 0), to granica sum  $\sum_i \Delta s_i$  jest zbieżna do całki (z def. całki).

PRZYKŁAD A.

Powierzchnia płata  $f(x, y) = \frac{2}{3}(x^{\frac{3}{2}} + y^{\frac{3}{2}})$  nad trójkątem  $P$  o wierzchołkach  $(0, 0), (0, 1), (7, 1)$ , czyli nad obszarem:  $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 7y$  :

$$\begin{aligned} \iint_P \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\omega &= \iint_{\substack{0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 7y}} \sqrt{1 + x + y} d\omega = \\ &= \int_0^1 \left( \int_0^{7y} \sqrt{1 + x + y} dx \right) dy = \int_0^1 \left( \frac{2}{3}(1 + x + y)^{\frac{3}{2}} \right)_0^{7y} dy = \\ &= \dots \\ &= \frac{25}{3} - \frac{16}{15}\sqrt{2} . \end{aligned}$$

PRZYKŁAD B. Oblicz pole zbioru  $S = \{(x, y, z) : z = xy, x^2 + y^2 \leq 9, 0 \leq x \leq y\}$ .

Odczarujmy ten napis; chodzi tu zapewne o

pole płata  $f(x, y) = xy$  nad zbiorem  $P = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9, 0 \leq x \leq y\}$ ,  
czyli

$$\begin{aligned} \iint_P \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\omega &= \iint_P \sqrt{1 + y^2 + \dots\dots\dots^2} d\omega = \\ &\stackrel{\text{współ.}}{\stackrel{\text{bieg.}}{=}} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left( \int_0^3 \sqrt{1+r^2} \cdot r dr \right) d\varphi = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \left[ \frac{1}{3}(1+r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 = \frac{\pi}{12}(10\sqrt{10} - 1). \end{aligned}$$

UWAGA. Można pomyśleć o przybliżeniu powierzchni płata w inny sposób: wybieramy na płacie skończenie wiele punktów 'gęsto rozmieszczonych (dużo)'; z nich tworzymy trójkąty (triangulację); suma pól tych trójkątów powinna przybliżać pole płata — **TEN POMYSŁ JEST ZŁY**, zły nawet w przypadku powierzchni bocznej walca; szczegóły (i rysunki) można znaleźć np. w III tomie Fichtenholza, rozdział XVII, §2.