

# Analiza matematyczna ISIM I

Ryszard Szwarc\*

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Ciągi liczbowe</b>	<b>2</b>
1.1	Zbieżność ciągów . . . . .	3
1.2	Liczba $e$ . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Szeregi liczbowe</b>	<b>13</b>
2.1	Łączność i przemienność w sumie nieskończonej . . . . .	22
2.2	Mnożenie Cauchy’ego szeregów. . . . .	24
<b>3</b>	<b>Funkcje i granice</b>	<b>26</b>
3.1	Ważna granica . . . . .	28
3.2	Granice jednostronne . . . . .	29
3.3	Granice niewłaściwe i granice w punktach niewłaściwych . . .	30
3.4	Działania na granicach . . . . .	31
3.5	Funkcje ciągłe . . . . .	32
3.6	Ścisłe wprowadzenie funkcji wykładniczej . . . . .	39
<b>4</b>	<b>Ciągi i szeregi funkcyjne</b>	<b>41</b>
<b>5</b>	<b>Pochodne</b>	<b>51</b>
5.1	Zapis Leibniza . . . . .	57
5.2	Maxima i minima . . . . .	60
5.3	Metoda znajdowania wartości największej i najmniejszej funk- cji ciągłej na przedziale $[a, b]$ . . . . .	61
5.4	Wyższe pochodne . . . . .	64

---

\*Wykład prowadzony w semestrze zimowym 2013/2014 na podstawie notatek Magdaleny Świczewskiej z 2005-2006, opracowany na podstawie notatek Mateusza Wasylkiewicza

5.5	Różniczkowanie niejawne . . . . .	65
5.6	Related rates . . . . .	67
5.7	Aproksymacja za pomocą stycznej . . . . .	68
5.8	Reguła de l'Hospitala . . . . .	68
5.9	Pochodna ciągu i szeregu funkcyjnego . . . . .	72
5.10	Wzory Taylora i MacLaurina . . . . .	77
<b>6</b>	<b>Iloczyny nieskończone</b>	<b>86</b>
6.1	Liczby pierwsze . . . . .	89
<b>7</b>	<b>Ułamki łańcuchowe</b>	<b>90</b>
7.1	Okresowe ułamki łańcuchowe . . . . .	97
<b>8</b>	<b>Całka Riemanna</b>	<b>100</b>
8.1	Zasadnicze twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego . . . . .	112
8.2	Wzory Wallisa i Stirlinga . . . . .	120
8.3	Całka nieoznaczona . . . . .	124
8.4	Całkowanie funkcji wymiernych . . . . .	127
8.5	Podstawienie wykładnicze i trygonometryczne . . . . .	131
8.6	Zastosowanie całek oznaczonych do obliczania wielkości fizycznych . . . . .	134
8.7	Przybliżone obliczanie całek . . . . .	146
<b>9</b>	<b>Twierdzenie Weierstrassa i wielomiany Bernsteina</b>	<b>149</b>

## 1 Ciągi liczbowe

Będziemy rozważali ciągi złożone z liczb rzeczywistych. Liczby rzeczywiste  $\mathbb{R}$  mają własność ciągłości, z której wielokrotnie będziemy korzystać.

Podzbiór  $A \subset \mathbb{R}$  nazywamy ograniczonym z góry jeśli  $x \leq a$  dla pewnej liczby  $a$  oraz dla wszystkich liczb  $x$  z  $A$ . Najmniejszą liczbę ograniczającą zbiór  $A$  z góry nazywamy *kresem górnym* (supremum) i oznaczamy symbolem  $\sup A$ . Podobnie określamy *kres dolny* (infimum) i oznaczamy przez  $\inf A$ . Własność ciągłości liczb rzeczywistych oznacza, że każdy ograniczony podzbiór  $A \subset \mathbb{R}$  posiada kresy dolny i górny.

**Przykład.** Zbiór liczb wymiernych  $\mathbb{Q}$  nie ma własności ciągłości. Rozważmy

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\} = \{x \in \mathbb{Q} : -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}\}.$$

**Definicja 1.1.** Ciągami  $\{a_n\}$  nazywamy odwzorowanie liczb naturalnych w liczby rzeczywiste. Liczby  $a_1, a_2, a_3, \dots$  nazywamy wyrazami ciągu.

**Przykłady.**

(a)  $1, 2, 3, 4, 5, \dots$

(b)  $2, 4, 6, 8, 10, \dots$

(c)  $a_n = 5n + 3, b_n = 2^n + 1.$

(d)  $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{1}{a_n} \right).$

(e)  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ , - ciąg liczb pierwszych.

Ciąg  $\{a_n\}$  nazywamy *rosnącym* (*ściśle rosnącym*) jeśli

$$a_n \leq a_{n+1} \quad (a_n < a_{n+1})$$

dla wszystkich  $n$ . Podobnie określamy ciągi malejące i ściśle malejące.

**Przykład.** Ciąg z przykładu (d) jest ściśle malejący. Rzeczywiście, pokażemy najpierw, że  $a_n > 1$  dla wszystkich  $n$ . Mamy  $a_1 = 2 > 1$ . Dalej

$$a_{n+1} - 1 = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{1}{a_n} \right) - 1 = \frac{a_n^2 + 1 - 2a_n}{2a_n} = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n}.$$

Jeśli  $a_n > 1$ , to  $a_{n+1} > 1$ . Dalej

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{1}{a_n} \right) - a_n = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{a_n} - a_n \right) < 0,$$

bo  $a_n > 1$ .

## 1.1 Zbieżność ciągów

**Przykłady.**

(a) Wyrazy ciągu  $a_n = \frac{1}{n}$  zблиżają się do zera, gdy  $n$  rośnie.

(b) Dla  $b_n = (-1)^n + \frac{1}{n^2}$  wyrazy o numerach parzystych zблиżają się do 1, a te o numerach nieparzystych do  $-1$ .

**Definicja 1.2 (intuicyjna).** Mówimy, że ciąg  $a_n$  jest zbieżny do liczby  $g$  jeśli wyrazy ciągu leżą coraz bliżej liczby  $g$  dla dużych wskaźników  $n$ . Tzn. jeśli chcemy, aby liczba  $a_n$  znalazła się odpowiednio blisko  $g$ , to wskaźnik  $n$  powinien być odpowiednio duży. Stosujemy zapis  $\lim_n a_n = g$ .

**Definicja 1.3 (ściśła).** Dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  (która określa, jak blisko granicy mają znajdować się wyrazy ciągu) istnieje liczba  $N$  (próg określający jak duży powinien być wskaźnik ciągu) taka, że dla  $n > N$  mamy  $|a_n - g| < \varepsilon$ .

Ostatni warunek oznacza, że dla  $n > N$  wyrazy ciągu  $a_n$  leżą w przedziale  $(g - \varepsilon, g + \varepsilon)$ , tzn. w przedziale tym leżą prawie wszystkie wyrazy ciągu  $\{a_n\}$ .

**Przykłady.**

- (a)  $a_n = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$ . Mamy  $|a_n - 1| = \frac{1}{n}$ . Widać, że ciąg  $a_n$  jest zbieżny do 1 na podstawie intuicyjnej definicji. Przeciwiczymy ścisłą definicję. Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Niech  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ . Wtedy dla  $n > N$  otrzymamy  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ . Zatem  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ .
- (b)  $a_n = (-1)^n$ . Jeśli  $a_n$  dąży do  $g$ , to wyrazy o dużych numerach powinny leżeć blisko siebie. Ale  $|a_{n+1} - a_n| = 2$ .

**Twierdzenie 1.4.** Zbieżny ciąg posiada tylko jedną granicę.

*Dowód.* Załóżmy nie wprost, że  $\lim_n a_n = g$ ,  $\lim_n a_n = g'$ , oraz  $g < g'$ . Określmy  $\varepsilon = (g' - g)/2$ . Przedziały  $(g - \varepsilon, g + \varepsilon)$  oraz  $(g' - \varepsilon, g' + \varepsilon)$  są wtedy rozłączne. Nie jest możliwe więc, aby prawie wszystkie wyrazy leżały zarówno w pierwszym jak i drugim przedziale.  $\square$

**Twierdzenie 1.5.** Każdy ciąg monotoniczny (rosnący lub malejący) i ograniczony jest zbieżny.

*Dowód.* Załóżmy, że  $a_n$  jest rosnący oraz niech  $g = \sup a_n$ . Pokażemy, że liczba  $g$  jest granicą ciągu  $a_n$ . Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Liczba  $g - \varepsilon$  nie ogranicza ciągu  $a_n$  od góry. Tzn.  $a_N > g - \varepsilon$  dla pewnego wskaźnika  $N$ . Wtedy dla  $n > N$  mamy

$$g - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq g < g + \varepsilon.$$

$\square$

**Twierdzenie 1.6.** Załóżmy, że  $\lim_n a_n = g$  oraz  $\lim_n b_n = h$ . Wtedy ciągi po lewej stronie wzorów poniżej są zbieżne oraz:

- (a)  $\lim_n (a_n + b_n) = \lim_n a_n + \lim_n b_n.$
- (b)  $\lim_n (a_n b_n) = \lim_n a_n \cdot \lim_n b_n.$
- (c)  $\lim_n \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_n a_n}{\lim_n b_n},$  o ile  $\lim_n b_n \neq 0.$

*Dowód.* Udowodnimy tylko (c). Zaczniemy od wersji

$$\lim_n \frac{1}{b_n} = \frac{1}{\lim_n b_n}.$$

Oznaczmy  $\varepsilon_1 = |h|/2$ . Z założenia istnieje próg  $N_1$  taki, że dla  $n > N_1$  mamy  $|b_n - h| < |h|/2$ . Stąd  $|b_n| > |h|/2$ . Dla  $n > N_1$  otrzymujemy zatem

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{h} \right| = \frac{|b_n - h|}{|h| |b_n|} < \frac{2|b_n - h|}{|h|^2}. \quad (1.1)$$

Ustalmy  $\varepsilon > 0$ . Istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  mamy

$$|b_n - h| < \frac{h^2 \varepsilon}{2}. \quad (1.2)$$

Niech  $n > \max(N_1, N)$ . Wtedy z (1.1) i (1.2) uzyskamy

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{h} \right| < \varepsilon.$$

Z (b) mamy wtedy

$$\lim_n \frac{a_n}{b_n} = \lim_n a_n \cdot \frac{1}{b_n} = \lim_n a_n \cdot \lim_n \frac{1}{b_n} = \frac{\lim_n a_n}{\lim_n b_n}.$$

**Uwaga:** Przy dowodzie (b) można skorzystać ze wzoru

$$a_n b_n - g h = (a_n - g)(b_n - h) + (a_n - g)h + g(b_n - h).$$

□

**Wniosek 1.7.** Jeśli  $\lim_n a_n = g$ , to  $\lim_n c a_n = c g$ .

**Twierdzenie 1.8.** Jeśli ciągi  $a_n$  i  $b_n$  są zbieżne, to

- (a)  $|\lim_n a_n| = \lim_n |a_n|$ .
- (b) *Jeśli*  $a_n \geq 0$ , *to*  $\lim_n a_n \geq 0$ .
- (c) *Jeśli*  $a_n \leq b_n$ , *to*  $\lim_n a_n \leq \lim_n b_n$ .
- (d) (**twierdzenie o trzech ciągach**) *Jeśli*  $a_n \leq c_n \leq b_n$  *oraz*  $\lim_n a_n = \lim_n b_n$ , *to ciąg*  $c_n$  *jest zbieżny oraz*  $\lim_n c_n = \lim_n a_n$ .

*Dowód.* (a) Oznaczmy  $\lim_n a_n = g$ . Wtedy teza wynika natychmiast z nierówności

$$||a_n| - |g|| \leq |a_n - g|.$$

(d) Z założenia mamy

$$0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n. \quad (1.3)$$

Dalej

$$\lim_n (b_n - a_n) = \lim_n b_n + \lim_n (-a_n) = \lim_n b_n - \lim_n a_n = 0.$$

Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  mamy  $0 \leq b_n - a_n < \varepsilon$ . Wtedy z (1.3)

$$0 \leq c_n - a_n < \varepsilon, \quad \text{dla } n > N.$$

Stąd  $\lim_n (c_n - a_n) = 0$ . Ciąg  $c_n$  jest zbieżny jako suma ciągów  $c_n - a_n$  oraz  $a_n$ . Ponadto  $\lim_n c_n = \lim_n a_n$ .  $\square$

**Definicja 1.9.** *Dla ciągu*  $\{a_n\}$  *i ściśle rosnącego ciągu liczb naturalnych*  $m_n$  *ciąg*  $\{a_{m_n}\}$  *nazywamy podciągiem.*

**Przykłady.**  $a_{n^2}$ ,  $a_{n!}$ ,  $a_{p_n}$ , gdzie  $p_n$  jest  $n$ -tą liczbą pierwszą.

Dla rosnącego ciągu  $m_n$  liczb naturalnych mamy  $m_n \geq n$ .

**Twierdzenie 1.10.** *Podciąg ciągu zbieżnego jest zbieżny do tej samej liczby co pełny ciąg.*

*Dowód.* Oznaczmy  $g = \lim_n a_n$ . Dla liczby  $\varepsilon > 0$  rozważamy przedział  $(g - \varepsilon, g + \varepsilon)$ . Z założenia prawie wszystkie wyrazy ciągu  $a_n$  znajdują się w tym przedziale. Tym bardziej prawie wszystkie wyrazy podciągu  $a_{m_n}$  tam się znajdują.  $\square$

**Uwaga.** Prawdziwe jest twierdzenie odwrotne: jeśli każdy podciąg ciągu  $a_n$  zawiera podciąg zbieżny do liczby  $g$ , to cały ciąg jest zbieżny do  $g$ .

**Twierdzenie 1.11** (Bolzano, Weierstrass). *Każdy ciąg ograniczony zawiera podciąg zbieżny.*

*Dowód.* Załóżmy, że wyrazy ciągu  $c_n$  znajdują się w przedziale  $[a_1, b_1]$ . Będziemy konstruować podciąg  $d_n$  ciągu  $c_n$ . Niech  $d_1 := c_1$ . Przynajmniej jeden z przedziałów  $[a_1, (a_1 + b_1)/2]$ ,  $[(a_1 + b_1)/2, b_1]$  zawiera nieskończenie wyrazów ciągu  $c_n$ . Oznaczmy ten przedział przez  $[a_2, b_2]$ . Niech  $m_2$  oznacza najmniejszy wskaźnik, większy niż 1, dla którego  $c_{m_2} =: d_2$  leży w  $[a_2, b_2]$ . Dalej jeden z przedziałów  $[a_2, (a_2 + b_2)/2]$ ,  $[(a_2 + b_2)/2, b_2]$  zawiera nieskończenie wyrazów ciągu  $c_n$ . Końce tego przedziału oznaczmy przez  $a_3$  i  $b_3$ . Podobnie jak wcześniej wybieramy najmniejszy wskaźnik  $m_3 > m_2$ , dla którego  $c_{m_3} =: d_3$  leży w  $[a_3, b_3]$ . Postępując tak dalej otrzymamy nieskończony ciąg przedziałów  $[a_n, b_n]$  oraz podciąg  $d_n := c_{m_n}$  o własnościach

$$d_n \in [a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}], \quad b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1}).$$

Mamy

$$a_1 \leq a_{n-1} \leq a_n \leq b_n \leq b_{n-1} \leq b_1.$$

Ciąg  $a_n$  jest rosnący i ograniczony, natomiast ciąg  $b_n$  jest malejący i też ograniczony. Zatem ciągi te są zbieżne. Z równości

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1)$$

wynika  $\lim_n (b_n - a_n) = 0$ . Zatem  $\lim_n b_n = \lim_n a_n$ . Ponieważ  $a_n \leq d_n \leq b_n$ , to z twierdzenia o trzech ciągach otrzymujemy, że ciąg  $d_n$  jest zbieżny.  $\square$

Czasami chcemy rozpoznać, czy dany ciąg jest zbieżny, ale nie potrafimy wskazać granicy. Wtedy możemy użyć warunku Cauchy'ego.

**Definicja 1.12.** *Mówimy, że ciąg spełnia warunek Cauchy'ego jeśli dla dużych wskaźników wyrazy ciągu leżą blisko siebie. Ścisłe: dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje próg  $N$  taki, że dla  $m, n > N$  mamy  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ .*

**Przykłady.**

(a)

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}.$$

Założmy, że  $n > m$ . Wtedy:

$$\begin{aligned} a_n - a_m &= \frac{1}{(m+1)^2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \\ &< \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right) + \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{m} - \frac{1}{n} < \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

Chcemy, aby  $1/m < \varepsilon$ . Niech  $N = [1/\varepsilon]$ . Wtedy dla  $n > m > N$  mamy  $1/m < \varepsilon$ , zatem

$$0 < a_n - a_m < \frac{1}{m} < \varepsilon.$$

(b)

$$b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}.$$

Obliczamy

$$b_{2n} - b_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ składników}} = \frac{1}{2}.$$

Zatem warunek Cauchy'ego nie jest spełniony.

**Twierdzenie 1.13.** Ciąg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunki Cauchy'ego.

*Dowód.* ( $\implies$ ) Niech  $g = \lim_n a_n$ . Wtedy

$$|a_n - a_m| = |(a_n - g) - (a_m - g)| \leq |a_n - g| + |a_m - g|.$$

Z założenia dla liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje próg  $N$ , dla którego  $|a_k - g| < \frac{\varepsilon}{2}$  dla  $k > N$ . Niech  $n, m > N$ . Wtedy

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

( $\impliedby$ ) Pokażemy, że ciąg  $a_n$  jest ograniczony. Dla  $\varepsilon = 1$  istnieje próg  $N$  (liczba



naturalna) taki, że  $|a_n - a_m| < 1$  dla  $n, m > N$ . Niech

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a_{N+1}| + 1\}.$$

Wtedy  $|a_n| \leq M$  dla wszystkich  $n$ . Rzeczywiście:

(1) Dla  $n = 1, 2, \dots, N$  mamy  $|a_n| \leq M$  w oczywisty sposób.

(2) Dla  $n > N$  mamy  $|a_n - a_{N+1}| < 1$  zatem

$$|a_n| = |(a_n - a_{N+1}) + a_{N+1}| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < 1 + |a_{N+1}| \leq M.$$

Z twierdzenia Bolzano-Weierstrassa ciąg  $a_n$  posiada podciąg zbieżny. Niech  $g = \lim_n a_{m_n}$ . Pokażemy, że  $\lim_n a_n = g$ . Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Istnieje próg  $N_1$  taki, że  $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$  dla  $n, m > N_1$ . Dalej istnieje próg  $N_2$  taki, że dla  $n > N_2$  mamy  $|a_{m_n} - g| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Określmy  $N = \max(N_1, N_2)$ . Wtedy dla  $n > N$  otrzymujemy  $m_n \geq n > N$ , zatem

$$|a_n - g| = |(a_n - a_{m_n}) + (a_{m_n} - g)| \leq |a_n - a_{m_n}| + |a_{m_n} - g| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

**Definicja 1.14.** Mówimy, że ciąg  $a_n$  jest rozbieżny do nieskończoności ( $\infty$ ) jeśli dla dowolnej liczby  $M$  istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  mamy  $a_n > M$ , tzn. w przedziale  $(M, \infty)$  znajdują się prawie wszystkie wyrazy ciągu.

**Przykład.**

$$b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}.$$

Wiemy, że  $b_{2n} - b_n > \frac{1}{2}$ . Zatem

$$b_{2^n} = (b_{2^n} - b_{2^{n-1}}) + (b_{2^{n-1}} - b_{2^{n-2}}) + \dots + (b_2 - b_1) + b_1 \geq \frac{n}{2} + 1.$$

Dla liczby naturalnej  $k \geq 2$  mamy  $2^n \leq k < 2^{n+1}$  dla pewnej wartości  $n$ . Wtedy  $n + 1 > \log_2 k$  oraz

$$b_k \geq b_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \geq \frac{n+1}{2} > \frac{1}{2} \log_2 k.$$

**Definicja 1.15.** Liczbę  $\alpha$  nazywamy punktem skupienia ciągu  $a_n$  jeśli można znaleźć podciąg  $a_{n_k}$  zbieżny do  $\alpha$ .

**Uwaga.** Zbieżny ciąg posiada tylko jeden punkt skupienia.

**Przykłady.**

- (a)  $a_n = (-1)^n$ . Wtedy  $a_{2n} = 1$  i  $a_{2n+1} = -1$ .
- (b)  $a_n = \sin n$ . Zbiór punktów skupienia jest równy  $[-1, 1]$ .
- (c) Rozważmy ciąg

$$1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

Wtedy zbiór punktów skupienia jest równy  $\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ .

**Twierdzenie 1.16.** *Dla ograniczonego ciągu  $a_n$  istnieją najmniejszy i największy punkt skupienia nazywane granicą dolną i górną ciągu i oznaczane symbolami  $\liminf a_n$  oraz  $\limsup a_n$ .*

Dla ciągu z przykładu (c) granica dolna wynosi 0, a górna 1.

**Uwaga.** Można udowodnić, że

$$\liminf a_n = \sup_n \inf_{m \geq n} a_m, \quad \limsup a_n = \inf_n \sup_{m \geq n} a_m.$$

**1.2 Liczba  $e$** 

Rozważmy dwa ciągi

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Mamy  $x_n < y_n$ . Obliczamy

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq \left(1 - \frac{1}{(n+1)}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1. \end{aligned}$$

W ostatniej linii skorzystaliśmy z nierówności Bernoulli'ego  $(1+x)^n \geq 1+nx$  dla  $x > -1$ . Udowodniliśmy, że ciąg  $x_n$  jest rosnący. Dalej

$$\begin{aligned} \frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \left(\frac{n^2}{(n+1)(n-1)}\right)^{n+1} \frac{n-1}{n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \frac{n-1}{n} \geq \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \frac{n-1}{n} = 1. \end{aligned}$$

Zatem  $y_n$  jest ciągiem malejącym. Mamy zatem

$$2 = x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq y_n \leq \dots \leq y_2 \leq y_1 = 4.$$

Oba ciągi są więc zbieżne. Oznaczmy

$$e = \lim_n x_n = \lim_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Wtedy

$$y_n = x_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e.$$

Znajdziemy teraz inną przydatną postać liczby  $e$ . Mamy

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \end{aligned}$$

Ustalmy liczbę naturalną  $m$ . Dla  $n > m$  mamy

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + \sum_{k=1}^m \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \frac{1}{k!} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!} \end{aligned}$$

Przechodzimy z  $n$  do nieskończoności i otrzymujemy

$$e \geq 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!}.$$

Reasumując mamy

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq e.$$

Zatem

$$e = \lim_n \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}\right).$$

**Twierdzenie 1.17.** Liczba  $e$  ma przedstawienie

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta(n)}{n!n},$$

gdzie  $0 < \theta(n) < 1$ .

*Dowód.* Dla  $m > n$  mamy

$$\begin{aligned} c_m &:= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \dots + \frac{1}{m!} \\ &= c_n + \frac{1}{(n+1)!} \left[ 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots + \frac{1}{(n+2)(n+3)\dots m} \right] \\ &< c_n + \frac{1}{(n+1)!} \left[ 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+2)^{m-n-1}} \right] \\ &= c_n + \frac{1}{(n+1)!} \frac{1 - \frac{1}{(n+2)^{m-n}}}{1 - \frac{1}{n+2}} < c_n + \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1} \end{aligned}$$

Przechodząc do granicy, gdy  $m \rightarrow \infty$  otrzymujemy

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < e \leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!n} \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}.$$

Zatem

$$0 < e - \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \leq \frac{1}{n!n} \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} < \frac{1}{n!n}.$$

Stąd otrzymujemy tezę twierdzenia. □

**Wniosek 1.18.** Liczba  $e$  jest niewymierna.

*Dowód.* Symbolem  $\{x\}$  oznaczamy część ułamkową liczby  $x$ . Gdyby  $e = \frac{p}{q}$ , dla liczby naturalnych  $p$  i  $q$ , to  $\{q!e\} = 0$ . Ale z poprzedniego twierdzenia mamy

$$\{n!e\} = \left\{ \frac{\theta(n)}{n} \right\} \neq 0.$$

□

Wiemy, że

$$\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < e < \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}.$$

Zastosujmy logarytm przy podstawie  $e$  do nierówności. Otrzymamy

$$\frac{1}{n+1} < \log \left( 1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}. \quad (1.4)$$

Rozważmy ciąg

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log(n+1).$$

Mamy

$$u_n - u_{n-1} = \frac{1}{n} - \log(n+1) + \log n = \frac{1}{n} - \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0,$$

na podstawie pierwszej nierówności w (1.4). Rozważmy inny ciąg

$$v_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n.$$

Mamy

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \log(n+1) + \log n = \frac{1}{n+1} - \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

na podstawie drugiej nierówności w (1.4). Dla  $n > 1$  otrzymujemy

$$u_1 < u_n < v_n < v_1.$$

Zatem oba ciągi są zbieżne jako ciągi monotoniczne i ograniczone. Ponieważ  $v_n = u_{n-1} + \frac{1}{n}$ , to granice obu ciągów są równe. Oznaczmy symbolem  $c$  tę granicę. Wtedy

$$0 < 1 - \log 2 = u_1 < c < v_1 = 1.$$

Reasumując

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n\right) = c, \quad 0 < c < 1. \quad (1.5)$$

Liczbę  $c$  nazywamy stałą Eulera.

## 2 Szeregi liczbowe

Dla ciągu  $a_n$  określamy ciąg sum częściowych  $s_n$  wzorem

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

W szczególności  $s_5 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ . Jeśli ciąg  $s_n$  jest zbieżny (do granicy  $s$ ), to mówimy, że szereg jest zbieżny i zapisujemy

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s.$$

**Przykłady.**

(a) Rozważmy ciąg geometryczny  $a_n = q^n$  dla  $|q| < 1$ . Wtedy

$$s_n = q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q - q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow{n} \frac{q}{1 - q},$$

bo  $q^n \xrightarrow{n} 0$ , dla  $|q| < 1$ .<sup>\*</sup> Zatem

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1 - q}.$$

(b) Rozważmy szereg harmoniczny o wyrazach  $a_n = \frac{1}{n}$ . Wiemy, że

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} > \log n.$$

Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  jest rozbieżny (do nieskończoności).

**Twierdzenie 2.1** (Warunek Cauchy'ego dla szeregu). Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunek, że dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > m > N$  mamy

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| < \varepsilon.$$

*Dowód.* Dla  $n > m$  mamy

$$|s_n - s_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| < \varepsilon.$$

To oznacza, że warunek w twierdzeniu jest identyczny z warunkiem Cauchy'ego dla ciągu  $s_n$ .  $\square$

**Twierdzenie 2.2.** Jeśli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny, to  $\lim_n a_n = 0$ .

*Dowód.* Mamy  $a_n = s_n - s_{n-1}$ . Oznaczmy  $s = \lim_n s_n$ . Wtedy

$$\lim_n a_n = \lim_n s_n - \lim_n s_{n-1} = s - s = 0.$$

$\square$

---

<sup>\*</sup>Wystarczy pokazać  $|q|^n \rightarrow 0$ , czyli rozważać  $0 < q < 1$ . Niech  $1/q = 1 + a$ , dla  $a > 0$ . Wtedy  $1/q^n = (1 + a)^n > 1 + na$ . Czyli  $0 < q^n < 1/(1 + na)$ .

**Uwaga.** Warunek w tezie nie wystarcza do zbieżności szeregu. Na przykład szereg o wyrazach

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \dots$$

nie jest zbieżny. Ile wynosi wyraz szeregu o numerze 2014? Które numery mają wyrazy szeregu o wartości  $1/2014$ ?

**Twierdzenie 2.3.** Dla każdego szeregu zbieżnego ciąg sum częściowych jest ograniczony.

*Dowód.* Ciąg  $s_n$  spełnia warunek Cauchy'ego więc jest ograniczony.  $\square$

**Twierdzenie 2.4.** Załóżmy, że szeregi  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  i  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  są zbieżne. Wtedy zbieżne są szeregi  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$  i  $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n$  oraz

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n &= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \end{aligned}$$

**Definicja 2.5.** Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest bezwzględnie zbieżny jeśli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  jest zbieżny.

**Twierdzenie 2.6.** Szereg bezwzględnie zbieżny jest zbieżny.

*Dowód.* Teza wynika z nierówności dla  $n > m$

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| \leq |a_{m+1}| + |a_{m+2}| + \dots + |a_n|.$$

Zatem warunek Cauchy'ego dla szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  pociąga ten warunek dla szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .  $\square$

**Uwaga.** Zbieżny szereg nie musi być bezwzględnie zbieżny. Na przykład szereg o wyrazach

$$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \dots$$

jest zbieżny do liczby 0, ale nie jest zbieżny bezwzględnie.

**Uwaga.** Zbieżność ciągu  $a_n$  i szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  nie zależy od zachowania się skończonej liczby początkowych wyrazów. Tzn. jeśli  $a_n = b_n$  dla  $n > N$  to ciągi  $a_n$  i  $b_n$  są jednocześnie zbieżne lub jednocześnie rozbieżne. To samo dotyczy szeregów  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  i  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .

**Twierdzenie 2.7** (Kryterium Dirichleta). *Załóżmy, że ciąg  $a_n$  jest malejący oraz  $a_n \xrightarrow{n} 0$ . Załóżmy również, że sumy częściowe ciągu  $b_n$  są ograniczone (tzn. ciąg o wyrazach  $s_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$  jest ograniczony). Wtedy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  jest zbieżny.*

*Dowód.* Sprawdzimy warunek Cauchy'ego. Z założenia  $|s_n| \leq M$ . Niech  $n > m$ . Wtedy

$$\begin{aligned} & |a_{m+1}b_{m+1} + a_{m+2}b_{m+2} + \dots + a_n b_n| \\ &= |a_{m+1}(s_{m+1} - s_m) + a_{m+2}(s_{m+2} - s_{m+1}) + \dots + a_n(s_n - s_{n-1})| \\ &= |-a_{m+1}s_m + (a_{m+1} - a_{m+2})s_{m+1} + (a_{m+2} - a_{m+3})s_{m+2} + \dots + (a_{n-1} - a_n)s_{n-1} + a_n s_n| \\ &\leq a_{m+1}|s_m| + (a_{m+1} - a_{m+2})|s_{m+1}| + (a_{m+2} - a_{m+3})|s_{m+2}| + \dots + (a_{n-1} - a_n)|s_{n-1}| + a_n|s_n| \\ &\leq M[a_{m+1} + (a_{m+1} - a_{m+2}) + (a_{m+2} - a_{m+3}) + \dots + (a_{n-1} - a_n) + a_n] = 2Ma_{m+1}. \end{aligned}$$

Dla  $\varepsilon > 0$  istnieje liczba naturalna  $m_0$  taka, że  $a_{m_0} < \frac{\varepsilon}{2M}$ . Wtedy dla  $m \geq m_0$  mamy

$$|a_{m+1}b_{m+1} + a_{m+2}b_{m+2} + \dots + a_n b_n| \leq 2Ma_{m+1} \leq 2Ma_{m_0} < \varepsilon.$$

□

**Przykład.** Rozważamy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ . Dla  $x = k\pi$  szereg jest zbieżny,

bo każdy wyraz się zeruje. Załóżmy, że  $x \neq 2k\pi$ . Przyjmujemy  $a_n = \frac{1}{n}$  oraz  $b_n = \sin nx$ . Będziemy korzystać ze wzoru trygonometrycznego

$$\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\beta - \alpha}{2} \sin \frac{\beta + \alpha}{2}.$$



Badamy sumy częściowe ciągu  $b_n$ .

$$\begin{aligned} & \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left( 2 \sin \frac{x}{2} \sin x + 2 \sin \frac{x}{2} \sin 2x + \dots + 2 \sin \frac{x}{2} \sin nx \right) \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left[ \left( \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right) + \left( \cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{5x}{2} \right) + \dots + \left( \cos \frac{(2n-1)x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left( \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right) = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}. \end{aligned}$$

Otrzymujemy

$$|\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}.$$

**Wniosek 2.8** (kryterium Leibniza o szeregu naprzemiennym). *Jeśli ciąg  $a_n$  jest malejący oraz  $a_n \xrightarrow{n} 0$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$  jest zbieżny.*

*Dowód.* Przyjmujemy  $b_n = (-1)^{n+1}$ . Wtedy sumy częściowe ciągu  $b_n$  mają postać  $s_{2n} = 0$  i  $s_{2n+1} = 1$ . Zatem szereg jest zbieżny.  $\square$

**Przykład** Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  jest zbieżny z kryterium Leibniza. Ze wzoru (1.5) można wykazać, że szereg jest zbieżny do liczby  $\log 2$ .

**Wniosek 2.9.** *Jeśli  $a_n$  jest zbieżnym ciągiem monotonicznym a szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  jest zbieżny, to zbieżny jest szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ .*

*Dowód.* Możemy założyć, że ciąg  $a_n$  jest malejący. Oznaczmy  $a = \lim_n a_n$ .

Wtedy  $a_n - a \searrow_n 0$ . Z twierdzenia Dirichleta szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a) b_n$  jest zbieżny.

Ale

$$a_n b_n = (a_n - a) b_n + a b_n,$$

zatem szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  jest zbieżny.  $\square$

**Twierdzenie 2.10** (Kryterium porównawcze). *Założmy, że  $0 \leq a_n \leq b_n$ . Jeśli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  jest zbieżny, to zbieżny jest szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .*

**Wniosek 2.11.** *Jeśli  $0 \leq a_n \leq b_n$  oraz szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny, to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  też jest rozbieżny.*

**Przykład.** Badamy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4 + 8n}{2n^5 + n^2 + 4}$ .

$$\frac{n^4 + 8n}{2n^5 + n^2 + 4} \geq \frac{n^4}{2n^5 + n^5 + 4n^5} = \frac{1}{7n}.$$

Wiemy, że  $\sum \frac{1}{n} = \infty$ , więc badany szereg jest rozbieżny.

**Twierdzenie 2.12** (Kryterium Cauchy'ego). *Założmy, że*

$$a = \lim_n \sqrt[n]{|a_n|}.$$

(i) *Jeśli  $a < 1$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest bezwzględnie zbieżny.*

(ii) *Jeśli  $a > 1$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny.*

**Uwaga.** Kryterium nie rozstrzyga zbieżności, gdy  $a = 1$ . Dla szeregów  $\sum \frac{1}{n^2}$  mamy  $a = 1$ . Pierwszy z szeregów jest zbieżny a drugi rozbieżny.

*Dowód.* (i)  $a < 1$ . Niech  $r = \frac{a+1}{2}$ . Wtedy  $a < r < 1$ . Istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  mamy  $\sqrt[n]{|a_n|} < r$ . Zatem  $|a_n| < r^n$  dla  $n \geq N + 1$ . Z kryterium porównawczego szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  jest zbieżny.

(ii)  $a > 1$ . Dla  $r = \frac{a+1}{2}$  istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  mamy  $\sqrt[n]{|a_n|} > r > 1$ . Tzn.  $|a_n| > r^n$  dla  $n > N$ , czyli  $a_n$  jest rozbieżny do nieskończoności.  $\square$

---

**Twierdzenie 2.13** (Kryterium d'Alemberta). *Załóżmy, że*

$$\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = a.$$

(i) *Jeśli  $a < 1$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest bezwzględnie zbieżny.*

(ii) *Jeśli  $a > 1$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny.*

*Dowód.* Zastosujemy oznaczenia z dowodu kryterium Cauchy'ego.

(i) Istnieje  $N$  takie, że dla  $n > N$  mamy  $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < r$ . Wtedy

$$|a_n| = \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} \cdot \frac{|a_{n-1}|}{|a_{n-2}|} \cdot \dots \cdot \frac{|a_{N+2}|}{|a_{N+1}|} |a_{N+1}| < r^{n-N-1} |a_{N+1}| = \frac{|a_{N+1}|}{r^{N+1}} r^n. \quad (2.1)$$

Z kryterium porównawczego szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  jest zbieżny.

(ii). Istnieje  $N$  takie, że dla  $n > N$  mamy  $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > r > 1$ . Ze wzoru (2.1) otrzymujemy wtedy

$$|a_n| > \frac{|a_{N+1}|}{r^{N+1}} r^n.$$

Zatem  $|a_n| \xrightarrow[n]{\infty} \infty$ . □

**Uwaga.** Można udowodnić, że z istnienia granicy  $\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$  wynika

$$\lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}.$$

**Wniosek 2.14.** *Jeśli ciąg  $a_n$  spełnia założenia kryterium Cauchy'ego lub d'Alemberta, to dla  $a < 1$  ciąg ten jest zbieżny do zera, a dla  $a > 1$  wartości bezwzględne wyrazów dążą do nieskończoności.*

**Przykłady.**

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ . Stosujemy kryterium d'Alemberta

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \xrightarrow{n} 0.$$

(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{3^n}$ , dla  $k \in \mathbb{N}$ . Używamy kryterium Cauchy'ego.

$$\sqrt[n]{\frac{n^k}{3^n}} = \frac{1}{3} (\sqrt[n]{n})^k \xrightarrow{n} \frac{1}{3}.$$

(c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ . Wygodniej będzie użyć kryterium d'Alemberta.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \xrightarrow{n} \frac{1}{e} < 1.$$

Zatem szereg jest zbieżny.

**Twierdzenie 2.15** (Cauchy'ego o zagęszczaniu). *Załóżmy, że ciąg  $a_n$  jest malejący oraz  $a_n \xrightarrow{n} 0$ . Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ .*

**Przykłady.**

(a) Rozważmy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ , dla  $\alpha > 0$ . Szereg zagęszczony ma postać

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^{n\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{\alpha-1}} \right)^n.$$

Szereg ten jest zbieżny tylko jeśli  $2^{\alpha-1} > 1$ , czyli dla  $\alpha > 1$ .

(b) Niech  $a_n = \frac{1}{n \log^\alpha n}$ , dla  $n \geq 2$  oraz  $\alpha > 0$ . Wtedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^n (\log 2^n)^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \log^\alpha 2}.$$

Zatem szereg jest zbieżny tylko dla  $\alpha > 1$ .

(c) Można pokazać, że szereg o wyrazach

$$a_n = \frac{1}{n \log n (\log \log n)^\alpha},$$

jest zbieżny tylko dla  $\alpha > 1$ .

*Dowód twierdzenia o zagęszczaniu.* ( $\Rightarrow$ ) Mamy

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n 2^k a_{2^k} &= a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \dots + 2^{n-1} a_{2^n} \\ &\leq a_2 + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6 + a_7 + a_8) + \dots + (a_{2^{n-1}+1} + \dots + a_{2^n}) \\ &\leq \sum_{k=1}^{2^n} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k =: s. \end{aligned}$$

Zatem  $\sum_{k=1}^n 2^k a_{2^k} \leq 2s$ . To oznacza, że sumy częściowe szeregu  $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$  są ograniczone od góry. Stąd szereg jest zbieżny, bo sumy częściowe tworzą ciąg rosnący.

( $\Leftarrow$ ) Obliczamy

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &\leq \sum_{k=1}^{2^n-1} a_k \\ &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \dots + (a_{2^{n-1}} + \dots + a_{2^n-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \dots + 2^{n-1}a_{2^{n-1}} \leq a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k} =: \tilde{s}. \end{aligned}$$

Sumy częściowe szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  są ograniczone przez  $\tilde{s}$ , zatem szereg jest zbieżny. □

Dla zbieżnego szeregu  $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  określamy ciąg  $n$ -tych ogonów wzorem

$$r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k. \text{ Mamy}$$

$$s_n + r_n = s, \quad r_n = s - s_n,$$

zatem

$$\lim_n r_n = \lim_n (s - s_n) = 0.$$

## 2.1 Łączność i przemienność w sumie nieskończonej

Jeśli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny, to zbieżny jest szereg postaci

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \dots + a_{n_2}) \\ + \dots + (a_{n_k+1} + a_{n_k+2} + \dots + a_{n_{k+1}}) + \dots \end{aligned} \quad (2.2)$$

Sumy częściowe szeregu (2.2) mają postać

$$s_{n_1}, s_{n_2}, \dots, s_{n_k}, \dots,$$

zatem ciąg  $s_{n_k}$  jest podciągiem ciągu  $s_n$ .

**Uwaga.** Wynikanie odwrotne nie jest spełnione. Szereg (2.2) po otworzeniu nawiasów może być rozbieżny:

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots + (-1 + 1) + \dots$$

Jeśli w każdym nawiasie szeregu wyrazy mają ten sam znak i szereg (2.2) jest zbieżny (do  $s$ ), to szereg bez nawiasów też jest zbieżny. Rzeczywiście, zauważmy, że jeśli  $n_k < n < n_{k+1}$ , to suma  $s_n$  leży pomiędzy  $s_{n_k}$  i  $s_{n_{k+1}}$ . Dla dużych wskaźników  $k$  liczby  $s_{n_k}$  i  $s_{n_{k+1}}$  leżą blisko liczby  $s$ . Wtedy wielkości  $s_n$  dla  $n_k < n < n_{k+1}$  również leżą blisko  $s$ .

Permutacją zbioru liczb naturalnych nazywamy ciąg  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n, \dots$  złożony z liczb naturalnych, w którym każda liczba występuje dokładnie raz, np.

$$2, 1, 4, 3, \dots, 2n, 2n - 1, \dots$$

**Twierdzenie 2.16.** *Jeśli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest bezwzględnie zbieżny, to szereg*

*$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma_n}$  jest zbieżny dla dowolnej permutacji  $\sigma$  oraz*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma_n}.$$

**Uwaga.** Założenie bezwzględnej zbieżności jest istotne. Rozważmy szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Mamy

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right) - \dots - < 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right)}_{> 0} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{4n-3} + \frac{1}{4n-1} - \frac{1}{2n}\right)}_{> 0} + \dots > 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}.$$

*Dowód.* Oznaczmy  $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Istnieje liczba naturalna

$N$ , dla której  $\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Rozważamy permutację  $\{\sigma_n\}$ . Istnieje liczba naturalna  $M$  taka, że wśród liczb  $a_{\sigma_1}, a_{\sigma_2}, \dots, a_{\sigma_M}$  występują wszystkie wyrazy

$a_1, a_2, \dots, a_N$ . Niech  $n > M$ . Wtedy

$$\sum_{k=1}^m a_{\sigma_k} - s = \left( \sum_{k=1}^m a_{\sigma_k} - \sum_{k=1}^N a_k \right) - \sum_{k=N+1}^{\infty} a_k.$$

W nawiasie wyrazy się uprością i pozostaną tylko wyrazy o numerach większych od  $N$ . Zatem

$$\left| \sum_{k=1}^m a_{\sigma_k} - s \right| \leq \left| \sum_{k=1}^m a_{\sigma_k} - \sum_{k=1}^N a_k \right| + \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| \leq 2 \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| < \varepsilon.$$

□

**Twierdzenie 2.17** (Riemann). *Jeśli szereg jest zbieżny warunkowo, tzn. jest zbieżny, ale  $\sum |a_n| = \infty$ , to poprzez zmianę kolejności wyrazów można uzyskać szereg zbieżny do z góry ustalonej liczby, rozbieżny do  $-\infty$ ,  $+\infty$  lub szereg rozbieżny.*

## 2.2 Mnożenie Cauchy'ego szeregów.

Rozważmy dwa wielomiany  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  oraz  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  (zakładamy, że  $a_n = b_n = 0$  dla dużych  $n$ ). Mnożymy te wielomiany i grupujemy wyrazy z tą samą potęgą przy  $x$ :

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n + \dots) \\ & \quad = a_0b_0 + (a_1b_0 + a_0b_1)x + (a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2)x^2 + \dots \\ & + (a_nb_0 + a_{n-1}b_1 + \dots + a_1b_{n-1} + a_0b_n)x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_{n-k}b_k \right) x^n. \end{aligned}$$

Podstawmy  $x = 1$  aby otrzymać

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_{n-k}b_k. \quad (2.3)$$



Wzór (2.3) można uzasadnić w inny sposób. Chcemy pomnożyć  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  i  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ .

Tworzymy tabelę mnożenia

	$b_0$	$b_1$	$b_2$	$\dots$	$b_{n-1}$	$b_n$	$\dots$
$a_0$	$a_0b_0$	$a_0b_1$	$a_0b_2$			$a_0b_n$	
$a_1$	$a_1b_0$	$a_1b_1$			$a_1b_{n-1}$		
$a_2$	$a_2b_0$						
$\vdots$			$\ddots$				
$a_{n-1}$		$a_{n-1}b_1$					
$a_n$	$a_nb_0$						
$\vdots$							

Następnie sumujemy wyrazy na przekątnych i wyniki dodajemy.

**Twierdzenie 2.18.** *Jeśli szeregi  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  i  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  są zbieżne, przy czym co najmniej jeden z nich bezwzględnie, to szereg o wyrazach  $c_n = \sum_{k=0}^n a_{n-k}b_k$  jest zbieżny oraz*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$

**Uwaga.** Założenie bezwzględnej zbieżności jest istotne. Niech  $a_0 = b_0 = 0$  oraz

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad n \geq 1.$$

Wtedy

$$c_n = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{(n-k)k}}.$$

Korzystając z nierówności  $2ab \leq a^2 + b^2$  otrzymamy

$$\sqrt{(n-k)k} \leq \frac{(n-k) + k}{2} = \frac{n}{2}.$$

Zatem

$$|c_n| = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{(n-k)k}} \geq \frac{2(n-1)}{n}.$$

To oznacza, że ciąg  $c_n$  nie jest zbieżny do 0, czyli szereg o wyrazach  $c_n$  nie może być zbieżny.

### 3 Funkcje i granice

Jeśli każdej liczbie z pewnego podzbioru  $E \subseteq \mathbb{R}$  przyporządkowana jest jakaś liczba rzeczywista, to mamy do czynienia z funkcją. Funkcja składa się z dziedziny  $E$  oraz przepisu, który mówi jakie liczby należy przyporządkować liczbom z  $E$ . Zwykle przepis podany jest wzorem  $y = f(x)$ .

#### Przykłady.

(a)  $E = (0, 1)$ ,  $f(x) = x$ .

(b)  $E = (0, \infty)$ ,  $f(x) = \sqrt{x}$ .

(c)  $E = (-1, 1)$ ,  $f(x) = \begin{cases} \sin x & -1 < x < 0, \\ 5 & x = 0, \\ x^2 & 0 < x < 1. \end{cases}$ .

**Definicja 3.1** (intuicyjna). *Załóżmy, że funkcja  $f(x)$  jest określona wokół punktu  $a$  (ale niekoniecznie w punkcie  $a$ ). Mówimy, że liczba  $g$  jest granicą funkcji  $f(x)$  w punkcie  $a$ , jeśli wartości  $f(x)$  leżą coraz bliżej liczby  $g$  dla argumentów  $x$  leżących coraz bliżej liczby  $a$ , ale  $x \neq a$ . Piszemy wtedy  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g$ .*

Powyższa definicja wystarcza do obliczenia większości granic. Uściślenia tej definicji można wykonać na dwa sposoby.

**Definicja 3.2** (Heine). *Załóżmy, że funkcja  $f(x)$  jest określona wokół punktu  $a$  (ale niekoniecznie w punkcie  $a$ ). Mówimy, że liczba  $g$  jest granicą funkcji  $f(x)$  w punkcie  $a$  jeśli dla każdego ciągu  $x_n$  zbieżnego do  $a$ , ale  $x_n \neq a$ , ciąg  $f(x_n)$  jest zbieżny do liczby  $g$ .*

#### Przykłady.

(a)  $E = \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ . Wtedy  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ . Rzeczywiście, niech  $x_n \xrightarrow[n]{} 0$ ,  $x_n \neq 0$ . Wtedy  $x_n^2 \xrightarrow[n]{} 0$ .

(b)  $E = (-1, 0) \cup (0, 1)$ ,  $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ . Ile wynosi  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  ?

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x\sqrt{x+1}} = \frac{x}{x\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)}.$$

Gdy  $x_n \xrightarrow[n]{} 0$ , to  $f(x_n) \xrightarrow[n]{} \frac{1}{2}$ .

**Definicja 3.3** (Cauchy). *Mówimy, że liczba  $g$  jest granicą funkcji  $f(x)$  w punkcie  $a$  jeśli dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że jeśli  $0 < |x - a| < \delta$ , to  $|f(x) - g| < \varepsilon$ .*

**Uwaga.** Definicja Cauchy'ego odpowiada definicji intuicyjnej. Osoba wątpiąca, że  $f(x)$  może znaleźć się blisko  $g$ , wyraża żądanie, aby odległość  $f(x)$  i  $g$  była mniejsza niż  $\varepsilon$ , np. dla  $\varepsilon = 0,0001$ . Naszym zadaniem jest wskazanie liczby  $\delta > 0$ , która zagwarantuje, że jeśli odległość argumentu  $x \neq a$  od  $a$  jest mniejsza niż  $\delta$ , to faktycznie odległość  $f(x)$  od  $g$  będzie mniejsza niż  $\varepsilon$ . Po wykonaniu zadania osoba wątpiąca może zmniejszyć wartość  $\varepsilon$  np. do  $0,00001$ . Wtedy my musimy znaleźć nową (zwykle znacznie mniejszą) wartość dla liczby  $\delta$ , aby zaspokoić żądanie. Jeśli potrafimy to zrobić dla dowolnej wartości  $\varepsilon$ , to faktycznie granica funkcji w punkcie  $a$  jest równa liczbie  $g$ .

**Przykład.**  $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$ . Chcemy obliczyć granicę w punkcie 1 z definicji Cauchy'ego. Mamy  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 1}$ . Z definicji intuicyjnej widać, że granica w 1 wynosi  $\frac{1}{2}$ . Mamy

$$\left| f(x) - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{|1 - \sqrt{x}|}{2(\sqrt{x} + 1)} = \frac{|x - 1|}{2(\sqrt{x} + 1)^2} \leq \frac{1}{2}|x - 1|.$$

Dla liczby  $\varepsilon > 0$  niech  $\delta = 2\varepsilon$ . Wtedy dla  $0 < |x - 1| < 2\varepsilon$  mamy

$$|f(x) - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}|x - 1| < \varepsilon.$$

**Uwaga.** Zapis kwantyfikatorski definicji Cauchy'ego ma postać

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \{ 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - g| < \varepsilon \}.$$

**Twierdzenie 3.4.** *Definicje granicy według Cauchy'ego i Heinego są równoważne.*

*Dowód.* Udowodnimy tylko implikację (H)  $\implies$  (C). Załóżmy nie wprost, że liczba  $g$  nie jest granicą funkcji  $f(x)$  w punkcie  $a$  w sensie Cauchy'ego. To oznacza, że istnieje liczba  $\varepsilon > 0$  taka, że dla dowolnej liczby  $\delta > 0$  można znaleźć argument  $x$  spełniający  $0 < |x - a| < \delta$ , ale  $|f(x) - g| \geq \varepsilon$ . Przyjmijmy  $\delta_n = \frac{1}{n}$  i niech  $x_n$  oznacza argument odpowiadający liczbie  $\delta_n$ . Otrzymujemy  $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$  oraz  $|f(x_n) - g| \geq \varepsilon$ . Wtedy  $x_n \xrightarrow[n]{} a$ , ale  $f(x_n) \not\xrightarrow[n]{} g$ .  $\square$

Co zrobić, gdy nie widać kandydata na wartość granicy funkcji? Do tego służy warunek Cauchy'ego. Intuicyjnie oznacza on, że jeśli dwa argumenty  $x$  i  $x'$  leżą blisko liczby  $a$ , ale  $x, x' \neq a$ , to wartości  $f(x)$  i  $f(x')$  leżą blisko siebie. Ścisłe określenie znajduje się w następnym twierdzeniu.

**Twierdzenie 3.5** (Warunek Cauchy'ego). *Funkcja  $f(x)$  posiada granicę w punkcie  $a$  wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć liczbę  $\delta > 0$  taką, że*

$$0 < |x - a|, |x' - a| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon. \quad (3.1)$$

*Dowód.* Udowodnimy tylko implikację ( $\Leftarrow$ ). Niech  $x_n \xrightarrow[n]{} a$ , ale  $x_n \neq a$ . Wtedy ciąg  $f(x_n)$  spełnia warunek Cauchy'ego dla ciągów. Rzeczywiście, dla  $\varepsilon > 0$  istnieje  $\delta$  spełniająca (3.1). Ponieważ  $x_n \xrightarrow[n]{} a$ , to  $0 < |x_n - a| < \delta$  dla dużych wartości  $n$ , np. dla  $n > N$ . Wtedy dla  $n, m > N$  na podstawie (3.1) otrzymamy  $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ . Zatem ciąg  $f(x_n)$  jest zbieżny. Oznaczmy  $g = \lim_n f(x_n)$ . Wtedy  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g$  w sensie Heinego. Rzeczywiście, niech  $x'_n \xrightarrow[n]{} a$  i  $x'_n \neq a$ . Z poprzedniego rozumowania wiemy, że ciąg  $f(x'_n)$  jest zbieżny, np. do liczby  $g'$ . Rozważmy nowy ciąg postaci

$$x_1, x'_1, x_2, x'_2, \dots, x_n, x'_n, \dots$$

Ten ciąg dąży do  $a$ . Zatem odpowiadający ciąg wartości funkcji

$$f(x_1), f(x'_1), f(x_2), f(x'_2), \dots, f(x_n), f(x'_n), \dots$$

jest zbieżny. To jest możliwe tylko dla  $g = g'$ . □

### 3.1 Ważna granica

**Twierdzenie 3.6.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

*Dowód.* Dla kąta  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  rozważmy trójkąt prostokątny o kącie  $x$  i przyprostokątnej długości 1 przy tym kącie. Trójkąt ten zawiera w sobie wycinek koła o kącie  $x$  i promieniu 1, który z kolei zawiera trójkąt równoramienny o kącie wierzchołkowym  $x$  i ramionach długości 1. Porównując pola figur otrzymamy nierówność

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2}.$$

Zatem

$$\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Z drugiej nierówności otrzymujemy

$$\sin x > x \cos x = x \left[ 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right] > x \left[ 1 - 2 \left( \frac{x}{2} \right)^2 \right] = x - \frac{x^3}{2}.$$

Uzyskujemy więc

$$x - \frac{x^3}{2} < \sin x < x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}. \quad (3.2)$$

Z nierówności wynika, że

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Z parzystości funkcji  $\frac{\sin x}{x}$  otrzymujemy tezę.  $\square$

### 3.2 Granice jednostronne

**Przykład.** Z wysokości 20 m upuszczamy kamień. Chcemy znaleźć prędkość kamienia w chwili uderzenia w ziemię. Przed uderzeniem wysokość wynosi  $h(t) = 20 - \frac{1}{2}gt^2$ . Przyjmijmy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Wtedy  $h(t) = 20 - 5t^2$ . Kamień spadnie po 2 sekundach. Średnia prędkość kamienia od momentu  $t < 2$  do momentu uderzenia w ziemię wynosi

$$\frac{h(t) - h(2)}{t - 2} = \frac{20 - 5t^2}{t - 2} = -5 \frac{(t - 2)(t + 2)}{t - 2} = -5(t + 2).$$

Prędkość chwilowa w momencie uderzenia wynosi zatem

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 2 \\ t < 2}} \frac{h(t) - h(2)}{t - 2} = -20 \text{ m/s}.$$

**Definicja 3.7.** Załóżmy, że funkcja  $f(x)$  jest określona w pewnym przedziale  $a < x < a + \eta$  (na prawo od punktu  $a$ ). Mówimy, że funkcja  $f(x)$  ma granicę lewostronną w punkcie  $a$  równą liczbie  $g$ , jeśli dla każdego ciągu  $x_n \xrightarrow[n]{} a$ ,  $x_n < a$ , mamy  $f(x_n) \xrightarrow[n]{} g$ . Równoważnie

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \{ a - \delta < x < a \implies |f(x) - g| < \varepsilon \}.$$

Podobnie określa się granicę prawostronną.

**Twierdzenie 3.8.** *Granica  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją granice jednostronne  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  i  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  i są sobie równe.*

*Dowód.* ( $\Leftarrow$ ) Załóżmy, że  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = g$ . Dla liczby  $\varepsilon > 0$  istnieją liczby  $\delta_1, \delta_2 > 0$  spełniające warunek: dla  $a - \delta_1 < x < a$  lub  $a < x < a + \delta_2$  mamy  $|f(x) - g| < \varepsilon$ . Przyjmijmy  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ . Wtedy jeśli  $0 < |x - a| < \delta$  to albo  $a - \delta_1 \leq a - \delta < x < a$  albo  $a < x < a + \delta \leq a + \delta_2$ . W obu przypadkach uzyskujemy  $|f(x) - g| < \varepsilon$ .  $\square$

**Przykład.**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} - 1 & x < 1, \\ x - x^3 & x > 1. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{1}{x^2} - 1 \right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - x^3) = 0.$$

### 3.3 Granice niewłaściwe i granice w punktach niewłaściwych

**Definicja 3.9.** *Funkcja  $f(x)$  ma granicę  $\infty$  w punkcie  $a$  jeśli dla każdego ciągu  $x_n \xrightarrow[n]{} a$ ,  $x_n \neq a$ , mamy  $f(x_n) \xrightarrow[n]{} \infty$ . Równoważnie, dla dowolnej liczby  $M$  istnieje liczba  $\delta > 0$ , dla której warunek  $0 < |x - a| < \delta$  pociąga  $f(x) > M$ .*

**Definicja 3.10.** *Założmy, że funkcja  $f(x)$  jest określona w przedziale  $(a, \infty)$ . Mówimy, że liczba  $g$  jest granicą funkcji  $f(x)$  w  $\infty$  jeśli dla dowolnego ciągu  $x_n \xrightarrow[n]{} \infty$  mamy  $f(x_n) \xrightarrow[n]{} g$ . Równoważnie*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M \forall x \{ x > M \implies |f(x) - g| < \varepsilon \}.$$

Podobnie określa się granicę  $-\infty$  i granicę w  $-\infty$ .

### 3.4 Działania na granicach

**Twierdzenie 3.11.** *Załóżmy, że  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  oraz  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ . Wtedy*

$$(i) \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B.$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB.$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \text{ o ile } B \neq 0.$$

*Dowód.* Teza wynika z odpowiedniego twierdzenia o ciągach.  $\square$

**Uwaga.** Twierdzenie jest prawdziwe dla granic jednostronnych i granic w punktach niewłaściwych.

**Twierdzenie 3.12** (Reguła podstawienia). *Jeśli  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ ,  $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$ , oraz funkcja  $f(x)$  nie przyjmuje wartości  $b$  w pobliżu punktu  $a$ , to  $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$ .*

*Dowód.* Niech  $x_n \xrightarrow[n]{n} a$ ,  $x_n \neq a$ . Wiemy, że  $f(x) \neq b$  w pewnym przedziale  $(a - \eta, a + \eta) \setminus \{a\}$ . Wtedy  $x_n$  leży w tym przedziale dla dużych wartości  $n$ , np. dla  $n > N$ . Zatem  $y_n := f(x_n) \neq b$  dla  $n > N$  oraz  $y_n = f(x_n) \xrightarrow[n]{n} b$ . Otrzymujemy  $g(f(x_n)) = g(y_n) \xrightarrow[n]{n} c$ .  $\square$

**Uwaga.** Przy zastosowaniu reguły podstawienia posługujemy się zapisem

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) \underset{y=f(x)}{=} \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c.$$

**Przykład.**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x + \frac{1}{x}}.$$

Przyjmujemy  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ,  $g(y) = \sqrt{y}$ . Wtedy  $b = \frac{5}{2}$  oraz  $c = \sqrt{\frac{5}{2}}$ . W innym zapisie mamy

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x + \frac{1}{x}} \underset{y=x+\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow \frac{5}{2}} \sqrt{y} = \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

Trzeba się upewnić, że  $x + \frac{1}{x} \neq \frac{5}{2}$ , gdy  $x \neq 2$  i  $x$  leży blisko 2. Równanie

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

ma dwa rozwiązania  $x = 2$  i  $x = \frac{1}{2}$ . Dla  $0 < |x - 2| < 1$  mamy więc  $x + \frac{1}{x} \neq \frac{5}{2}$ .

### 3.5 Funkcje ciągłe

**Definicja 3.13.** *Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest ciągła w punkcie  $a$ , jeśli  $f(x)$  jest określona w pewnym przedziale wokół punktu  $a$ , włącznie z punktem  $a$ , oraz*

$$(1) \text{ istnieje granica } \lim_{x \rightarrow a} f(x),$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Przy zastosowaniu definicji Cauchy'ego granicy funkcji, ciągłość w zapisie kwantyfikatorowym ma postać

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \{ |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon \}.$$

Można pominąć warunek  $0 < |x - a|$ , bo dla  $x = a$  mamy  $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ .

**Przykłady.**

(a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1 & x = 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0).$$

(b)

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0), \text{ bo } |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|.$$



(c)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Granica w punkcie 0 nie istnieje. Niech  $x_n = \frac{1}{n\pi}$  oraz  $x'_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ . Wtedy  $f(x_n) = 0$  oraz  $f(x'_n) = 1$ .

**Twierdzenie 3.14.** *Jeśli funkcje  $f(x)$  i  $g(x)$  są ciągłe w punkcie  $a$ , to funkcje  $f(x) \pm g(x)$ ,  $f(x)g(x)$  i  $\frac{f(x)}{g(x)}$  są również ciągłe w  $a$ , przy czym w ostatnim przypadku zakładamy, że  $g(a) \neq 0$ .*

**Uwaga.** Jeśli  $g(a) \neq 0$ , to z ciągłości wynika, że  $g(x) \neq 0$  dla  $x$  w pobliżu punktu  $a$ . Rzeczywiście, przyjmijmy  $\varepsilon = \frac{|g(a)|}{2}$ . Wtedy istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że dla  $|x - a| < \delta$  mamy  $|g(x) - g(a)| < \frac{|g(a)|}{2}$ . Dalej

$$|g(a)| - |g(x)| \leq |g(x) - g(a)| < \frac{|g(a)|}{2}.$$

Zatem  $|g(x)| > \frac{|g(a)|}{2}$ .

**Przykłady.**

- (a) Każdy wielomian jest funkcją ciągłą w każdym punkcie.
- (b) Iloraz dwu wielomianów jest funkcją ciągłą poza miejscami zerowymi mianownika.

**Twierdzenie 3.15.** *Jeśli funkcja  $f(x)$  jest ciągła w punkcie  $a$ , a funkcja  $g(x)$  jest ciągła w punkcie  $b = f(a)$ , to funkcja złożona  $g(f(x))$  jest ciągła w punkcie  $a$ .*

*Dowód.* Niech  $x_n \xrightarrow[n]{a}$ . Wtedy  $y_n := f(x_n) \xrightarrow[n]{f(a) = b}$ . Zatem  $g(y_n) \xrightarrow[n]{g(b)}$ . To oznacza, że  $g(f(x_n)) \xrightarrow[n]{g(f(a))}$ .  $\square$

**Przykład.** Załóżmy, że  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  oraz  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  istnieje dla wszystkich punktów  $0 < a < 1$ . Określmy  $\tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ . Czy funkcja  $\tilde{f}$  jest ciągła w każdym punkcie przedziału  $(0, 1)$ ?

---

**Definicja 3.16.** Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest ciągła w przedziale  $(a, b)$ , jeśli jest ciągła w każdym punkcie tego przedziału. Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest ciągła w przedziale  $[a, b]$ , jeśli dodatkowo  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$  oraz  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$ .

**Przykłady.**

$$(a) f(x) = \frac{1}{x(1-x)}, 0 < x < 1.$$

$$(b) h(y) = \sqrt{y}, y \geq 0.$$

Sprawdzenie: dla  $y_0 > 0$  mamy

$$|\sqrt{y} - \sqrt{y_0}| = \frac{|y - y_0|}{\sqrt{y} + \sqrt{y_0}} \leq \frac{1}{\sqrt{y_0}} |y - y_0|.$$

Dla  $y_0 = 0$  i  $\varepsilon > 0$  niech  $0 \leq y < \varepsilon^2$ . Wtedy  $\sqrt{y} < \varepsilon$ .

$$(c) f(x) = \sqrt{x(1-x)}, 0 \leq x \leq 1.$$

**Twierdzenie 3.17** (Jednostajna ciągłość funkcji). *Funkcja  $f(x)$  ciągła na przedziale domkniętym  $[a, b]$  jest jednostajnie ciągła, tzn. dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że dla  $x, x' \in [a, b]$ , jeśli  $|x - x'| < \delta$ , to  $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$ .*

**Uwaga.** Zapis kwantyfikatorowy ciągłości jednostajnej ma postać

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in [a, b] \forall x' \in [a, b] \{ |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \}.$$

Dla porównania zapis kwantyfikatorowy ciągłości w każdym punkcie  $x$  przedziału  $[a, b]$  ma postać

$$\forall \varepsilon > 0 \forall x \in [a, b] \exists \delta > 0 \forall x' \in [a, b] \{ |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \}.$$

Przy jednostajnej ciągłości liczba  $\delta > 0$  jest uniwersalna dla wszystkich punktów  $x \in [a, b]$ , gdy przy ciągłości punktowej ta liczba jest dobierana indywidualnie dla każdego punktu  $x \in [a, b]$ .

Intuicyjnie jednostajna ciągłość oznacza, że jeśli dwa argumenty funkcji leżą blisko siebie, to odpowiadające im wartości funkcji są również położone blisko siebie, niezależnie od położenia tych argumentów.

*Dowód.* (nie wprost). Załóżmy, że warunek jednostajnej ciągłości nie jest spełniony. Tzn., że istnieje liczba  $\varepsilon > 0$  taka, że dla dowolnego wyboru liczby  $\delta > 0$  znajdują się punkty  $x, x'$  w przedziale  $[a, b]$  takie, że  $|x - x'| < \delta$  oraz  $|f(x) - f(x')| \geq \varepsilon$ . W szczególności dla  $\delta_n = \frac{1}{n}$  istnieją punkty  $x_n, x'_n$  w przedziale  $[a, b]$  spełniające

$$|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon. \quad (3.3)$$

Z twierdzenia Bolzano-Weierstrassa z ciągu  $x_n$  można wybrać zbieżny podciąg  $x_{n_k}$ . Oznaczmy  $x = \lim_k x_{n_k}$ . Z pierwszego warunku w (3.3) mamy

$$x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < x'_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k}.$$

Z twierdzenia o trzech ciągach wnioskujemy, że  $x = \lim_k x'_{n_k}$ . Z ciągłości w punkcie  $x$  otrzymujemy  $f(x_{n_k}) \xrightarrow{k} f(x)$  i  $f(x'_{n_k}) \xrightarrow{k} f(x)$ . To oznacza, że  $f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k}) \xrightarrow{k} 0$ , co stoi w sprzeczności z drugim warunkiem w (3.3).  $\square$

### Przykłady.

- (a) Domkniętość przedziału jest istotna. Rozważmy  $f(x) = \frac{1}{x}$  na przedziale  $(0, 1]$ . Dla  $x_n = \frac{1}{2n}$  i  $x'_n = \frac{1}{n}$  mamy  $f(x_n) = 2n$ ,  $f(x'_n) = n$ . Zatem

$$x'_n - x_n \xrightarrow{n} 0, \quad f(x_n) - f(x'_n) \xrightarrow{n} \infty.$$

- (b) Funkcja w poprzednim przykładzie była nieograniczona. Rozważmy  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  na przedziale  $(0, 1]$ . Dla  $x_n = \frac{1}{2n\pi}$  i  $x'_n = \frac{1}{(2n+1/2)\pi}$  mamy

$$x'_n - x_n \xrightarrow{n} 0, \quad f(x'_n) - f(x_n) = 1.$$

- (c) Jeśli nachylenie wykresu funkcji jest ograniczone, tzn.

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq L, \quad x_1 \neq x_2,$$

to funkcja jest jednostajnie ciągła. Istotnie mamy wtedy

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

Np.  $f(x) = x$  jest jednostajnie ciągła na całej prostej. Z kolei  $f(x) = x^2$  nie jest jednostajnie ciągła na całej prostej, bo dla  $x_n = n + \frac{1}{n}$ ,  $x'_n = n$  mamy  $x_n - x'_n \xrightarrow{n} 0$  oraz  $f(x'_n) - f(x_n) \geq 2$ .

- (d) Ograniczone nachylenie wykresu nie jest warunkiem koniecznym dla jednostajnej ciągłości. Np. funkcja  $f(x) = \sqrt{|x|}$  jest jednostajnie ciągła na całej prostej mimo, że nachylenie wykresu w pobliżu punktu 0 jest nieograniczone.

**Twierdzenie 3.18** (Weierstrass). *Funkcja ciągła  $f(x)$  na przedziale domkniętym  $[a, b]$  jest ograniczona oraz osiąga swoje kresy górny  $M$  i dolny  $m$ . Tzn. istnieją punkty  $c$  i  $d$  w przedziale  $[a, b]$  takie, że  $f(c) = m$  i  $f(d) = M$ .*

**Uwaga.**

$$m = \inf_{a \leq x \leq b} f(x), \quad M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x).$$

*Dowód.* Dla liczby  $\varepsilon = 1$  istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że jeśli  $|x - x'| < \delta$ , to  $|f(x) - f(x')| < 1$ . Wybierzmy liczbę naturalną  $n$  tak, aby  $\frac{b-a}{n} < \delta$ . Np. niech  $n = \lceil \frac{b-a}{\delta} \rceil + 1$ . Dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części punktami  $a_k = a + \frac{b-a}{n}k$  dla  $k = 0, 1, \dots, n$ . Oznaczmy

$$C = \max\{|f(a_1)| + 1, |f(a_2)| + 1, \dots, |f(a_n)| + 1\}.$$

Niech  $a \leq x \leq b$ . Wtedy  $a_{k-1} \leq x \leq a_k$  dla pewnej liczby  $k = 1, 2, \dots, n$ . Zatem

$$|x - a_k| \leq a_k - a_{k-1} = \frac{b-a}{n} < \delta.$$

Wtedy

$$|f(x)| - |f(a_k)| \leq |f(x) - f(a_k)| < 1.$$

Otrzymujemy więc

$$|f(x)| < |f(a_k)| + 1 \leq C,$$

czyli funkcja  $f$  jest ograniczona.

Założmy, nie wprost, że  $f(x) < M$  dla wszystkich  $a \leq x \leq b$ . Rozważmy funkcję  $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ . Funkcja  $g(x)$  jest ciągła na przedziale  $[a, b]$ . Z pierwszej części dowodu wynika, że  $g$  jest ograniczona z góry, tzn.

$$\frac{1}{M - f(x)} = g(x) \leq N,$$

dla pewnej stałej  $N$ . Po przekształceniu otrzymamy

$$M - f(x) \geq \frac{1}{N}, \quad \text{czyli } f(x) \leq M - \frac{1}{N}.$$

Dalej

$$M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x) \leq M - \frac{1}{N},$$

co daje sprzeczność.  $\square$

**Twierdzenie 3.19** (Własność Darboux). *Funkcja ciągła na przedziale  $[a, b]$  przyjmuje wszystkie wartości pośrednie, tzn. wartości pomiędzy liczbami  $f(a)$  i  $f(b)$ .*

*Dowód.* Rozważymy przypadek  $f(a) < f(b)$ . Niech  $f(a) < l < f(b)$ . Chcemy udowodnić, że  $f(x_0) = l$  dla pewnego punktu  $x_0$  w  $[a, b]$ . Załóżmy, nie wprost, że  $f(x) \neq l$  dla wszystkich  $x$ . Rozważymy funkcję

$$g(x) = \frac{1}{|f(x) - l|}.$$

Z twierdzenia Weierstrassa mamy

$$\frac{1}{|f(x) - l|} = g(x) \leq N,$$

dla pewnej stałej  $N$ . Zatem

$$|f(x) - l| \geq \frac{1}{N}, \quad a \leq x \leq b. \quad (3.4)$$

Z jednostajnej ciągłości dla  $\varepsilon = \frac{1}{N}$  można znaleźć liczbę  $\delta$ , dla której

$$|x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \frac{1}{N}.$$

Dzielimy przedział na  $n$  równych części punktami  $a_k = a + \frac{b-a}{n}k$  tak, aby  $\frac{b-a}{n} < \delta$ . Zatem  $|f(a_k) - f(a_{k-1})| < \frac{1}{N}$ . Mamy  $f(a_0) < l < f(a_n)$ . Niech  $k$  będzie najmniejszym wskaźnikiem, dla którego  $l < f(a_k)$ . Wtedy  $f(a_{k-1}) < l < f(a_k)$ . Ponieważ  $|f(a_k) - f(a_{k-1})| < \frac{1}{N}$ , to  $|f(a_k) - l| < \frac{1}{N}$ . Otrzymujemy sprzeczność z (3.4).  $\square$

**Wniosek 3.20.** *Funkcja ciągła na przedziale domkniętym przyjmuje wszystkie wartości pomiędzy swoimi kresami dolnym i górnym.*

*Dowód.* Z twierdzenia Weierstrassa istnieją punkty  $c$  i  $d$  takie, że  $f(c) = m$  i  $f(d) = M$ . Z własności Darboux zastosowanej do przedziału pomiędzy  $c$  i  $d$  funkcja przyjmuje wszystkie wartości pomiędzy  $m$  i  $M$ .  $\square$

### Przykłady.

(a) Chcemy rozwiązać równanie

$$w(x) := x^3 + 2x^2 + x - 3 = 0.$$

Mamy  $w(0) = -3$  i  $w(1) = 1$ . Z własności Darboux  $w(x_0) = 0$  dla pewnego punktu  $x_0$  pomiędzy 0 i 1. Ponieważ  $w(\frac{1}{2}) < 0$ , to można znaleźć rozwiązanie pomiędzy  $\frac{1}{2}$  i 1.

(b)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & 0 < |x| \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Funkcja ma własność Darboux mimo, że nie jest ciągła w punkcie 0.

**Twierdzenie 3.21.** *Funkcja monotoniczna w przedziale  $[a, b]$  jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy ma własność Darboux.*

**Lemat 3.22.** *Funkcja monotoniczna posiada granice jednostronne w każdym punkcie.*

*Dowód.* Pokażemy, że

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf_{x > c} f(x)$$

dla dowolnej funkcji rosnącej. Dla  $x > c$  mamy  $f(x) \geq f(c)$ , zatem  $\alpha := \inf_{x > c} f(x) \geq f(c)$ . Dla liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje argument  $x_0 > c$  spełniający  $f(x_0) < \alpha + \varepsilon$ . Wtedy dla  $c < x < x_0$  mamy  $\alpha \leq f(x) \leq f(x_0) < \alpha + \varepsilon$ . Zatem  $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$ .  $\square$

*Dowód twierdzenia.* Rozważmy funkcję rosnącą  $f(x)$  i punkt  $c$  wewnątrz  $[a, b]$ . Nieciągłość oznacza, że przynajmniej jedna z nierówności

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \leq f(c) \leq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

jest ostra. W każdym przypadku funkcja nie miałaby wtedy własności Darboux.  $\square$

**Definicja 3.23.** Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest różnowartościowa na podzbiorze  $E \subseteq \mathbb{R}$ , jeśli dla dwu argumentów  $x_1 \neq x_2$  z  $E$  mamy  $f(x_1) \neq f(x_2)$ .

Niech  $F = \{f(x) : x \in E\}$  dla funkcji różnowartościowej. Wtedy dla wartości  $y \in F$  istnieje jedyny element  $x \in E$  taki, że  $f(x) = y$ . Możemy określić  $g(y) = x$ . Wtedy  $g(f(x)) = x$  oraz  $f(g(y)) = y$ .

**Twierdzenie 3.24.** Funkcja ciągła i różnowartościowa jest monotoniczna.

*Dowód.* Załóżmy, że  $f$  nie jest monotoniczna. To oznacza, że można znaleźć trzy argumenty  $x_1 < x_2 < x_3$  spełniające  $f(x_1) < f(x_2) > f(x_3)$  albo  $f(x_1) > f(x_2) < f(x_3)$ . Tzn.  $f(x_2)$  nie leży pomiędzy  $f(x_1)$  i  $f(x_3)$ . Rozważmy przypadek  $f(x_1) < f(x_2) > f(x_3)$ . Oznaczmy  $\alpha = \max\{f(x_1), f(x_2)\}$ . Z własności Darboux wartości z przedziału  $[\alpha, f(x_2)]$  są przyjęte dwukrotnie przez funkcję  $f$ , raz w przedziale  $(x_1, x_2)$  i drugi raz w przedziale  $(x_2, x_3)$ .  $\square$

**Twierdzenie 3.25** (o funkcji odwrotnej). Jeśli funkcja  $f(x)$  jest ciągła i różnowartościowa na przedziale  $[a, b]$ , to funkcja odwrotna  $g(y)$  jest ciągła na przedziale  $[m, M]$ , gdzie  $m = \inf_{a \leq x \leq b} f(x)$  oraz  $M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$ .

*Dowód.* Wiemy, że  $f(x)$  jest ściśle monotoniczna. Przyjmijmy, że  $f(x)$  jest rosnąca. Wtedy funkcja odwrotna też jest rosnąca na przedziale  $[m, M]$ . Dla ciągłości wystarczy zatem pokazać własność Darboux. Niech  $y_1 < y_2$  oraz  $g(y_1) < c < g(y_2)$ . Trzeba znaleźć argument  $y$  taki, że  $g(y) = c$ . Nakładamy na nierówność funkcję  $f$  i otrzymujemy

$$y_1 = f(g(y_1)) < \underbrace{f(c)}_y < f(g(y_2)) = y_2.$$

Dalej  $g(y) = g(f(c)) = c$ .  $\square$

**Przykład.** Dla funkcji  $f(x) = x^n$ ,  $0 \leq x \leq M$  funkcją odwrotną jest  $g(y) = \sqrt[n]{y}$ ,  $0 \leq y \leq \sqrt[n]{M}$ . Ponieważ  $M$  jest dowolną dodatnią liczbą, to  $g(y) = \sqrt[n]{y}$  jest ciągła na  $[0, \infty)$ .

### 3.6 Ściśle wprowadzenie funkcji wykładniczej

Ustalmy liczbę  $a > 1$ . Dla liczb wymiernych  $w \in \mathbb{Q}$  określamy

$$a^w = (a^p)^{\frac{1}{q}}, \quad \text{jeśli } w = \frac{p}{q}, \quad q \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{Z}.$$

Wynik nie zależy od przedstawienia liczby w tej postaci.

**Definicja 3.26.** Podzbiór  $E \subseteq \mathbb{R}$  nazywamy **gęstym** jeśli dla dowolnej liczby  $x \in \mathbb{R}$  istnieje ciąg liczb  $a_n \in E$  zbieżny do  $x$ .

Zbiór liczby wymiernych jest gęsty w  $\mathbb{R}$ . Rzeczywiście, dla  $x \in \mathbb{R}$  mamy  $nx - 1 < [nx] \leq nx$ . Zatem

$$x - \frac{1}{n} < \frac{[nx]}{n} \leq x.$$

To oznacza, że  $\frac{[nx]}{n} \xrightarrow{n} x$ .

**Lemat 3.27.** Jeśli funkcje  $g(x)$  i  $h(x)$  są ciągłe na  $\mathbb{R}$  oraz  $g(a) = h(a)$  dla punktów  $a$  z gęstego podzbioru  $E \subseteq \mathbb{R}$ , to  $g(x) \equiv h(x)$ .

*Dowód.* Dla  $x \in \mathbb{R}$  bierzemy ciąg  $a_n$  punktów z  $E$  zbieżny do  $x$ . Wtedy

$$g(x) = \lim_n g(a_n) = \lim_n h(a_n) = h(x).$$

□

Określamy

$$F(x) = \sup_{\substack{w \in \mathbb{Q} \\ w < x}} a^w.$$

Wtedy  $F(x)$  jest funkcją ściśle rosnącą. Istotnie, niech  $x_1 < x_2$ . Można znaleźć liczby wymierne  $w_1, w_2$  takie, że  $x_1 < w_1 < w_2 < x_2$ . Wtedy

$$F(x_1) \leq a^{w_1} < a^{w_2} \leq F(x_2).$$

Zbadamy ciągłość funkcji  $F(x)$ . Dla liczby  $x_0$  istnieje ciąg liczb wymiernych  $w_n$  spełniający

$$w_n < x_0 < w_n + \frac{2}{n}.$$

Np.  $w_n = \frac{[nx_0]}{n} - \frac{1}{n}$ . Obliczamy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) &= \lim_n F(w_n + \frac{2}{n}) = \lim_n a^{w_n + \frac{2}{n}} \\ &= \lim_n a^{w_n} \lim_n (a^2)^{\frac{1}{n}} = \lim_n a^{w_n} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x). \end{aligned}$$

**Lemat 3.28.**  $F(x + y) = F(x)F(y)$ .



*Dowód.* Niech  $w_n \xrightarrow[n]{} x$ ,  $v_n \xrightarrow[n]{} y$ , gdzie  $w_n, v_n \in \mathbb{Q}$ . Wtedy

$$\begin{aligned} F(x+y) &= \lim_n F(w_n + v_n) = \lim_n a^{w_n + v_n} = \lim_n a^{w_n} a^{v_n} \\ &= \lim_n a^{w_n} \lim_n a^{v_n} = \lim_n F(w_n) \lim_n F(v_n) = F(x)F(y). \end{aligned}$$

□

$F(x)$  nazywamy funkcją wykładniczą. Funkcja wykładnicza ma następujące własności (dla  $a > 1$ ).

- (1)  $F(x+y) = F(x)F(y)$ .
- (2)  $F(x) < F(y)$ , dla  $x < y$ .
- (3)  $F(1) = a$ .
- (4)  $F(x)$  jest ciągła.

Można udowodnić, że powyższe własności określają funkcję wykładniczą w sposób jednoznaczny. Przyjmujemy oznaczenie  $F(x) = a^x$ . Mamy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{a^{-x}} = 0.$$

Funkcję odwrotną, określoną na półprostej  $(0, \infty)$  nazywamy logarytmem przy podstawie  $a$  i oznaczamy symbolem  $\log_a x$ .

## 4 Ciągi i szeregi funkcyjne

**Definicja 4.1.** Niech  $f_n$  będzie ciągiem funkcji określonych na  $A \subseteq \mathbb{R}$ , np.  $A = [a, b]$ ,  $[a, \infty)$ ,  $(a, b)$ . Mówimy, że ciąg  $f_n$  jest zbieżny punktowo do funkcji  $f$ , jeśli dla każdego punktu  $x$  ze zbioru  $A$  mamy  $f_n(x) \xrightarrow[n]{} f(x)$ .

W zapisie kwantyfikatorowym definicja przybiera postać

$$\forall \varepsilon > 0 \forall x \in A \exists N \forall n > N \{|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}.$$

Próg  $N$  zależy od punktu  $x$  i od  $\varepsilon$ .

**Definicja 4.2.** Mówimy, że ciąg  $f_n$  jest zbieżny **jednostajnie** do funkcji  $f$  na zbiorze  $A$ , jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall x \in A \forall n > N \{|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}.$$

Używamy zapisu  $f_n \rightrightarrows f$ .

Tym razem próg  $N$  nie zależy od  $x$ , jest uniwersalny dla wszystkich punktów ze zbioru  $A$ .

Co oznacza warunek

$$\forall x \in A \forall n > N \{|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\} ?$$

Po przekształceniu otrzymamy

$$\forall x \in A \forall n > N \{f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon\}.$$

Tzn. od pewnego miejsca (dla  $n > N$ ) wykresy funkcji  $f_n(x)$  leżą w pasie o promieniu  $\varepsilon$  wokół wykresu funkcji  $f(x)$ .

**Przykład.**  $f_n(x) = x^n$ ,  $0 \leq x \leq 1$ .

$$\lim_n x^n = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases} =: f(x).$$

Czy możliwa jest zbieżność jednostajna? Niech  $\varepsilon = \frac{1}{3}$ . W pasie o promieniu  $\frac{1}{3}$  wokół wykresu funkcji  $f$  nie ma wykresu żadnej funkcji ciągłej.

Niech  $f_n(x) = x^n$ ,  $0 \leq x \leq a < 1$ . Wtedy ciąg  $f_n$  jest jednostajnie zbieżny do 0. Rzeczywiście, dla  $\varepsilon > 0$  istnieje liczba naturalna  $N$ , dla której  $a^N \leq \varepsilon$ . Wtedy dla  $n > N$  i  $0 \leq x \leq a$  mamy

$$0 \leq f_n(x) = x^n \leq a^n < a^N \leq \varepsilon.$$

**Przykład.**

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 2 - nx & \frac{1}{n} \leq x \leq \frac{2}{n}, \\ 0 & \frac{2}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Mamy  $f_n(x) \xrightarrow[n]{} 0$  dla  $0 \leq x \leq 1$ . Nie ma jednak zbieżności jednostajnej, bo  $f_n(\frac{1}{n}) = 1$ . W pasie o promieniu  $\frac{1}{2}$  wokół zera nie ma wykresu żadnej z funkcji  $f_n$ .

---

**Twierdzenie 4.3.** *Granica jednostajnie zbieżnego ciągu funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą.*

*Dowód.* Załóżmy, że ciąg  $f_n(x)$  jest zbieżny jednostajnie do funkcji  $f(x)$ . Sprawdzamy ciągłość funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$ . Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Z założenia istnieje próg  $N$ , taki, że dla  $n > N$  mamy  $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . W szczególności

$$|f_{N+1}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Z ciągłości funkcji  $f_{N+1}$  istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że dla  $|x - x_0| < \delta$  mamy

$$|f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Zatem dla  $|x - x_0| < \delta$  otrzymujemy

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| + |f_{N+1}(x_0) - f_{N+1}(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

**Wniosek 4.4.** *Jeśli ciąg funkcji ciągłych  $f_n$  jest zbieżny punktowo do funkcji  $f$ , ale  $f$  nie jest ciągła, to ciąg  $f_n$  nie jest zbieżny jednostajnie.*

**Przykład.**  $f(x) = x^n$ ,  $0 \leq x \leq 1$ . Granica punktowa nie jest funkcją ciągłą.

**Twierdzenie 4.5.** *Założmy, że istnieje ciąg liczb  $a_n > 0$  taki, że  $a_n \xrightarrow{n} 0$  oraz*

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, \quad x \in A.$$

*Wtedy ciąg  $f_n$  jest zbieżny do funkcji  $f$  jednostajnie na zbiorze  $A$ .*

**Przykłady.**

(a)  $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ ,  $x \geq 0$ . Mamy  $f_n(0) = 0$ . Dla  $x > 0$  szacujemy

$$f_n(x) \leq \frac{x}{nx} = \frac{1}{n}. \text{ Zatem}$$

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{n}, \quad x \geq 0.$$

(b)  $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ . Dla  $0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$  mamy

$$0 \leq f_n(x) = x^n(1-x) \leq x^n \leq \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

Z kolei dla  $1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq x \leq 1$

$$0 \leq f_n(x) = x^n(1-x) \leq 1-x \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Zatem dla  $0 \leq x \leq 1$  uzyskujemy

$$0 \leq f_n(x) \leq \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n} 0,$$

bo

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n = \left[\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}}\right]^{\sqrt{n}}.$$

**Twierdzenie 4.6** (warunek Cauchy'ego zbieżności jednostajnej). *Ciąg funkcji  $f_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny na zbiorze  $A$  wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall x \in A \forall n, m > N \{|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon\}.$$

**Uwaga.** Intuicyjnie oznacza to, że jeśli  $n$  i  $m$  są duże, to wykresy funkcji  $f_n$  i  $f_m$  leżą blisko siebie.

*Dowód.* ( $\Leftarrow$ ). Z założenia dla każdego punktu  $x$  z  $A$  ciąg liczbowy  $f_n(x)$  spełnia warunek Cauchy'ego. Zatem  $f_n(x)$  jest zbieżny. Oznaczmy  $f(x) = \lim_n f_n(x)$ . Chcemy pokazać, że  $f_n \xrightarrow[n]{} f$ . Niech  $\varepsilon > 0$ . Z założenia istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n, m > N$  mamy

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in A.$$

Wtedy dla  $n > N$  otrzymujemy

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_m |f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

□

**Twierdzenie 4.7** (Dini). *Niech  $f_n(x)$  będzie monotonicznym ciągiem funkcji ciągłych określonych na przedziale  $[a, b]$ , tzn. spełniony jest jeden z dwu warunków:*

(a)  $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$  dla  $a \leq x \leq b$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

(b)  $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$  dla  $a \leq x \leq b$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Założmy, że  $f_n$  jest zbieżny punktowo do funkcji  $f$  ciągłej na  $[a, b]$ . Wtedy zbieżność  $f_n$  do  $f$  jest jednostajna.

*Dowód.* Założmy, że  $f_n(x) \not\rightarrow_n f(x)$ . Oznaczmy  $g_n(x) = f(x) - f_n(x)$ . Wtedy  $g_n(x) \not\rightarrow_n 0$ . Trzeba pokazać, że  $g_n \not\rightarrow_n 0$ . Założmy nie wprost, że  $g_n \rightarrow_n 0$ . To oznacza, że istnieje liczba  $\varepsilon > 0$  taka, że dla dowolnego wyboru liczby naturalnej  $N$  istnieje liczba naturalna  $n > N$  oraz punkt  $x_N$  w  $[a, b]$  takie, że  $g_n(x_N) \geq \varepsilon$ . Wtedy

$$g_{N+1}(x_N) \geq g_n(x_N) \geq \varepsilon, \quad \text{dla } n > N.$$

Na podstawie twierdzenia Bolzano-Weierstrassa możemy wybrać podciąg zbieżny  $x_{N_k}$ . Oznaczmy  $x_0 = \lim_k x_{N_k}$ . Wtedy dla  $m \leq N_k$  otrzymujemy

$$g_m(x_{N_k}) \geq g_{N_k+1}(x_{N_k}) \geq \varepsilon.$$

Przechodzimy do granicy, gdy  $k \rightarrow \infty$  aby uzyskać  $g_m(x_0) = \lim_k g_m(x_{N_k}) \geq \varepsilon$ . Ale  $g_m(x_0) \rightarrow_m 0$ , co daje sprzeczność.  $\square$

**Definicja 4.8.** Mówimy, że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny dla  $x \in A$ , jeśli ciąg sum częściowych  $s_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$  jest jednostajnie zbieżny.

**Przykład.**  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ ,  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ . Mamy

$$s_n(x) = \sum_{k=1}^n x^k = \frac{x - x^{n+1}}{1 - x} \xrightarrow{n} \frac{x}{1 - x}.$$

Sprawdzamy zbieżność jednostajną

$$\left| s_n(x) - \frac{x}{1 - x} \right| = \frac{x^{n+1}}{1 - x} \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n} 0.$$

**Twierdzenie 4.9** (Warunek Cauchy'ego). Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall x \in A \forall n > m > N \{|f_{m+1}(x) + f_{m+2}(x) + \dots + f_n(x)| < \varepsilon\}.$$

*Dowód.*

$$s_n(x) - s_m(x) = f_{m+1}(x) + f_{m+2}(x) + \dots + f_n(x).$$

□

**Twierdzenie 4.10** (kryterium Weierstrassa o majoryzacji). Jeśli szereg liczbowy  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  o wyrazach nieujemnych jest zbieżny oraz  $|f_n(x)| \leq a_n$  dla  $x \in A$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest zbieżny jednostajnie i bezwzględnie dla  $x \in A$ .

*Dowód.* Sprawdzamy warunek Cauchy'ego. Dla  $n > m$  mamy

$$\begin{aligned} |f_{m+1}(x) + f_{m+2}(x) + \dots + f_n(x)| &\leq |f_{m+1}(x)| + |f_{m+2}(x)| + \dots + |f_n(x)| \\ &\leq a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n. \end{aligned}$$

Tezę uzyskujemy z warunku Cauchy'ego dla szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . □

**Twierdzenie 4.11.** Jeśli funkcje  $f_n(x)$  są ciągłe oraz szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest zbieżny jednostajnie na  $A$ , to suma szeregu  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest funkcją ciągłą na  $A$ .

**Przykład.**  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ . Szereg jest zbieżny dla wszystkich wartości  $x$  np. z kryterium d'Alemberta. Rozważmy  $|x| \leq a$ . Wtedy

$$\left| \frac{x^n}{n!} \right| \leq \frac{a^n}{n!}.$$

Z kryterium Weierstrassa szereg jest zbieżny jednostajnie i bezwzględnie w przedziale  $[-a, a]$ . Suma szeregu reprezentuje więc funkcję ciągłą na  $\mathbb{R}$ , bo  $a$  jest dowolną dodatnią liczbą. Oznaczmy

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Wtedy  $\exp(0) = 1$  oraz

$$\exp(1) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots = e.$$

Korzystając z mnożenia szeregów metodą Cauchy'ego otrzymamy

$$\begin{aligned} \exp(x)\exp(y) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^{n-k}}{(n-k)!} \frac{y^k}{k!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = \exp(x+y). \end{aligned}$$

W oparciu o podrozdział 3.6 z własności funkcji  $\exp(x)$  wynika, że  $\exp(x) = e^x$ . Udowodniliśmy więc, że

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

### Przykłady.

(a)  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

$$\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Zatem  $f(x)$  jest funkcją ciągłą.

(b)  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Szereg jest zbieżny dla  $x \in \mathbb{R}$  z kryterium Dirichleta. Można pokazać analizując dowód twierdzenia Dirichleta i pierwszy przykład po tym twierdzeniu, że zbieżność jest jednostajna dla  $|x - 2k\pi| \geq \varepsilon > 0$ .

**Definicja 4.12.** Szeregi postaci  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  nazywamy potęgowymi.

**Przykład.** Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$  jest zbieżny tylko dla  $|x| < 1$ . Mówimy wtedy, że liczba 1 jest promieniem zbieżności tego szeregu.

**Definicja 4.13.** Promieniem zbieżności szeregu  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  nazywamy kres górny wartości bezwzględnych liczb  $x$ , dla których szereg jest zbieżny.

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ . Znajdziemy promień zbieżności z kryterium d'Alemberta.

$$\left| \frac{(-1)^{n+2} x^{n+1}}{n+1} \right| \left| \frac{n}{(-1)^{n+1} x^n} \right| = \left(1 + \frac{1}{n}\right) |x| \xrightarrow{n} |x|.$$

Dla  $|x| < 1$  szereg jest bezwzględnie zbieżny a dla  $|x| > 1$  jest rozbieżny. Promień zbieżności wynosi 1.

(b)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ . Promień zbieżności wynosi  $\infty$ .

(c)  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ . Promień zbieżności wynosi 0.

**Twierdzenie 4.14.** Jeśli  $R > 0$  jest promieniem zbieżności szeregu  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , to szereg jest zbieżny dla  $|x| < R$  i rozbieżny dla  $|x| > R$ . Ponadto zbieżność jest jednostajna w każdym przedziale  $[-r, r]$  dla  $0 < r < R$ .

*Dowód.* Z określenia liczby  $R$  szereg jest rozbieżny dla  $|x| > R$ . Każda liczba  $|x| < R$  leży w pewnym przedziale  $[-r, r]$  dla  $r < R$ , (np.  $r = |x|$ ). Z określenia promienia zbieżności istnieje liczba  $x_0$  spełniająca  $r < |x_0| < R$  oraz szereg  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$  jest zbieżny. Wtedy  $|a_n x_0^n| \xrightarrow{n} 0$ . Zatem  $|a_n x_0^n| \leq M$  dla pewnej dodatniej liczby  $M$ . Niech  $|x| \leq r$ . Wtedy

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left( \frac{r}{|x_0|} \right)^n.$$

Ale  $\frac{r}{|x_0|} < 1$ . Zatem z kryterium Weierstrassa uzyskujemy jednostajną i bezwzględną zbieżność w przedziale  $[-r, r]$ .  $\square$

**Uwaga.** Z dowodu wynika, że

$$R = \sup \left\{ |x| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ jest zbieżny} \right\} \\ = \sup \{ |x| : a_n x^n \text{ jest ograniczony} \} \quad (4.1)$$



**Twierdzenie 4.15.** (i)  $R = \frac{1}{\lim_n \sqrt[n]{|a_n|}}$ , o ile granica wyrażenia w mianowniku istnieje.

(ii)  $R = \frac{1}{\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}}$ , o ile granica wyrażenia w mianowniku istnieje.

W obu przypadkach dopuszczamy granicę równą 0 lub  $\infty$ . Wtedy  $R = \infty$  lub  $R = 0$ , odpowiednio.

### Przykłady.

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^{10}}$ . Mamy  $\lim_n \sqrt[n]{\frac{1}{n^{10}}} = 1$ .

(b)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{n^2}$ . Wtedy  $a_{2014} = 0$ . Nie możemy zastosować poprzedniego twierdzenia. Stosujemy kryterium Cauchy'ego

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2^n} |x|^{n^2}} = \frac{1}{2} |x|^n \xrightarrow{n} \begin{cases} 0 & |x| < 1, \\ \frac{1}{2} & |x| = 1, \\ \infty & |x| > 1. \end{cases}$$

Zatem  $R = 1$ .

(c)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n!}}{n!}$ . Z kryterium d'Alemberta

$$\left| \frac{x^{(n+1)!}}{(n+1)!} \right| \left| \frac{n!}{x^{n!}} \right| = \frac{1}{n+1} |x|^{n \cdot n!} \xrightarrow{n} \begin{cases} 0 & |x| \leq 1, \\ \infty & |x| > 1. \end{cases}$$

**Uwaga.** Można udowodnić, że  $R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}$ . Rzeczywiście, niech  $A =$

$\{|x| : a_n x^n \text{ jest ograniczony}\}$ . Dla  $x \in A$  mamy  $|a_n x^n| \leq M$  dla pewnej liczby  $M > 0$ . Zatem

$$|x| \leq \frac{M^{1/n}}{|a_n|^{1/n}}.$$

Niech  $\alpha$  oznacza największy punkt skupienia ciągu  $|a_n|^{1/n}$ . Wtedy  $|a_{n_k}|^{1/n_k} \xrightarrow[k]{k} \alpha$  dla pewnego podciągu liczb naturalnych  $n_k$ . Zatem

$$|x| \leq \frac{M^{1/n_k}}{|a_{n_k}|^{1/n_k}} \xrightarrow[k]{k} \frac{1}{\alpha}.$$

Na podstawie (4.1) otrzymujemy

$$R \leq \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\limsup |a_n|^{1/n}}.$$

Z kolei jeśli

$$|x| > \frac{1}{\limsup |a_n|^{1/n}},$$

to  $\limsup |a_n x^n|^{1/n} > 1$ . To oznacza, że ciąg  $a_n x^n$  nie jest ograniczony.

**Twierdzenie 4.16.** *Suma szeregu  $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  jest funkcją ciągłą w przedziale  $(-R, R)$ .*

*Dowód.*  $s_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$  jest funkcją ciągłą. Wiemy, że  $s_n(x) \xrightarrow[n]{n} s(x)$  dla  $-r \leq x \leq r$  dla dowolnej liczby  $0 < r < R$ . Stąd otrzymujemy tezę.  $\square$

**Twierdzenie 4.17 (Abel).** *Jeśli szereg  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  jest zbieżny dla  $x = a$ , to funkcja  $f(x)$  jest lewostronnie ciągła w punkcie  $x = a$  jeśli  $a > 0$  i prawostronnie ciągła, jeśli  $a < 0$ .*

*Dowód.* Wystarczy rozważyć przypadek  $a = 1$ . Chcemy udowodnić, że

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Oznaczmy  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  i  $s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ . Wtedy (przyjmując  $s_{-1} = 0$  otrzymujemy

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{k=0}^n (s_k - s_{k-1}) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n s_k x^k - \sum_{k=0}^{n-1} s_k x^{k+1} = \underbrace{(1-x) \sum_{k=0}^n s_k x^k + s_n x^{n+1}}. \end{aligned}$$

Dla  $0 < x < 1$  przechodzimy do granicy w podkreślonych wyrażeniach. Ponieważ ciąg  $s_n$  jest ograniczony, to  $s_n x^{n+1} \xrightarrow[n]{} 0$ . Zatem

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} s_n x^n.$$

Dalej

$$\begin{aligned} f(x) - f(1) &= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} s_n x^n - s \\ &= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} s_n x^n - (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} s x^n = (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (s_n - s) x^n. \end{aligned}$$

Otrzymujemy więc

$$|f(x) - f(1)| \leq (1-x) \sum_{n=0}^N |s_n - s| x^n + (1-x) \sum_{n=N+1}^{\infty} |s_n - s| x^n.$$

Dla  $\varepsilon > 0$  istnieje liczba naturalna  $N$  taka, że  $|s_n - s| < \varepsilon/2$ . Ciąg  $s_n$  jest ograniczony więc  $|s_n| \leq M$  dla pewnej liczby  $M > 0$ . Wtedy

$$\begin{aligned} |f(x) - f(1)| &\leq 2M(1-x) \sum_{n=0}^N x^n + \frac{\varepsilon}{2}(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &\leq 2M(N+1)(1-x) + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Jeśli  $|x-1| < \frac{\varepsilon}{4M(N+1)}$ , to  $|f(x) - f(1)| < \varepsilon$ . □

## 5 Pochodne

Przez punkt  $P$  i  $Q \neq P$  okręgu przeprowadzamy sieczną. Gdy punkt  $Q$  zbliża się do punktu  $P$ , to przyjmujemy, że graniczne położenie siecznych określa położenie stycznej do okręgu w punkcie  $P$ . Będziemy zajmować się stycznymi do wykresów funkcji  $y = f(x)$ . Chcemy znaleźć styczną do wykresu w punkcie  $(a, f(a))$ . Wybierzmy inny punkt wykresu  $(x, f(x))$ . Nachylenie (współczynnik kierunkowy) siecznej przechodzącej przez punkty  $(a, f(a))$  i  $(x, f(x))$  wynosi

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Zatem nachylenie stycznej wyraża się wzorem

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Wyrażenie pod granicą nazywamy ilorazem różnicowym.

Obiekt porusza się po linii pionowej i jego wysokość w chwili  $t$  wynosi  $h(t)$ . Chcemy obliczyć prędkość w chwili  $t = a$ . Wybieramy moment czasu  $t$  blisko  $a$ , ale  $t \neq a$  (np.  $t > a$ ). Średnia prędkość w przedziale czasu od  $a$  do  $t$  wynosi

$$\frac{h(t) - h(a)}{t - a}.$$

Prędkość chwilowa określona jest wzorem

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{h(t) - h(a)}{t - a}.$$

**Definicja 5.1.** *Mówimy, że funkcja  $f(x)$  określona w pewnym przedziale wokół punktu  $a$  ma pochodną w tym punkcie, jeśli istnieje granica*

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

**Uwaga.** Liczba  $f'(a)$  określa chwilowe tempo zmiany wartości funkcji w punkcie  $a$ .

Jeśli  $f'(a)$  istnieje, to równanie stycznej do wykresu funkcji  $y = f(x)$  w punkcie  $(a, f(a))$  ma postać

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

**Przykład.** Chcemy znaleźć równanie stycznej do wykresu  $y = \sqrt{x}$  w punkcie  $(2, \sqrt{2})$ . Mamy

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x - 2} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{(\sqrt{x} - \sqrt{2})(\sqrt{x} + \sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2}} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Równanie stycznej to

$$y - \sqrt{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}(x - 2).$$

**Definicja 5.2.** Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest określona w przedziale  $[a, a + \delta)$  (lub  $(a - \delta, a]$ ) oraz istnieje granica

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \left( \text{lub } f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right),$$

to mówimy, że istnieje pochodna prawostronna (lub lewostronna) w punkcie  $a$ .

**Przykład.** Zrzucamy kamień z wysokości 20m. Jaka jest prędkość kamienia w chwili uderzenia w ziemię? Mamy

$$h(t) = \begin{cases} 20 - 5t^2 & 0 \leq t \leq 2, \\ 0 & t > 2. \end{cases}$$

Trzeba obliczyć  $h'_-(2)$ .

$$h'_-(2) = \lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{h(t) - h(2)}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{20 - 5t^2}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{-5(t-2)(t+2)}{t-2} = -20.$$

Oczywiście  $h'_+(2) = 0$ .

**Twierdzenie 5.3.** Jeśli funkcja  $f(x)$  ma pochodną w punkcie  $a$ , to jest w tym punkcie ciągła.

*Dowód.*

$$f(x) - f(a) = \underbrace{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{\rightarrow f'(a)} \underbrace{(x - a)}_{\rightarrow 0} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

□

**Twierdzenie 5.4.** Załóżmy, że  $f'(a)$  i  $g'(a)$  istnieją. Wtedy

$$(i) \quad (f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a).$$

$$(ii) \quad (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

$$(iii) \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}, \text{ o ile } g(a) \neq 0.$$

Dowód. (iii)

$$\begin{aligned} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} &= \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x-a)} \\ &= \frac{1}{g(x)g(a)} \frac{[f(x) - f(a)]g(a) - f(a)[g(x) - g(a)]}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}. \end{aligned}$$

□

**Przykłady.**

(a)  $f(x) \equiv c$ .  $f'(a) = 0$ .

(b)  $f_n(x) = x^n$ ,  $n \geq 1$ .

$$\begin{aligned} f'_n(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}) \\ &= \underbrace{a^{n-1} + a^{n-1} + \dots + a^{n-1}}_{n \text{ składników}} = na^{n-1}. \end{aligned}$$

(c)  $g_n(x) = x^{-n} = \frac{1}{f_n(x)}$ ,  $x \neq 0$ .

$$g'_n(x) = \left( \frac{1}{f_n(x)} \right)' = \frac{-f'_n(x)}{f_n(x)^2} = \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}.$$

**Uwaga.** Przykłady (b) i (c) dają  $(x^n)' = nx^{n-1}$  dla  $n \in \mathbb{Z}$ .

Czasami stosuje się inny zapis dla pochodnej. Przyjmując  $h = x - a$  mamy

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ile wynosi  $\lim_n n^2 \left[ f\left(2 + \frac{1}{n^2}\right) - f(2) \right]$ ? To wyrażenie jest równe

$$\lim_n \frac{f\left(2 + \frac{1}{n^2}\right) - f(2)}{\frac{1}{n^2}} = f'(2).$$

(d)

$$(e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}}_{=1} = e^x$$

(e)  $(\sin x)' = \cos x$ . Rzeczywiście

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \frac{\sin x(\cosh - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \sin x \underbrace{\frac{\cosh - 1}{h}}_{\rightarrow 0 ?} + \cos x \frac{\sin h}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \cos x. \end{aligned}$$

$$\frac{\cosh - 1}{h} = \frac{\cos^2 h - 1}{h(\cosh + 1)} = -\frac{\sin^2 h}{h^2} \frac{h}{\cos h + 1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

**Uwaga.** Niech  $f(x) = g(x+b)$ . Wtedy  $f'(x) = g'(x+b)$ . Istotnie

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g((x+b)+h) - g(x+b)}{h} = g'(x+b).$$

(f)  $(\cos x)' = -\sin x$ , bo  $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$  zatem

$$(\cos x)' = \sin'(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x.$$

$$(g) \quad (\operatorname{tg} x)' = \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} & x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi. \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x & \end{cases}$$

(h)  $x > 0$ ,  $(\log x)' = \frac{1}{x}$ . Uzasadnienie:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \frac{h}{x})}{\frac{h}{x}} = \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t}$$

Niech  $u = \log(1+t)$ . Wtedy  $u \rightarrow 0$ , gdy  $t \rightarrow 0$ . Zatem

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{e^u - 1} = 1.$$

**Twierdzenie 5.5** (Reguła łańcucha). *Jeśli funkcja  $f(x)$  jest różniczkowalna w punkcie  $x = a$ , natomiast funkcja  $g(y)$  jest różniczkowalna w punkcie  $b = f(a)$ , to funkcja złożona  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$  jest różniczkowalna w punkcie  $x = a$  oraz*

$$(g \circ f)'(a) = g'(b)f'(a) = g'(f(a))f'(a). \quad (5.1)$$

*Dowód.* Nieścisle, ale obrazowe uzasadnienie jest następujące.

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

przy założeniu  $f(x) \neq f(a)$ . Dla  $x \rightarrow a$  mamy  $f(x) \rightarrow f(a)$ . Zatem pierwszy ułamek dąży do  $g'(f(a))$  a drugi do  $f'(a)$ .

Przejdziemy do ścisłego dowodu. Z założenia mamy

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) + u(x), \quad u(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

Podobnie

$$\frac{g(y) - g(b)}{y - b} = g'(b) + v(y), \quad v(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} 0.$$

Mamy zatem

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &= (x - a) [f'(a) + u(x)], \\ g(y) - g(b) &= (y - b) [g'(b) + v(y)]. \end{aligned}$$

Podstawmy  $y = f(x)$  i  $b = f(a)$ . Otrzymamy

$$\begin{aligned} g(f(x)) - g(f(a)) &= [f(x) - f(a)][g'(f(a)) + v(f(x))] \\ &= (x - a) [f'(a) + u(x)][g'(f(a)) + v(f(x))]. \end{aligned}$$

Czyli

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = [f'(a) + u(x)][g'(f(a)) + v(f(x))].$$

Gdy  $x \rightarrow a$ , to  $u(x) \rightarrow 0$ . Ponadto  $y = f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a) = b$ . Zatem  $v(f(x)) \rightarrow 0$ . Ostatecznie w granicy otrzymujemy  $f'(a)g'(f(a))$ .  $\square$

**Uwaga.** Wzór (5.1) można też zapisać w postaci

$$(g \circ f)'(x) = g'(y)f'(x), \quad \text{gdzie } y = f(x).$$

**Przykłady.**



(a) Obliczyć  $(\log \sin x)'$ .

$$\begin{aligned} y = f(x) = \sin x & & f'(x) = \cos x \\ g(y) = \log y & & g'(y) = \frac{1}{y} \end{aligned}$$

Zatem

$$(\log \sin x)' = \frac{1}{\sin x} \cos x = \operatorname{ctg} x.$$

(b)  $h(x) = \cos(x^5)$ .  $h'(x) = -\sin(x^5) 5x^4$ .

## 5.1 Zapis Leibniza

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

Iloraz  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  reprezentuje stosunek zmiany wartości  $y$  do zmiany wartości  $x$ .

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}.$$

Prawa strona jest oznaczeniem pochodnej w zapisie Leibniza.

Zobaczmy jak wygląda reguła łańcucha w tym zapisie. Wprowadzamy oznaczenia  $u = f(x)$ ,  $y = g(u)$ . Wtedy

$$\frac{du}{dx} = f'(x), \quad \frac{dy}{du} = g'(u) \underset{y=f(x)}{=} g'(f(x)).$$

Dalej

$$y = g(f(x)), \quad \frac{dy}{dx} = (g \circ f)'(x).$$

Wzór (5.1) przyjmuje postać

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}, \quad u = f(x).$$

### Przykłady.

(a)  $y = \sin^8 x$ . Niech  $u = \sin x$ ,  $y = u^8$ . Wtedy

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 8u^7 \cos x = 8 \sin^7 x \cos x.$$

(b)  $y = \log(\cos(x^2 + 1))$ . Niech  $u = x^2 + 1$ ,  $v = \cos u$ ,  $y = \log v$ .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \frac{dv}{du} \frac{du}{dx} = \frac{1}{v} (-\sin u) 2x = -\frac{2x \sin(x^2 + 1)}{\cos(x^2 + 1)}.$$

**Definicja 5.6.** Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest różniczkowalna w przedziale  $(a, b)$  jeśli  $f'(x)$  istnieje w każdym punkcie  $x$  z  $(a, b)$ . Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest różniczkowalna w przedziale  $[a, b]$  jeśli dodatkowo istnieją  $f'_+(a)$  oraz  $f'_-(b)$ .

**Przykłady.**

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Dla  $x \neq 0$  pochodna istnieje i wynosi

$$f'(x) = \sin \frac{1}{x} + x \frac{-1}{x^2} \cos \frac{1}{x} = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}.$$

Sprawdzimy istnienie pochodnej w 0.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \sin \frac{1}{x}.$$

Otrzymane wyrażenie nie ma granicy, gdy  $x \rightarrow 0$ .

$$(b) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases} \quad \text{Dla } x \neq 0 \text{ mamy}$$

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}.$$

Dalej

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x \sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Zatem

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Zauważmy, że funkcja  $f'(x)$  nie ma granicy w punkcie 0.

**Twierdzenie 5.7.** Niech  $g$  oznacza funkcję odwrotną do funkcji  $f$ . Załóżmy, że  $f'(a)$  istnieje oraz  $f'(a) \neq 0$ . Wtedy funkcja  $g$  jest różniczkowalna w punkcie  $b = f(a)$  oraz

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

**Uwaga.** Przy oznaczeniach  $g = f^{-1}$ ,  $a = f^{-1}(b)$  mamy

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

*Dowód.* Dla  $y = f(x)$  mamy

$$\frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)}.$$

Gdy  $y \rightarrow b$ , to z ciągłości funkcji  $g$  w punkcie  $b$  otrzymujemy  $g(y) \rightarrow g(b)$ , czyli  $x \rightarrow a$ . Zatem

$$\lim_{y \rightarrow b} \frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{f'(a)}.$$

□

**Przykład.**  $y = f(x) = x^n$ ,  $x > 0$ . Wtedy  $x = g(y) = y^{1/n}$ . Zatem

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{x^{n-1}} = \frac{1}{n} y^{\frac{1}{n}-1}.$$

Znajdziemy postać wzoru na pochodną funkcji odwrotnej w zapisie Leibniza. Dla  $y = f(x)$  i  $x = g(y)$  mamy

$$\frac{dy}{dx} = f'(x), \quad \frac{dx}{dy} = g'(y).$$

Zatem

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

**Przykłady.**

(a)  $y = \operatorname{tg} x$ ,  $x = \operatorname{arctg} y$ . Wtedy

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

W szczególności

$$(\operatorname{arctg} t)' \Big|_{t=1} = \frac{1}{2}.$$

(b)  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ . Rzeczywiście, niech  $y = \sin x$ ,  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ .

Wtedy  $x = \arcsin y$ ,  $-1 < y < 1$ . Zatem

$$(\arcsin y)' = \frac{1}{\sin' x} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

W szczególności  $(\arcsin x)' \Big|_{x=0} = 1$ .

Jeśli  $\alpha$  jest kątem nachylenia stycznej do wykresu funkcji  $y = f(x)$  w punkcie  $(a, f(a))$ , to  $f'(a) = \operatorname{tg} \alpha$ . Przy zamianie  $x$  i  $y$  rolami kąt  $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$  określa nachylenie wykresu  $x = g(y)$  (czyli tego samego wykresu) w punkcie  $(g(b), b) = (a, f(a))$ . Zatem

$$g'(b) = \operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{1}{f'(a)}.$$

## 5.2 Maxima i minima

**Definicja 5.8.** Załóżmy, że funkcja  $f(x)$  jest określona w otoczeniu punktu  $a$  i w pewnym przedziale  $(a - \delta, a + \delta)$  mamy  $f(x) \leq f(a)$ . Mówimy wtedy, że  $f$  posiada lokalne maksimum w punkcie  $a$ . Jeśli nierówność jest ostra dla  $x \neq a$  z przedziału  $(a - \delta, a + \delta)$ , to mamy do czynienia ze ścisłym lokalnym maksimum. Podobnie określa się lokalne minimum i ścisłe lokalne minimum.

**Twierdzenie 5.9.** Załóżmy, że funkcja  $f(x)$  jest różniczkowalna i posiada lokalne ekstremum w punkcie  $a$ . Wtedy  $f'(a) = 0$ .

*Dowód.* Załóżmy, że w  $a$  występuje lokalne minimum. Wtedy dla  $a < x < a + \delta$  mamy

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Zatem

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Dla  $a - \delta < x < a$  mamy

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0,$$

czyli

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

Stąd  $f'(a) = 0$ . □

**Definicja 5.10.** *Punktami krytycznym funkcji nazywamy punkty, w których pochodna nie istnieje lub istnieje i wtedy jest równa 0 (punkty stacjonarne).*

### 5.3 Metoda znajdowania wartości największej i najmniejszej funkcji ciągłej na przedziale $[a, b]$

Z twierdzenia Weierstrassa wiemy, że istnieją punkty  $c$  i  $d$  w przedziale  $[a, b]$  takie, że

$$f(c) = \min_{a \leq x \leq b} f(x), \quad f(d) = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

Zajmiemy się położeniem punktu  $c$ . Mamy następujące możliwości.

1.  $c = a$  lub  $c = b$ , tzn.  $c$  jest jednym z końców przedziału.
2.  $a < c < b$ .
  - 2(a) Pochodna w  $c$  nie istnieje.
  - 2(b) Pochodna w  $c$  istnieje i  $f'(c) = 0$ , bo  $c$  jest w szczególności minimum lokalnym.

Reasumując, wartości  $m$  i  $M$  są przyjęte na końcach przedziału lub w jakichś punktach krytycznych. Aby wyznaczyć  $m$  i  $M$  wykonujemy następujące czynności.

- (a) Znajdujemy wszystkie punkty krytyczne funkcji.
- (b) Obliczamy wartości funkcji w punktach krytycznych i na końcach przedziału.

(c) Największa z otrzymanych wartości jest równa  $M$ , a najmniejsza to  $m$ .

**Przykład.**  $f(x) = x^{2/3} - x = (x^2)^{1/3} - x$ ,  $[-1, 1]$ . Obliczamy

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^2)^{-2/3} 2x - 1, \quad x \neq 0.$$

Sprawdzamy istnienie pochodnej w 0.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{x^{2/3} - x}{x} = x^{-1/3} - 1 \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -\infty \\ \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \infty \end{array}$$

Zatem 0 jest punktem krytycznym. Rozwiązujemy równanie  $f'(x) = 0$ . Czyli

$$\frac{2}{3}(x^2)^{-2/3} x - 1 = 0.$$

Stąd  $x = \frac{8}{27}$ . Mamy

$$f(-1) = 2, \quad f(1) = 0, \quad f(0) = 0, \quad f\left(\frac{8}{27}\right) = \frac{4}{27}.$$

Zatem  $m = 0$  i  $M = 2$ .

**Twierdzenie 5.11** (Rolle). *Niech  $f(x)$  będzie funkcją ciągłą na  $[a, b]$  i różniczkowalną w  $(a, b)$ . Jeśli  $f(a) = f(b)$ , to  $f'(c) = 0$ , w pewnym punkcie  $a < c < b$ .*

*Dowód.* Jeśli  $f$  jest stała, tzn.  $f(x) \equiv f(a)$ , to  $f'(x) \equiv 0$ . Jeśli  $f$  nie jest stała, to  $m < M$ . Zatem wartość  $m$  lub  $M$  jest przyjęta w punkcie wewnętrznym  $c$ . Ale wtedy  $f'(c) = 0$ . □

**Twierdzenie 5.12** (Cauchy). *Funkcje  $f(x)$  i  $g(x)$  są ciągłe w  $[a, b]$  i różniczkowalne w  $(a, b)$ , przy czym  $g'(x) \neq 0$ , dla  $a < x < b$ . Wtedy*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

dla pewnego punktu  $c$ ,  $a < c < b$ .

*Dowód.* Mamy  $g(a) \neq g(b)$ , bo gdyby  $g(a) = g(b)$ , to z twierdzenia Rolle'a mielibyśmy  $g'(c) = 0$  dla pewnego punktu  $a < c < b$ . Określmy funkcję

$$h(x) = f(a) - f(x) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)].$$

Wtedy  $h(a) = h(b)$ . Z twierdzenia Rolle'a otrzymujemy  $h'(c) = 0$  dla pewnego  $a < c < b$ . Tzn.

$$0 = -f'(c) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(c).$$

Po przekształceniu otrzymujemy tezę. □

**Twierdzenie 5.13** (Lagrange, o wartości średniej). *Jeśli  $f(x)$  jest funkcją ciągłą na  $[a, b]$  i różniczkowalną w  $(a, b)$ , to dla pewnego punktu  $a < c < b$  mamy*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

*Dowód.* Stosujemy twierdzenie Cauchy'ego dla  $g(x) = x$ . □

**Uwaga.** Wyrażenie  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  jest współczynnikiem nachylenia siecznej przechodzącej przez punkty  $(a, f(a))$  i  $(b, f(b))$ . Z kolei  $f'(c)$  jest współczynnikiem nachylenia stycznej do wykresu w punkcie  $(c, f(c))$ . Twierdzenie Lagrange'a mówi zatem, że w pewnym punkcie styczna do wykresu jest równoległa do siecznej.

**Wniosek 5.14.** *Jeśli  $f'(x) = 0$  dla wszystkich  $a < x < b$ , to funkcja  $f(x)$  jest stała.*

*Dowód.* Niech  $a < x, y < b$ . Możemy przyjąć  $x < y$ . Wtedy

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(z) = 0,$$

dla pewnego punktu  $x < z < y$ . Zatem  $f(x) = f(y)$ . □

**Wniosek 5.15.** *Jeśli  $f'(x) = g'(x)$  dla  $a < x < b$ , to  $f(x) = g(x) + c$  dla pewnej stałej  $c$ .*

*Dowód.* Dla  $h(x) = f(x) - g(x)$  mamy  $h'(x) = 0$ , zatem  $h(x) \equiv c$ . □

**Twierdzenie 5.16.** *Jeśli  $f'(x) \geq 0$  dla  $a < x < b$ , to  $f(x)$  jest funkcją rosnącą. Jeśli  $f'(x) > 0$  dla  $a < x < b$ , to  $f(x)$  jest ściśle rosnąca.*

**Uwaga.** Podobne twierdzenie jest prawdziwe dla przeciwnej nierówności.

*Dowód.* Niech  $a < x < y < b$ . Wtedy z twierdzenia Lagrange'a mamy

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(z) \geq 0$$

dla pewnego punktu  $x < z < y$ . Zatem  $f(y) \geq f(x)$ . W przypadku  $f'(z) > 0$  otrzymujemy  $f(y) > f(x)$ .  $\square$

**Uwaga.** Jeśli  $f(x)$  jest ściśle rosnąca, to nie znaczy, że  $f'(x) > 0$  dla każdego punktu  $x$ . Np.  $f(x) = x^3$ .

**Przykład.** Udowodnić, że

$$(1 + x)^\alpha > 1 + \alpha x, \quad \text{dla } x > -1, x \neq 0, \alpha > 1. \quad (5.2)$$

Określamy

$$f(x) = (1 + x)^\alpha - \alpha x - 1.$$

Pomocniczo obliczamy

$$(x^\alpha)' = (e^{\alpha \log x})' = e^{\alpha \log x} \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}, \quad x > 0.$$

Zatem

$$f'(x) = \alpha(1 + x)^{\alpha-1} - \alpha = \alpha[(1 + x)^{\alpha-1} - 1].$$

Stąd  $f'(x) > 0$  dla  $x > 0$  oraz  $f'(x) < 0$  dla  $-1 < x < 0$ . To oznacza, że funkcja  $f(x)$  ściśle rośnie na półprostej  $[0, \infty)$  i ściśle maleje na  $(-1, 0]$ . Wnioskujemy, że  $f(x) > f(0)$  dla  $x > -1, x \neq 0$ . Czyli  $(1 + x)^\alpha - \alpha x - 1 > 0$  dla  $x > -1, x \neq 0$ .

## 5.4 Wyższe pochodne

**Definicja 5.17.** *Jeśli  $f'(x)$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ , to jej pochodną oznaczamy symbolem*

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}$$

*i nazywamy drugą pochodną w punkcie  $a$ .*



**Przykłady**

$$(a) f(x) = \sin x, f'(x) = \cos x, f''(x) = -\sin x.$$

$$(b) f(x) = x^{1/2}, f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}, f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}.$$

Podobnie określamy następne pochodne. Czyli  $n$ -ta pochodna funkcji jest pochodną  $(n-1)$ -tej pochodnej. Używamy symbolu  $f^{(n)}$ .

**Przykład**

$$\begin{array}{lll} f(x) = \sin x & f'(x) = \cos x & f''(x) = -\sin x \\ f'''(x) = -\cos x & f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(2014)}(x) = \sin x. \end{array}$$

**Przyśpieszenie**

Drugą pochodną położenia obiektu (poruszającego się po linii prostej) względem czasu nazywamy przyśpieszeniem, czyli chwilowym tempem zmiany prędkości. Średnie przyśpieszenie od chwili  $t_0$  do chwili  $t$  wynosi

$$\frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0}.$$

Wtedy

$$a(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f'(t) - f'(t_0)}{t - t_0} = f''(t_0),$$

gdzie  $f(t)$  oznacza położenie obiektu na prostej.

**5.5 Różniczkowanie niejawne**

Funkcje w dotychczasowych przykładach były podane jawnym wzorem  $y = f(x)$ , np.  $y = \frac{x^2}{1+x}$ ,  $y = \operatorname{tg} x$ . Załóżmy, że  $y$  jest związane z  $x$  poprzez równanie, np.

$$x^3 + y^3 = 2xy, \quad (5.3)$$

przy czym  $y$  jest funkcją zmiennej  $x$ . Załóżmy, że  $y$  jest różniczkowalna. Chcemy obliczyć  $y'$ . Różniczkujemy tożsamość (5.3), czyli nakładamy  $d/dx$  pamiętając, że  $y = y(x)$ . Otrzymamy

$$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 2y + 2x \frac{dy}{dx},$$

czyli

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y - 3x^2}{3y^2 - 2x}, \quad 3y^2 \neq 2x.$$

**Przykład.** Załóżmy, że  $y$  jest różniczkowalną funkcją zmiennej  $x$  spełniającą równanie

$$x^3 = y^4 + x^2 \sin y + 1,$$

oraz  $y = 0$  dla  $x = 1$ . Chcemy obliczyć  $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=1}$ . Nakładamy pochodną  $d/dx$  na tożsamość.

$$3x^2 = 4y^3 \frac{dy}{dx} + 2x \sin y + x^2 \cos y \frac{dy}{dx}. \quad (5.4)$$

Dalej

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - 2x \sin y}{4y^3 + x^2 \cos y}.$$

Zatem  $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=1} = 3$ . Różniczkując tożsamość (5.4) można obliczyć  $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}}$ .

**Uwaga.** Oznaczenie Leibniza na wyższe pochodne funkcji  $y = f(x)$

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

**Przykład.** Znaleźć styczną do wykresu funkcji  $y$  zadanej równaniem

$$x^2 + y^2 = 1$$

w punkcie  $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ . Obliczamy

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

Zatem

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

Stąd  $\frac{dy}{dx}\Big|_{\substack{x=-1/2 \\ y=\sqrt{3}/2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ . Styczna ma zatem równanie

$$y - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left( x + \frac{1}{2} \right).$$

## 5.6 Related rates

Pompujemy balon w kształcie sfery. Wtedy objętość  $V$  i promień  $r$  są funkcjami czasu  $t$  związanymi ze sobą równaniem

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Różniczkując równanie względem  $t$  otrzymamy

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}. \quad (5.5)$$

Balon jest pompowany w tempie  $10 \text{ cm}^3/\text{s}$ . Jakie jest tempo zmiany promienia w momencie, gdy  $r = 10 \text{ cm}$ ? Niech  $t_0$  oznacza moment czasu, gdy  $r = 10$ . Do wzoru (5.5) podstawiamy  $t = t_0$ . Wtedy

$$10 = \left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=t_0} = 4\pi 10^2 \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=t_0}.$$

Zatem

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=t_0} = \frac{1}{40\pi} \text{ (cm/s)}.$$

Na odcinku drogi z ograniczeniem  $60 \text{ km/h}$  policja ustawiła radar  $5 \text{ m}$  od drogi (za krzaczkami). Samochód jedzie z prędkością  $90 \text{ km/h}$ . Jaki będzie odczyt na radarze, gdy samochód znajdzie się  $20 \text{ m}$  od miejsca na drodze, w pobliżu którego ustawiono radar? Niech  $y$  oznacza odległość pojazdu od radaru a  $x$  odległość pojazdu od odpowiadającego miejsca na drodze. Wtedy  $y^2 = x^2 + 5^2$ . Chcemy znaleźć  $\frac{dy}{dt}$  w momencie, gdy  $x = 20 \text{ m}$ . Różniczkujemy równanie względem  $t$ . Otrzymamy

$$2y \frac{dy}{dt} = 2x \frac{dx}{dt}.$$

Zatem

$$\frac{dy}{dt} = \frac{x}{y} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5}} \frac{dx}{dt}.$$

Wiemy, że  $\frac{dx}{dt} = -90$ . Niech  $t_0$  oznacza moment czasu, gdy  $x = 20$ . Wtedy

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=t_0} = -90 \frac{20}{\sqrt{400 + 25}} \approx -87,3.$$

Jaki jest pomiar na radarze, gdy  $x = 4$ ? Oznaczmy przez  $t_1$  ten moment czasu.

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=t_1} = -90 \frac{4}{\sqrt{41}} \approx -56,22.$$

## 5.7 Aproksymacja za pomocą stycznej

Rozważamy funkcję  $f(x) = x^{1/3}$ . Chcemy obliczyć  $\sqrt[3]{1,1}$ . Ogólnie założmy, że  $f(x)$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ , czyli

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a).$$

To oznacza, że

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \approx f'(a),$$

gdy  $x$  leży blisko  $a$ . Otrzymujemy

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Prawa strona reprezentuje równanie stycznej do wykresu w punkcie  $a$ . Oznaczmy  $h = x - a$ . Wtedy

$$f(a + h) \approx f(a) + h f'(a). \quad (5.6)$$

Aby obliczyć przybliżoną wartość  $\sqrt[3]{1,1}$  przyjmujemy  $a = 1$  i  $h = 0,1$ . Mamy  $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ , zatem  $f'(1) = \frac{1}{3}$ . Z (5.6) otrzymujemy

$$\sqrt[3]{1,1} \approx 1 + 0,1 \cdot \frac{1}{3} = 1,033 \dots$$

Dla porównania dokładna wartość wynosi

$$\sqrt[3]{1,1} = 1,0322 \dots$$

## 5.8 Reguła de l'Hospitala

**Twierdzenie 5.18** (Reguła de l'Hospitala). *Założmy, że funkcje  $f(x)$  i  $g(x)$  są ciągłe w  $[a, b)$  oraz różniczkowalne w  $(a, b)$ . Ponadto  $f(a) = g(a) = 0$  oraz  $g'(x) \neq 0$  dla  $a < x < b$ . Wtedy*

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

o ile granica po prawej stronie istnieje.

**Uwaga.** Analogiczne twierdzenie jest prawdziwe dla granicy lewostronnej i dwustronnej.

*Dowód.* Niech  $x > a$ . Wtedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

dla pewnego  $\xi$ ,  $a < \xi < x$ . Gdy  $x \rightarrow a^+$ , to  $\xi \rightarrow a^+$ . Zatem

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

□

**Uwaga.** Teza jest prawdziwa również dla granicy niewłaściwej.

**Przykłady.**

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos x} = \frac{1}{2}.$$

Lepszym wyjściem jest użycie wzorów trygonometrycznych

$$\frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} = \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{1 + \cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}.$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin \pi x}{\sqrt{1 - x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi \cos \pi x}{\frac{-x}{\sqrt{1 - x^2}}} = - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi \sqrt{1 - x^2} \cos \pi x}{x} = 0.$$

Można też obliczyć granicę bezpośrednio

$$\frac{\sin \pi x}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\sin \pi(1 - x)}{\pi(1 - x)} \cdot \frac{\sqrt{1 - x}}{\sqrt{1 + x}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 1 \cdot \frac{0}{\sqrt{2}} = 0.$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sqrt{\sin x}}{\log \frac{x}{\pi}} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x} \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{x \cos x}{2\sqrt{\sin x}} = -\infty.$$

**Wniosek 5.19.** Załóżmy, że funkcje  $f(x)$  i  $g(x)$  są różniczkowalne w przedziale  $(a, \infty)$ ,  $g'(x) \neq 0$  dla  $x > a$ , oraz  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ . Wtedy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

o ile druga granica istnieje.

*Dowód.* Możemy przyjąć, że  $a \geq 1$ . Określmy funkcje

$$F(y) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{y}\right) & 0 < y < \frac{1}{a}, \\ 0 & y = 0, \end{cases} \quad G(y) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{y}\right) & 0 < y < \frac{1}{a}, \\ 0 & y = 0. \end{cases}$$

Wtedy  $F$  i  $G$  są różniczkowalne w przedziale  $(0, \frac{1}{a})$  i ciągłe w punkcie 0. Rzeczywiście

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} F(y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{y}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

Dalej

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{1}{y}\right)}{g\left(\frac{1}{y}\right)} \stackrel{(H)}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{y^2} f'\left(\frac{1}{y}\right)}{-\frac{1}{y^2} g'\left(\frac{1}{y}\right)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'\left(\frac{1}{y}\right)}{g'\left(\frac{1}{y}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

□

**Przykład.**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$$

**Twierdzenie 5.20** (Reguła de l'Hospitala dla  $\frac{\infty}{\infty}$ ). Funkcje  $f(x)$  i  $g(x)$  są różniczkowalne w  $(a, b)$  oraz  $g'(x) \neq 0$  dla  $a < x < b$ . Załóżmy, że

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty.$$

Wtedy

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

o ile granica po prawej stronie istnieje.

**Uwaga.** Analogiczne twierdzenie jest prawdziwe dla granic lewostronnych, obustronnych i granic w  $\pm\infty$ .

**Uwaga.** Przekształcenie

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x)^{-1}}{f(x)^{-1}}$$

i użycie Twierdzenia 5.18 nie będzie skuteczne, bo

$$\frac{(g(x)^{-1})'}{(f(x)^{-1})'} = \frac{g'(x) (f(x))^2}{f'(x) (g(x))^2}.$$

*Dowód.* Idea dowodu polega na tym, że dla  $x$  blisko  $a$  wyrażenia  $\frac{f(x)}{g(x)}$  oraz  $\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$  zachowują się podobnie. Niech  $a < x < x_0$ . Wtedy

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) - f(x_0) + f(x_0)}{g(x) - g(x_0) + g(x_0)} \\ &= \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} + \frac{f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - g(x_0)}} = \frac{\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} + \frac{f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - g(x_0)}} \end{aligned}$$

dla pewnego punktu  $\xi$  położonego pomiędzy  $x$  i  $x_0$ . Oznaczmy  $L = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ . Wtedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} - L = \frac{\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - L + \frac{f(x_0) - Lg(x_0)}{g(x) - g(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - g(x_0)}}.$$

Ustalmy liczbę  $0 < \eta < 1/2$ . Wybierzmy  $x_0$  tak, aby

$$\left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - L \right| < \eta, \quad \text{dla } a < t < x_0.$$

Wtedy

$$\left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - L \right| < \eta.$$

Ponieważ  $g(x) \rightarrow \infty$  dla  $x \rightarrow a^+$ , to możemy teraz znaleźć  $a < x_1 \leq x_0$  tak, aby

$$\frac{|f(x_0) - Lg(x_0)| + |g(x_0)|}{|g(x) - g(x_0)|} < \eta, \quad \text{dla } a < x < x_1.$$

Niech  $a < x < x_1$ . Otrzymamy

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| \leq \frac{\left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - L \right| + \left| \frac{f(x_0) - Lg(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \right|}{1 - \left| \frac{g(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \right|} < \frac{2\eta}{1 - \eta} < 4\eta.$$

□

### Przykłady.

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x} = 0. \text{ Można też uzasadnić inaczej: dla } x > 0 \text{ mamy}$$

$$0 < \frac{x^k}{e^x} \leq \frac{x^k}{\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}} = \frac{(k+1)!}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0.$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \log x} = \lim_{y=x \log x, y \rightarrow 0^-} e^y = 1.$$

## 5.9 Pochodna ciągu i szeregu funkcyjnego

**Twierdzenie 5.21.** *Funkcje  $f_n(x)$  są ciągłe i różniczkowalne w sposób ciągły w przedziale  $[a, b]$ . Załóżmy, że ciągi  $f_n(x)$  i  $f'_n(x)$  są jednostajnie zbieżne do  $f(x)$  i  $g(x)$ , odpowiednio. Wtedy  $f'(x) = g(x)$  (na końcach przedziału  $f'_+(a) = g(a)$  i  $f'_-(b) = g(b)$ ). Tzn.*

$$\left( \lim_n f_n(x) \right)' = \lim_n f'_n(x).$$

*Czyli pochodna granicy ciągu funkcji jest granicą pochodnych tych funkcji.*



*Dowód.* Niech  $a \leq x_0 \leq b$ . Chcemy pokazać, że  $f'(x_0) = g(x_0)$ . Z założenia dla  $\varepsilon > 0$  istnieje próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  mamy  $|f'_n(t) - g(t)| < \varepsilon/3$ , dla  $a \leq t \leq b$ . Wiemy, że funkcja  $g(x)$  jest ciągła, jako granica jednostajnie zbieżnego ciągu funkcji  $f'_n(x)$ . Zatem istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że dla  $|\xi - x_0| < \delta$  mamy  $|g(\xi) - g(x_0)| < \varepsilon/3$ . Niech  $0 < |x - x_0| < \delta$ . Wtedy dla  $n > N$  otrzymujemy

$$\begin{aligned} \left| \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} - g(x_0) \right| &= |f'_n(\xi) - g(x_0)| \\ &\leq |f'_n(\xi) - g(\xi)| + |g(\xi) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \frac{2}{3}\varepsilon, \end{aligned}$$

dla pewnego punktu  $\xi$  leżącego pomiędzy  $x$  i  $x_0$ . Zatem dla  $0 < |x - x_0| < \delta$  mamy

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - g(x_0) \right| = \lim_n \left| \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} - g(x_0) \right| \leq \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon.$$

To oznacza, że

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = g(x_0),$$

czyli  $f'(x_0) = g(x_0)$ . □

**Uwaga.** W dowodzie wykorzystana była jedynie zbieżność punktowa ciągu  $f_n$ .

**Uwaga.** Wystarczy założyć, że ciąg  $f_n(x)$  jest zbieżny w jednym punkcie  $c$  przedziału  $[a, b]$ . Rzeczywiście, z tego warunku wynika jednostajna zbieżność ciągu  $f_n(x)$ . Sprawdźmy jednostajny warunek Cauchy'ego dla ciągu  $f_n(x)$ .

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &\leq \underbrace{|[f_n(x) - f_m(x)] - [f_n(c) - f_m(c)]|}_{h(x)} + |f_n(c) - f_m(c)| \\ &= \underbrace{|f'_n(\xi) - f'_m(\xi)|}_{h'(\xi)} |x - c| + |f_n(c) - f_m(c)| \\ &\leq (b - a)|f'_n(\xi) - f'_m(\xi)| + |f_n(c) - f_m(c)|. \end{aligned}$$

**Wniosek 5.22.** Załóżmy, że funkcje  $f_n$  są ciągłe i różniczkowalne w sposób ciągły w przedziale  $[a, b]$ . Jeśli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest zbieżny przynajmniej w

w jednym punkcie, natomiast szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$  jest zbieżny jednostajnie, to suma szeregu  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  jest funkcją różniczkowalną oraz

$$\left( \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x), \quad (5.7)$$

tzn. pochodna sumy szeregu funkcyjnego jest szeregiem pochodnych.

*Dowód.* Niech  $s_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ . Ciąg funkcyjny  $s_n(x)$  spełnia założenia poprzedniego twierdzenia. Zatem  $\left( \lim_n s_n(x) \right)' = \lim_n s'_n(x)$ , co jest równoznaczne z (5.7).  $\square$

**Przykład.**  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx^2}}{n^3}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ . Przyjmujemy  $f_n(x) = \frac{e^{-nx^2}}{n^3}$ . Wtedy  $f'_n(x) = -\frac{2xe^{-nx^2}}{n^2}$ , co daje  $|f'_n(x)| \leq \frac{2}{n^2}$ . Zatem szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny. Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  też jest jednostajnie zbieżny. Czyli  $s'(x) = -2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx^2}}{n^2}$ .

**Twierdzenie 5.23.** Załóżmy, że liczba  $R > 0$  jest promieniem zbieżności szeregu potęgowego  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . Wtedy funkcja  $f(x)$  jest różniczkowalna w przedziale  $(-R, R)$  oraz  $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ .

**Uwaga.** Szereg potęgowy dla funkcji  $f'(x)$  ma większe wartości bezwzględne współczynników, więc promień zbieżności nie może być mniejszy od  $R$ . Jednak promienie zbieżności obu szeregów są takie same. Istotnie, niech  $R'$  oznacza promień zbieżności dla  $x^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$   $x \neq 0$ .

(a) Jeśli istnieje granica  $\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{R}$ , to

$$\frac{1}{R'} = \lim_n \frac{(n+1)|a_{n+1}|}{n|a_n|} = \lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{R}.$$

(b) Jeśli istnieje granica  $\lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$ , to

$$\frac{1}{R'} = \lim_n \sqrt[n]{n|a_n|} = \lim_n \sqrt[n]{n} \lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}.$$

Ogólnie mamy

$$\frac{1}{R'} = \lim_n \sup \sqrt[n]{n|a_n|} = \lim_n \sqrt[n]{n} \lim_n \sup \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}.$$

*Dowód.* Szereg pochodnych  $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$  jest zbieżny w przedziale  $(-R, R)$ .

Wiemy, że zbieżność jest jednostajna w każdym przedziale  $[-R + \delta, R - \delta]$ , dla  $\delta > 0$ . Z Wniosku 5.22 otrzymujemy tezę, czyli

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

□

**Wniosek 5.24.** Funkcja  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  dla  $-R < x < R$ , gdzie  $R$  jest promieniem zbieżności, jest nieskończenie wiele razy różniczkowalna oraz

$$f^{(k)}(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)^{(k)} = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n x^{n-k}.$$

*Dowód.* Stosujemy wielokrotnie Wniosek 5.22, korzystając z faktu, że promień zbieżności nie zmienia się przy różniczkowaniu. □

**Przykłady.**

(a) Rozważmy funkcję  $f(x) = \log(1+x)$ ,  $x > -1$ . Mamy

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad \text{dla } |x| < 1.$$

Rozważmy szereg  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ . Promień zbieżności tego szeregu wynosi 1. Z Twierdzenia 5.23 mamy

$$\left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \right)' = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} = (\log(1+x))'.$$

Zatem

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n + C, \quad |x| < 1,$$

dla pewnej stałej  $C$ . Podstawiając  $x = 0$  uzyskamy  $C = 0$ . Zatem

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n, \quad \text{dla } -1 < x < 1. \quad (5.8)$$

Z kryterium Leibniza szereg po prawej stronie jest zbieżny również dla  $x = 1$ . Zatem z Twierdzenia 4.17 otrzymujemy

$$\log 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

(b)  $f(x) = \arctg x$ . Wtedy

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1.$$

Rozważmy szereg  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ . Szereg ten jest zbieżny dla  $|x| < 1$ .

Wiemy, że

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = (\arctg x)',$$

czyli

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + C, \quad |x| < 1.$$

Podstawiamy  $x = 0$  i otrzymujemy, że  $C = 0$ . Zatem

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < 1. \quad (5.9)$$

Podobnie jak w poprzednim przykładzie możemy podstawić  $x = 1$  i uzyskać

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

## 5.10 Wzory Taylora i MacLaurina

**Twierdzenie 5.25** (Wzór Taylora). *Niech  $f(x)$  będzie funkcją  $n$ -krotnie różniczkowalną w przedziale wokół punktu  $a$ . Wtedy dla liczb  $b$  z tego przedziału mamy*

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + R_n,$$

gdzie  $R_n$  ma jedną z dwu postaci:

(1)  $R_n = \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta(b-a))$ , dla pewnej liczby  $0 < \theta < 1$  (*reszta w postaci Lagrange'a*),

(2)  $R_n = \frac{(b-a)^n}{(n-1)!} (1-\theta')^{n-1} f^{(n)}(a + \theta'(b-a))$ , dla pewnej liczby  $0 < \theta' < 1$  (*reszta w postaci Cauchy'ego*).

### Uwagi

1. Oznaczmy  $b - a = h$ . Wtedy

$$f(a+h) = f(a) + \frac{h}{1!} f'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + R_n,$$

$$R_n = \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta h) = \frac{h^n}{(n-1)!} (1-\theta')^{n-1} f^{(n)}(a + \theta' h).$$

2. Reszta  $R_n$  oraz  $\theta$  i  $\theta'$  zależą od  $a$ ,  $b$  i  $n$ .

*Dowód.* Oznaczmy

$$g(x) = f(b) - f(x) - \frac{(b-x)}{1!} f'(x) - \frac{(b-x)^2}{2!} f''(x) - \dots - \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x).$$

Wtedy

$$g'(x) = -\cancel{f'(x)} + \cancel{f'(x)} - \frac{(b-x)}{1!} \cancel{f''(x)} + \frac{(b-x)}{1!} \cancel{f''(x)} - \frac{(b-x)^2}{2!} \cancel{f'''(x)} + \dots + \frac{(b-x)^{n-2}}{(n-2)!} \cancel{f^{(n-1)}(x)} - \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(x). \quad (5.10)$$

Mamy  $g(a) = R_n$  oraz  $g(b) = 0$ . Z twierdzenia Lagrange'a otrzymujemy

$$\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(a + \theta'(b - a)),$$

dla pewnej liczby  $0 < \theta' < 1$ . Zatem  $R_n = -(b-a)g'(a + \theta'(b-a))$ . Podstawiamy  $x = a + \theta'(b-a)$  do wzoru (5.10). Wtedy

$$b - x = b - a - \theta'(b - a) = (1 - \theta')(b - a)$$

oraz

$$R_n = \frac{(b-a)^n}{(n-1)!} (1 - \theta')^{n-1} f^{(n)}(a + \theta'(b-a)).$$

Rozważmy funkcję  $u(x) = (b-x)^n$ . Mamy  $u(a) = (b-a)^n$  oraz  $u(b) = 0$ . Z twierdzenia Cauchy'ego otrzymujemy

$$\frac{g(b) - g(a)}{u(b) - u(a)} = \frac{g'(a + \theta(b-a))}{u'(a + \theta(b-a))},$$

dla pewnej liczby  $0 < \theta < 1$ . dalej

$$R_n = (b-a)^n \frac{g'(a + \theta(b-a))}{u'(a + \theta(b-a))}.$$

Mamy  $u'(x) = -n(b-x)^{n-1}$ . Z (5.10) wynika, że

$$\frac{g'(x)}{u'(x)} = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}.$$

Ostatecznie

$$R_n = \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta(b-a)).$$

□

**Uwaga.** Przy dowodzie wzoru na resztę w postaci Lagrange'a skorzystaliśmy z twierdzenia Cauchy'ego, natomiast przy postaci Cauchy'ego skorzystaliśmy z twierdzenia Lagrange'a.

We wzorze Taylora przyjmijmy  $b = x$  i  $a = 0$ . Wtedy otrzymujemy wzór McLaurina

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(0) + R_n, \quad (5.11)$$

$$R_n = \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(\theta x) = \frac{x^n}{(n-1)!}(1-\theta')^{n-1}f^{(n)}(\theta'x).$$

**Uwagi.**

1. Jeśli  $f(x)$  jest wielomianem, to  $R_n = 0$ , gdy  $n$  przekroczy stopień wielomianu.
2. Z warunku  $R_n \xrightarrow[n]{} 0$  wynika

$$f(x) = f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Jeśli  $|f^{(n)}(t)| \leq M$  dla stałej niezależnej od  $n$ , to  $R_n \xrightarrow[n]{} 0$ , bo  $\frac{x^n}{n!} \xrightarrow[n]{} 0$  (np. z kryterium d'Alemberta). Można dopuścić też słabszy warunek  $|f^{(n)}(t)| \leq M^n$ .

3. Reszta  $R_n$  nie musi dążyć do zera nawet, gdy szereg jest zbieżny. Rozważmy funkcję

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Można udowodnić, że  $f$  jest różniczkowalna nieskończenie wiele razy oraz  $f^{(n)}(0) = 0$  (w tym celu wystarczy pokazać, że  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/t}}{t^n} = 0$ ). Wtedy ze wzoru (5.11) otrzymujemy  $f(x) = R_n$ .

4. Przypuśćmy, że szereg potęgowy  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ma dodatni promień zbieżności. Prawa strona jest wtedy automatycznie szeregiem McLaurina funkcji  $f(x)$ , tzn.  $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ . Rzeczywiście, na podstawie Wniosku 5.24 mamy  $f^{(k)}(0) = k!a_k$ .

**Przykład.**  $f(x) = (1+x)^\alpha$ ,  $x > -1$ . Mamy

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

Zatem

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} =: \binom{\alpha}{n}.$$

Ze wzoru McLaurina otrzymujemy, przy konwencji  $\binom{\alpha}{0} = 1$ ,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{\alpha}{k} x^k + R_n.$$

Pokażemy, że  $R_n \xrightarrow[n]{} 0$  dla  $|x| < 1$ . Skorzystamy z postaci Cauchy'ego reszty.

$$\begin{aligned} R_n &= \frac{x^n}{(n-1)!} (1-\theta)^{n-1} f^{(n)}(\theta x) \\ &= \frac{x^n}{(n-1)!} (1-\theta)^{n-1} \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+\theta x)^{\alpha-n} \\ &= n \binom{\alpha}{n} x^n (1-\theta)^{n-1} (1+\theta x)^{\alpha-n}. \end{aligned}$$

Wyrażenie  $n \binom{\alpha}{n} x^n$  dąży do 0 dla  $|x| < 1$ , np. z kryterium d'Alemberta.

Wystarczy udowodnić, że wielkość  $(1-\theta)^{n-1}(1+\theta x)^{\alpha-n}$  jest ograniczona. Dla  $|x| < 1$  i  $0 < \theta < 1$  mamy  $1-\theta \leq 1+\theta x$ . Zatem

$$(1-\theta)^{n-1}(1+\theta x)^{\alpha-n} \leq (1+\theta x)^{n-1}(1+\theta x)^{\alpha-n} = (1+\theta x)^{\alpha-1}.$$

Zależność od  $n$  jest jeszcze ukryta w  $\theta$ . Dalej

$$(1+\theta x)^{\alpha-1} \leq \begin{cases} 2^{\alpha-1}, & \alpha \geq 1, \\ (1-|x|)^{\alpha-1}, & \alpha < 1, \end{cases}$$

przy czym dla  $\alpha < 1$  skorzystaliśmy z nierówności  $1+\theta x \geq 1-|x|$ . Reasumując otrzymaliśmy uogólniony wzór dwumianowy Newtona.

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1. \quad (5.12)$$



Przyjmijmy  $\alpha = -\frac{1}{2}$ . W miejsce  $x$  podstawmy  $-x^2$  dla  $|x| < 1$ . Wtedy

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n x^{2n}.$$

Dalej

$$\binom{-\frac{1}{2}}{n} = (-1)^n \frac{1}{2} \frac{3}{2} \cdots \frac{2n-1}{2} \frac{1}{n!} = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! 2^n n!} = \frac{(-1)^n}{4^n} \binom{2n}{n},$$

bo  $(2n-1)!! = \frac{(2n)!}{2^n n!}$ . Ostatecznie uzyskaliśmy

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{2n}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad |x| < 1.$$

Ale  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  dla  $|x| < 1$ . Zatem

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2n+1} \binom{2n}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}, \quad |x| < 1. \quad (5.13)$$

Dla  $x = \frac{1}{2}$ , po pomnożeniu przez 2 obu stron (5.13), otrzymamy

$$\frac{\pi}{3} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{16^n}.$$

Podstawiając dla odmiany  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  i mnożąc (5.13) przez  $\sqrt{2}$  uzyskamy

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{8^n}.$$

Zauważmy, że dla  $0 < x < 1$  mamy

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} = \arcsin 1 > \arcsin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} \binom{2n}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1} \\ &\geq \sum_{n=0}^N \frac{2}{2n+1} \binom{2n}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}. \end{aligned}$$

Przechodząc do granicy  $x \rightarrow 1^-$  otrzymamy

$$\frac{\pi}{2} \geq \sum_{n=0}^N \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{4^n}.$$

Ponieważ liczba  $N$  jest dowolna, to

$$\frac{\pi}{2} \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{4^n}.$$

Dalej

$$\begin{aligned} \arcsin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} \binom{2n}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{4^n}. \end{aligned}$$

Przechodzimy do granicy  $x \rightarrow 1^-$ , aby uzyskać

$$\frac{\pi}{2} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{4^n}.$$

Otrzymujemy zatem

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \binom{2n}{n} \frac{1}{4^n}. \quad (5.14)$$

**Uwaga.** Zbieżność szeregu po prawej stronie (5.14) można też uzyskać ze wzoru Stirlinga podającego przybliżoną wartość wielkości  $n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ .

**Twierdzenie 5.26** (Reszta Peano). *Jeśli funkcja  $f(x)$  jest  $n$ -krotnie różniczkowalna w punkcie  $a$ , to*

$$f(a+h) = f(a) + \frac{h}{1!} f'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) + R_n(h),$$

gdzie

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_n(h)}{h^n} = 0,$$

tzn. wielkość  $R_n(h)$  jest mała w stosunku do  $h^n$  dla małych wartości  $|h|$ .

*Dowód.* Zastosujemy wielokrotnie regułę de'Hospitala.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_n(h)}{h^n} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - \frac{h}{1!}f'(a) - \frac{h^2}{2!}f''(a) - \dots - \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(a)}{h^n} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a) - \frac{h}{1!}f''(a) - \frac{h^2}{2!}f'''(a) - \dots - \frac{h^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(a)}{nh^{n-1}} \\ &= \dots = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(a+h) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)h}{n!h} \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f^{(n-1)}(a+h) - f^{(n-1)}(a)}{h} - f^{(n)}(a) \right] = 0. \end{aligned}$$

Ostatnia granica wynosi zero bezpośrednio z określenia pochodnej w punkcie  $a$ .  $\square$

**Definicja 5.27.** Punkt  $x_0$  nazywamy **punktem przegięcia** funkcji  $f$ , jeżeli dla wszystkich punktów  $x \neq x_0$  w pobliżu  $x_0$  mamy  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > f'(x_0)$ , lub dla wszystkich takich punktów mamy  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < f'(x_0)$ .

**Uwaga.** Geometrycznie oznacza to, że części wykresu funkcji dla  $x < x_0$  i dla  $x > x_0$  leżą po przeciwnych stronach stycznej do wykresu w punkcie  $(x_0, f(x_0))$ . Rzeczywiście, niech  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > f'(x_0)$ . Wtedy

$$\begin{aligned} f(x) &> f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \text{dla } x > x_0, \\ f(x) &< f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \text{dla } x < x_0. \end{aligned}$$

**Twierdzenie 5.28.** Funkcja  $f(x)$  jest  $n$ -krotnie różniczkowalna w przedziale wokół punktu  $a$  oraz  $f^{(n)}$  jest ciągła w  $a$ . Załóżmy, że

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad f^{(n)}(a) \neq 0, \quad n \geq 2.$$

Jeśli  $n$  jest liczbą parzystą, to funkcja posiada ściśle ekstremum lokalne w punkcie  $a$ . W przeciwnym wypadku  $a$  jest punktem przegięcia funkcji  $f$ .

*Dowód.* Rozważmy przypadek  $f^{(n)}(a) > 0$ . Z ciągłości możemy przyjąć, że  $f^{(n)}(t) > 0$  dla argumentów  $t$  blisko  $a$ . Niech  $x$  leży blisko  $a$ . Wtedy ze wzoru Taylora z resztą w postaci Lagrange'a otrzymujemy

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - a)^n,$$

dla pewnego punktu  $\xi$  pomiędzy  $a$  i  $x$ . Jeśli  $n$  jest liczbą parzystą, to drugi składnik po prawej stronie wzoru jest dodatni. Zatem  $f(x) > f(a)$  dla  $x \neq a$  w pobliżu  $a$ . To oznacza, że w  $a$  występuje ściśle minimum. Jeśli  $n$  jest liczbą nieparzystą, to

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - a)^{n-1} > 0 = f'(a),$$

dla  $x$  blisko  $a$ . Wtedy  $a$  jest punktem przegięcia.  $\square$

### Uwagi.

1. W punkcie przegięcia nie może występować ekstremum lokalne.
2. Jeśli  $f''(a) > 0$ , to w  $a$  jest ściśle minimum, a dla  $f''(a) < 0$ , ściśle maksimum.

### Przykłady.

- (a) Chcemy znaleźć ekstrema funkcji  $f(x) = x^4 + 4x$ . Obliczamy  $f'(x) = 4(x^3 + 1)$ . Zatem  $f'(-1) = 0$ . Dalej  $f''(-1) = 12$ . Zatem w punkcie  $-1$  występuje ściśle lokalne minimum.
- (b)  $f(x) = x^3 + x^4$ . Mamy  $f'(x) = 3x^2 + 4x^3 = x^2(3 + 4x)$ . Pochodna zeruje się w  $0$  i w  $-\frac{3}{4}$ . Dalej  $f''(x) = 6x + 12x^2 = 6x(1 + 2x)$ . Zatem  $f''(-\frac{3}{4}) > 0$ . Mamy  $f''(0) = 0$ . Ale  $f'''(0) > 0$ . W rezultacie w punkcie  $-\frac{3}{4}$  występuje ściśle lokalne minimum, a w punkcie  $0$  przegięcie wykresu.

**Definicja 5.29.** Mówimy, że funkcja  $f(x)$  określona w przedziale  $(a, b)$  jest *wypukła w dół*, jeśli dla dowolnych punktów  $a < x_1, x_2 < b$  oraz liczb  $\alpha, \beta \geq 0$ ,  $\alpha + \beta = 1$  mamy

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) \leq \alpha f(x_1) + \beta f(x_2). \quad (5.15)$$

Podobnie,  $f(x)$  jest *wypukła w górę* jeśli

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) \geq \alpha f(x_1) + \beta f(x_2). \quad (5.16)$$

**Uwaga.** Wypukłość w dół oznacza, że fragment wykresu pomiędzy punktami  $(x_1, f(x_1))$  i  $(x_2, f(x_2))$  leży pod sieczną przechodzącą przez te punkty. Rzeczywiście, jeśli  $u(x)$  jest funkcją liniową oraz  $u(x_1) = f(x_1)$ ,  $u(x_2) = f(x_2)$ , to  $u(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha u(x_1) + \beta u(x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)$ .

**Twierdzenie 5.30.** *Jeśli  $f''(x) > 0$  dla  $a < x < b$ , to funkcja  $f(x)$  jest wypukła w dół. Natomiast jeśli  $f''(x) < 0$  dla  $a < x < b$ , to funkcja  $f(x)$  jest wypukła w górę.*

*Dowód.* Udowodnimy pierwszą część twierdzenia. Zakładamy, że  $x_1 < x_2$  oraz  $\alpha, \beta > 0$ ,  $\alpha + \beta = 1$ . Z twierdzenia Lagrange'a mamy

$$\begin{aligned} f(\alpha x_1 + \beta x_2) - \alpha f(x_1) - \beta f(x_2) &= \alpha[f(\alpha x_1 + \beta x_2) - f(x_1)] - \beta[f(x_2) - f(\alpha x_1 + \beta x_2)] \\ &= \alpha\beta(x_2 - x_1)f'(\xi_1) - \alpha\beta(x_2 - x_1)f'(\xi_2) \\ &= \alpha\beta(x_2 - x_1)[f'(\xi_1) - f'(\xi_2)] = \alpha\beta(x_1 - x_2)(\xi_2 - \xi_1)f''(\eta), \end{aligned}$$

gdzie  $x_1 < \xi_1 < \alpha x_1 + \beta x_2 < \xi_2 < x_2$  oraz  $\xi_1 < \eta < \xi_2$ . Zatem

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) - \alpha f(x_1) - \beta f(x_2) < 0$$

dla  $\alpha, \beta > 0$  i  $\alpha + \beta = 1$ . □

### Uwagi.

1. Twierdzenie odwrotne jest też prawdziwe, ale w tezie otrzymamy słabą nierówność dla  $f''$ . Istotnie założmy, że  $f$  jest wypukła w dół. Dla  $x_1 < x_2$  i  $\alpha, \beta > 0$ , z nierówności (5.15) otrzymujemy

$$\alpha[f(\alpha x_1 + \beta x_2) - f(x_1)] \leq \beta[f(x_2) - f(\alpha x_1 + \beta x_2)].$$

Zatem

$$\frac{f(\alpha x_1 + \beta x_2) - f(x_1)}{\beta(x_2 - x_1)} \leq \frac{f(x_2) - f(\alpha x_1 + \beta x_2)}{\alpha(x_2 - x_1)}.$$

Po przekształceniu dostajemy

$$\frac{f(\alpha x_1 + \beta x_2) - f(x_1)}{(\alpha x_1 + \beta x_2) - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(\alpha x_1 + \beta x_2)}{x_2 - (\alpha x_1 + \beta x_2)}.$$

Gdy  $\alpha \rightarrow 0^+$ , to  $\beta \rightarrow 1^-$  oraz  $\alpha x_1 + \beta x_2 \rightarrow x_2$ . Otrzymujemy więc

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

Podobnie, z  $\beta \rightarrow 0^+$  wynika

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Zatem  $f'(x_1) \leq f'(x_2)$ , czyli  $f'$  jest funkcją rosnącą. Tzn.  $f'' \geq 0$ .

2. Załóżmy, że  $f$  jest ściśle wypukła w dół. Wtedy funkcja  $f'$  jest ściśle rosnąca. Istotnie, gdyby  $f'(x_1) = f'(x_2)$  dla pewnych  $x_1 < x_2$ , to funkcja  $f'$  byłaby stała w przedziale  $[x_1, x_2]$ . To by oznaczało, że  $f$  jest funkcją liniową w tym przedziale.

## 6 Iloczyny nieskończone

Dla liczb  $a_n > -1$  rozważamy ciąg iloczynów

$$P_n = (1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) = \prod_{k=1}^n (1 + a_k).$$

Mówimy, że iloczyn nieskończony

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$$

jest zbieżny, jeśli ciąg  $P_n$  (iloczynów częściowych) jest zbieżny do liczby dodatniej  $P$ . Piszemy wtedy

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = P.$$

W przeciwnym wypadku, tzn. gdy ciąg  $P_n$  nie ma granicy lub jest zbieżny do zera, mówimy, że iloczyn nieskończony jest rozbieżny.

**Przykład.** Rozważmy iloczyn  $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ . Mamy

$$P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} \xrightarrow{n} \frac{1}{2}.$$

Zatem

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}.$$

**Przykład.** Iloczyny częściowe dla  $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$  mają postać

$$P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n} 0.$$

Zatem iloczyn  $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$  jest rozbieżny (do zera).

**Twierdzenie 6.1.** *Jeśli iloczyn  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  jest zbieżny, to  $a_n \xrightarrow{n} 0$ .*

*Dowód.* Niech  $P = \lim_n P_n$ . Wtedy

$$1 + a_n = \frac{P_n}{P_{n-1}} \xrightarrow{n} 1.$$

Stąd  $a_n \xrightarrow{n} 0$ . □

**Definicja 6.2.** *Mówimy, że iloczyn  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  jest zbieżny bezwzględnie, jeśli iloczyn  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$  jest zbieżny.*

**Lemat 6.3.**

$$|\log(1+x)| \leq 2|x| \leq 4 \log(1+|x|), \quad |x| < \frac{1}{2}.$$

*Dowód.* Dla  $0 \leq t < 2$  mamy

$$1+t \leq e^t \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{2^{n-1}} = 1 + \frac{x}{1 - \frac{t}{2}} < 1 + 2t. \quad (6.1)$$

Stąd

$$\log(1+t) < t < \log(1+2t), \quad 0 < t < 2. \quad (6.2)$$

Podstawiając  $t = \frac{|x|}{2}$  i  $t = x$  otrzymamy drugą nierówność oraz pierwszą nierówność dla nieujemnych wartości  $x$ . Pozostaje udowodnić pierwszą nierówność dla  $x = -y$ ,  $0 \leq y < \frac{1}{2}$ . Otrzymujemy

$$|\log(1+x)| = \log \frac{1}{1-y} = \log \left(1 + \frac{y}{1-y}\right) \leq \log(1+2y) \leq 2y = 2|x|,$$

gdzie ostatnia nierówność wynika z (6.2) poprzez podstawienie  $t = 2y$ . □

**Twierdzenie 6.4.** *Iloczyn bezwzględnie zbieżny jest zbieżny.*

*Dowód.* Oznaczmy  $\tilde{P}_n = \prod_{k=1}^n (1 + |a_k|)$ . Z Twierdzenia 6.1 wynika, że  $|a_n| \xrightarrow{n} 0$ . Zatem  $|a_k| \leq \frac{1}{2}$  dla  $k \geq k_0$ . Wtedy dla  $n > m \geq k_0$  mamy

$$\begin{aligned} |\log P_n - \log P_m| &= |\log[(1 + a_{m+1})(1 + a_{m+2}) \dots (1 + a_n)]| \\ &\leq |\log(1 + a_{m+1})| + |\log(1 + a_{m+2})| + \dots + |\log(1 + a_n)| \\ &\leq 4[|\log(1 + |a_{m+1}|)| + |\log(1 + |a_{m+2}|)| + \dots + |\log(1 + |a_n|)|] \\ &= 4[\log \tilde{P}_n - \log \tilde{P}_m], \end{aligned}$$

gdzie druga nierówność wynika z Lematu 6.3. Z założenia ciąg  $\log \tilde{P}_n$  jest zbieżny, więc spełnia warunek Cauchy'ego. Zatem ciąg  $\log P_n$  też spełnia warunek Cauchy'ego, czyli jest zbieżny. Oznaczmy  $g = \lim \log P_n$ . Wtedy

$$P_n = e^{\log P_n} \xrightarrow{n} e^g > 0.$$

□

**Twierdzenie 6.5.** *Dla  $a_n \geq 0$  iloczyn  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .*

*Dowód.* Załóżmy, że iloczyn  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  jest zbieżny. Wtedy

$$1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq (1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) \leq \prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k).$$

Stąd wynika zbieżność szeregu.

Założmy teraz, że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny. Wtedy dla pewnego wskaźnika  $n_0$  mamy

$$\sum_{k=n_0+1}^{\infty} a_k < \frac{1}{2}.$$

Z nierówności Bernoulli'ego (zadanie 3, lista 1) otrzymujemy

$$(1 - a_{n_0+1})(1 - a_{n_0+2}) \dots (1 - a_n) \geq 1 - a_{n_0+1} - a_{n_0+2} - \dots - a_n > \frac{1}{2}.$$



Zatem dla  $n > n_0$  mamy

$$Q_n := \prod_{k=1}^n (1 - a_k) = \prod_{k=1}^{n_0} (1 - a_k) \prod_{k=n_0+1}^n (1 - a_k) \geq \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{n_0} (1 - a_k).$$

Ciąg  $Q_n$  jest malejący i ograniczony od dołu przez liczbę dodatnią. Zatem iloczyn  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 - a_n)$  jest zbieżny. Zauważmy, że  $P_n Q_n \leq 1$ , czyli  $P_n \leq Q_n^{-1}$ . Rosnący ciąg  $P_n$  jest więc ograniczony od góry, skąd wynika jego zbieżność.  $\square$

## 6.1 Liczby pierwsze

Wiadomo, że zbiór liczb pierwszych jest nieskończony. Pokażemy, że liczb pierwszych jest na tyle dużo, że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ , gdzie  $p_n$  oznacza  $n$ -tą liczbę pierwszą.

Rozważmy iloczyn  $\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)^{-1}$ . Korzystając ze wzoru na sumę szeregu geometrycznego otrzymamy

$$\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)^{-1} = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2} + \dots\right).$$

Po wymnożeniu sum dostaniemy sumę odwrotności wszystkich liczb naturalnych mających w rozkładzie na czynniki pierwsze liczby  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . W szczególności w sumie pojawią się odwrotności wszystkich liczb od 1 do  $n$ , bo  $p_n > n$ . To oznacza, że

$$\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)^{-1} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Stąd iloczyn jest rozbieżny do nieskończoności. To oznacza, że iloczyn  $\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$  jest rozbieżny do zera. Z Twierdzenia 6.4 zastosowanego do  $a_n = -\frac{1}{p_n}$  otrzy-

mujemy rozbieżność szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ .

Dla liczby  $\alpha > 1$  rozważmy iloczyn  $\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^\alpha}\right)^{-1}$ . Otrzymujemy

$$\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^\alpha}\right)^{-1} = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{p_k^\alpha} + \frac{1}{p_k^{2\alpha}} + \dots\right).$$

Po wymnożeniu sum dostaniemy sumę potęg rzędu  $\alpha$  odwrotności wszystkich liczb naturalnych mających w rozkładzie na czynniki pierwsze liczby  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . W szczególności

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \geq \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^\alpha}\right)^{-1} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}.$$

To oznacza, że iloczyn  $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^\alpha}\right)^{-1}$  jest zbieżny. Z twierdzenia o trzech ciągach otrzymujemy tożsamość Eulera

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^\alpha}\right)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \alpha > 1.$$

## 7 Ułamki łańcuchowe

Wykonamy dzielenie z resztą liczb 75 i 23.

$$\frac{75}{23} = 3 + \frac{6}{23} = 3 + \frac{1}{3 + \frac{5}{6}} = 3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{5}}}.$$

Będziemy stosować zapis

$$\frac{75}{23} = 3 + \frac{1|}{|3} + \frac{1|}{|1} + \frac{1|}{|5}.$$

Ogólnie, niech  $n_0$  i  $n_1$  będą liczbami naturalnymi bez wspólnych dzielników. Wykonujemy dzielenie z resztą.

$$n_0 = q_1 n_1 + n_2, \quad \text{gdzie } 0 < n_2 < n_1.$$

Wtedy

$$\frac{n_0}{n_1} = q_1 + \frac{n_2}{n_1} = q_1 + \frac{1}{\frac{n_1}{n_2}}.$$

Tę samą czynność wykonujemy dla liczb  $n_1$  i  $n_2$ .

$$\frac{n_0}{n_1} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{n_2}{n_3}}, \quad 0 < n_3 < n_2.$$

Powtarzamy tę czynność dopóki  $n_k = 1$ . Wtedy  $q_k = \frac{n_{k-1}}{n_k}$  oraz

$$\frac{n_0}{n_1} = q_1 + \frac{1}{|q_2} + \frac{1}{|q_3} + \dots + \frac{1}{|q_k}. \quad (7.1)$$

Wyrażenie postaci (7.1) nazywamy skończonym **ułamkiem łańcuchowym**. Z rozumowania wynika, że każda liczba wymierna ma przedstawienie w postaci skończonego ułamka łańcuchowego.

**Przykład.**

$$\begin{aligned} 1 + \sqrt{2} &= 2 + (\sqrt{2} - 1) = 2 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}}} \\ &= 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}}}}. \end{aligned}$$

To oznacza, że w pewnym sensie liczba  $1 + \sqrt{2}$  ma nieskończone przedstawienie w postaci

$$1 + \sqrt{2} = 2 + \frac{1}{|2} + \frac{1}{|2} + \frac{1}{|2} + \dots$$

Ogólnie rozważmy dodatnią liczbę niewymierną  $x_0$ . Wtedy

$$x_0 = a_0 + r_0, \quad \text{gdzie } a_0 = [x_0], \quad r_0 = \{x_0\}.$$

Wtedy  $0 < r_0 < 1$ , czyli  $x_1 := \frac{1}{r_0} > 1$  oraz

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{x_1}.$$

Podobne czynności wykonujemy dla liczby  $x_1$ . Wtedy

$$x_1 = a_1 + \frac{1}{x_2}, \quad a_1 = [x_1], \quad x_2 > 1.$$

Otrzymujemy

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{x_2}}.$$

Postępując tak dalej otrzymamy

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \frac{1}{|a_2|} + \dots + \frac{1}{|a_{n-1}|} + \frac{1}{|x_n|}, \quad (7.2)$$

gdzie

$$x_{k-1} = a_{k-1} + \frac{1}{x_k}, \quad x_k > 1.$$

W pewnym sensie otrzymujemy równość

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \frac{1}{|a_2|} + \dots + \frac{1}{|a_n|} + \dots \quad (7.3)$$

Naszym celem jest nadanie sensu wyrażeniu po prawej stronie wzoru, gdzie  $a_0$  jest nieujemną liczbą całkowitą, a liczby  $a_n$  są naturalne dla  $n \geq 1$ . Rozważmy wyrażenia

$$R_k = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \frac{1}{|a_2|} + \dots + \frac{1}{|a_{k-1}|} + \frac{1}{|a_k|}.$$

Liczby  $R_k$  są wymierne. Nazywamy je reduktami ułamka łańcuchowego (7.3). Pokażemy, że  $R_k \xrightarrow{k} x_0$ , co pozwoli uzasadnić wzór (7.3).

Przechodzimy do analizy wielkości  $R_k$ . Wyrażenia  $R_k$  są funkcjami wymiernymi zależnymi od liczb  $a_0, a_1, \dots, a_k$ .  $R_k$  są dobrze określone również, gdy  $a_1, a_2, \dots, a_k$  są dodatnimi liczbami rzeczywistymi. natomiast  $a_0$  jest nieujemną liczbą rzeczywistą.

Określmy rekurencyjnie dwa ciągi liczb  $P_k$  i  $Q_k$  zależnych od ciągu  $\{a_k\}_{k=0}^{\infty}$  wzorami

$$\begin{aligned} P_0 &= a_0, & Q_0 &= 1, \\ P_1 &= a_0 a_1 + 1, & Q_1 &= a_1, \\ P_k &= a_k P_{k-1} + P_{k-2}, & Q_k &= a_k Q_{k-1} + Q_{k-2}. \end{aligned}$$

**Lemat 7.1.**  $R_k = \frac{P_k}{Q_k}$ .

*Dowód.* Wzór jest spełniony dla  $k = 0$  i dla  $k = 1$ , bo

$$R_0 = \frac{a_0}{1}, \quad R_1 = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}.$$

Wzór jest prawdziwy również dla  $k = 2$ :

$$\begin{aligned} \frac{P_2}{Q_2} &= \frac{a_2 P_1 + P_0}{a_2 Q_1 + Q_0} = \frac{(a_0 a_1 + 1) a_2 + a_0}{a_1 a_2 + 1} \\ &= a_0 + \frac{a_2}{a_1 a_2 + 1} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}} = R_2. \end{aligned}$$

Założmy, że wzór jest spełniony dla  $2 \leq k \leq n$  i dowolnego wyboru liczb  $a_k$ . Wtedy

$$R_n = \frac{P_n}{Q_n} = \frac{a_n P_{n-1} + P_{n-2}}{a_n Q_{n-1} + Q_{n-2}}.$$

Przy zamianie liczby  $a_n$  na  $a_n + \frac{1}{a_{n+1}}$  otrzymamy nowy ciąg reduktów  $\tilde{R}_k$  przy czym  $\tilde{R}_k = R_k$  dla  $k \leq n-1$  oraz  $\tilde{R}_n = R_{n+1}$ . Z założenia indukcyjnego otrzymujemy wtedy

$$\begin{aligned} R_{n+1} = \tilde{R}_n &= \frac{\tilde{P}_n}{\tilde{Q}_n} = \frac{\left(a_n + \frac{1}{a_{n+1}}\right) P_{n-1} + P_{n-2}}{\left(a_n + \frac{1}{a_{n+1}}\right) Q_{n-1} + Q_{n-2}} \\ &= \frac{[a_n(P_{n-1} + P_{n-2})a_{n+1} + P_{n-1}]}{[a_n(Q_{n-1} + Q_{n-2})a_{n+1} + Q_{n-1}]} = \frac{a_{n+1}P_n + P_{n-1}}{a_{n+1}Q_n + Q_{n-1}} = \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}}. \end{aligned}$$

□

**Lemat 7.2.**

$$\Delta_k := P_{k-1}Q_k - P_kQ_{k-1} = (-1)^k, \quad k \geq 1.$$

*Dowód.* Mamy

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} P_0 & P_1 \\ Q_0 & Q_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 & a_0a_1 + 1 \\ 1 & a_1 \end{vmatrix} = -1.$$

Dalej dla  $k \geq 2$

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} P_{k-1} & a_kP_{k-1} + P_{k-2} \\ Q_{k-1} & a_kQ_{k-1} + Q_{k-2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P_{k-1} & P_{k-2} \\ Q_{k-1} & Q_{k-2} \end{vmatrix} = -\Delta_{k-1}.$$

Stąd  $\Delta_k = (-1)^{k-1}\Delta_1 = (-1)^k$ . □

**Uwaga 7.3.** Z określenia ciągów  $P_k$  i  $Q_k$ ,e dla naturalnych wartości liczb  $a_k$  liczby  $P_k$  i  $Q_k$  są naturalne. Z lematu 7.2 wynika, że liczby  $P_k$  i  $Q_k$  nie mają wspólnego dzielnika, czyli ułamek  $R_k = \frac{P_k}{Q_k}$  jest nieskracalny.

**Twierdzenie 7.4.** Dla dodatniej liczby niewymiernej  $x_0$  ciąg reduktów  $R_n$  jest zbieżny do  $x_0$ . Co więcej ciąg  $R_{2n}$  jest rosnący, ciąg  $R_{2n+1}$  jest malejący oraz

$$|R_{n+1} - x_0| < |R_n - x_0|.$$

*Dowód.* Z (7.2) otrzymujemy

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \dots + \frac{1}{|a_n|} + \frac{1}{|x_{n+1}|}.$$

Niech  $\tilde{R}_{n+1}$  oznacza redukt rzędu  $n+1$ , gdzie liczba  $a_{n+1}$  została zastąpiona liczbą  $x_{n+1}$ . Wtedy

$$x_0 = \frac{\tilde{P}_{n+1}}{\tilde{Q}_{n+1}} = \frac{x_{n+1}P_n + P_{n-1}}{x_{n+1}Q_n + Q_{n-1}}.$$

Zatem

$$\begin{aligned} x_0 - R_n &= \frac{x_{n+1}P_n + P_{n-1}}{x_{n+1}Q_n + Q_{n-1}} - \frac{P_n}{Q_n} \\ &= \frac{\Delta_n}{(x_{n+1}Q_n + Q_{n-1})Q_n} = \frac{(-1)^n}{(x_{n+1}Q_n + Q_{n-1})Q_n} \end{aligned} \quad (7.4)$$

Ponieważ  $a_{n+1} = [x_{n+1}]$ , to  $x_{n+1} < a_{n+1} + 1$ . Otrzymujemy więc

$$\begin{aligned} |R_n - x_0| &= \frac{1}{(x_{n+1}Q_n + Q_{n-1})Q_n} > \frac{1}{(x_{n+1}Q_n + Q_{n-1})Q_n} \\ &> \frac{1}{[(a_{n+1} + 1)Q_n + Q_{n-1}]Q_n} = \frac{1}{(Q_n + Q_{n-1})Q_n}. \end{aligned} \quad (7.5)$$

Z pierwszej równości w (7.4) zastosowanej do  $n + 1$  i z faktu, że  $x_{n+2} > 1$  dostajemy

$$|R_{n+1} - x_0| = \frac{1}{(x_{n+2}Q_{n+1} + Q_n)Q_{n+1}} \leq \frac{1}{(Q_n + Q_{n-1})Q_n}. \quad (7.6)$$

Zestawiając (7.5) i (7.6) otrzymujemy

$$|R_{n+1} - x_0| < |R_n - x_0| < \frac{1}{(Q_n + Q_{n-1})Q_n}. \quad (7.7)$$

Z określenia ciągu  $Q_n$  wynika, że  $Q_n \geq Q_{n-1} + Q_{n-2} \geq Q_{n-1} + 1$  dla  $n \geq 2$ . Zatem  $Q_n \geq n$ . To oznacza, że  $R_n \xrightarrow{n} x_0$ . Z (7.4) oraz (7.7) wynika, że ciąg  $R_{2n}$  jest rosnący a ciąg  $R_{2n+1}$  malejący.  $\square$

**Uwaga 7.5.** Z Twierdzenia 7.4 wynika, że liczba  $x_0$  leży pomiędzy  $R_n$  i  $R_{n-1}$  zatem

$$|x - R_{n-1}| < |R_{n-1} - R_n| = \frac{1}{Q_{n-1}Q_n}. \quad (7.8)$$

**Przykład.** Liczba  $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$  nazywana jest **złotą**. Pojawia się przy złotym podziale odcinka oraz występuje we wzorze na wyrazy ciągu Fibonacci'ego. Mamy

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 1 + \frac{1}{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Zatem

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1}{|1|} + \frac{1}{|1|} + \frac{1}{|1|} + \dots$$

Przeanalizujemy zagadnienie odwrotne. Niech  $a_0$  będzie nieujemną liczbą całkowitą i  $a_n$ ,  $n \geq 1$  ciągiem liczb naturalnych. Używając metod użytych w

dowodzie ostatniego twierdzenia możemy wywnioskować, że liczby  $R_k$  określone wzorem

$$R_k = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \frac{1}{|a_2|} + \dots + \frac{1}{|a_{k-1}|} + \frac{1}{|a_k|}$$

spełniają

$$|R_m - R_n| < \frac{1}{n(n+1)}, \quad m > n.$$

To oznacza, że ciąg  $R_n$  jest zbieżny, bo spełnia warunek Cauchy'ego. Oznaczmy

$$x_0 = \lim_k R_k.$$

Chcemy pokazać, że liczby  $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$  powstają z rozwinięcia liczby  $x_0$  w ułamek łańcuchowy.

Z argumentacji użytej wyżej wynika, że dla dowolnej liczby  $n$  ciągi

$$R_k^{(n)} = a_n + \frac{1}{|a_{n+1}|} + \frac{1}{|a_{n+2}|} + \dots + \frac{1}{|a_{n+k-1}|} + \frac{1}{|a_{n+k}|}$$

są zbieżne. Oznaczmy

$$x_n = \lim_k R_k^{(n)}.$$

Ze związku

$$R_{k+1}^{(n)} = a_n + \frac{1}{R_k^{(n+1)}}$$

wynika

$$x_n = a_n + \frac{1}{x_{n+1}}, \quad n \geq 0. \quad (7.9)$$

Stąd  $x_{n+1} > 0$ , czyli  $x_n > a_n \geq 1$  dla  $n \geq 1$ . Z (7.8) otrzymujemy zatem  $a_n = [x_n]$ , czyli liczby  $a_n$  pochodzą z rozwinięcia liczby  $x_0$  w ułamek łańcuchowy.

Z przeprowadzonego rozumowania wynika, że rozwinięcie liczby dodatniej  $x_0$  w ułamek łańcuchowy jest jednoznaczne. W szczególności nieskończone ułamki łańcuchowe reprezentują liczby niewymierne.

**Twierdzenie 7.6** (prawo najlepszego przybliżenia). *Załóżmy, że dla dodatniej liczby niewymiernej  $x_0$  i liczb naturalnych  $r$  i  $s$  mamy*

$$\left| x_0 - \frac{r}{s} \right| < |x_0 - R_n|.$$

*Wtedy  $s > Q_n$ . Czyli spośród liczb wymiernych o mianownikach nie przekraczających  $Q_n$  redukt  $R_n = \frac{P_n}{Q_n}$  stanowi najlepsze przybliżenie liczby  $x_0$ .*



*Dowód.* Z Twierdzenia 7.4 mamy

$$\left| x_0 - \frac{r}{s} \right| < |x_0 - R_n| < |x_0 - R_{n-1}|.$$

Z pierwszej części tezy Twierdzenia 7.4 wynika zatem, że liczba  $\frac{r}{s}$  leży pomiędzy liczbami  $R_{n-1}$  i  $R_n$ . Otrzymujemy więc

$$0 < \left| \frac{r}{s} - R_{n-1} \right| < |R_n - R_{n-1}| = \frac{|\Delta_n|}{Q_{n-1}Q_n} = \frac{1}{Q_{n-1}Q_n}.$$

Tzn.

$$0 < \frac{|rQ_{n-1} - sP_{n-1}|}{Q_{n-1}s} < \frac{1}{Q_{n-1}Q_n}.$$

Stąd wynika, że  $s > Q_n$ . □

## 7.1 Okresowe ułamki łańcuchowe

Przypuśćmy, że rozwinięcie w ułamek łańcuchowy liczby  $x$

$$x = b_0 + \frac{1}{|b_1|} + \frac{1}{|b_2|} + \dots + \frac{1}{|b_n|} + \dots$$

jest okresowe, tzn.

$$b_{n+k} = b_n, \quad \text{dla } n \geq n_0.$$

Rozważmy część ułamka

$$y = b_{n_0} + \frac{1}{|b_{n_0+1}|} + \dots + \frac{1}{|b_{n_0+k-1}|} + \dots + \frac{1}{|b_{n_0+k}|} + \dots$$

Wprowadźmy oznaczenia  $a_n = b_{n_0+n}$ . Wtedy

$$y = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \dots + \frac{1}{|a_{k-1}|} + \dots + \frac{1}{|a_k|} + \dots$$

Z okresowości otrzymujemy więc

$$y = a_0 + \frac{1}{|a_1|} + \dots + \frac{1}{|a_{k-1}|} + \dots + \frac{1}{|y|}.$$

Niech  $\tilde{R}_k$  oznacza  $k$ -ty redukt, gdzie liczba  $a_k$  została zastąpiona przez  $y$ .  
Wtedy

$$y = \tilde{R}_k = \frac{\tilde{P}_k}{\tilde{Q}_k} = \frac{yP_{k-1} + P_{k-2}}{yQ_{k-1} + Q_{k-2}}.$$

Liczba  $y$  jest dodatnim pierwiastkiem trójmianu kwadratowego

$$Q_{k-1}y^2 + (Q_{k-2} - P_{k-1})y - P_{k-1} = 0,$$

z naturalnymi współczynnikami. Wyróżnik trójmianu jest równy

$$\begin{aligned} w &= (Q_{k-2} - P_{k-1})^2 + 4Q_{k-1}P_{k-2} \\ &= (Q_{k-2} + P_{k-1})^2 + 4\Delta_{k-1} = (Q_{k-2} + P_{k-1})^2 - 4(-1)^k. \end{aligned}$$

Zatem

$$y = \frac{P_{k-1} - Q_{k-2}}{2Q_{k-1}} + \frac{1}{2Q_{k-1}}\sqrt{w}.$$

Liczby  $x$  i  $y$  są związane wzorem

$$x = b_0 + \frac{1}{|b_1|} + \frac{1}{|b_2|} + \dots + \frac{1}{|b_{n_0-1}|} + \frac{1}{|y|}.$$

W związku z tym

$$x = u + v\sqrt{w},$$

dla pewnych wymiernych liczb  $u$  i  $v$ .

Implikacja odwrotna też jest prawdziwa. Poniższy dowód pochodzi od Lagrange'a. Załóżmy, że liczba dodatnia  $x$  jest pierwiastkiem trójmianu kwadratowego, tzn.

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

dla pewnych liczb całkowitych  $a$ ,  $b$  i  $c$ , przy czym  $a$ ,  $c \neq 0$ . Rozważmy macierz

$$M = \begin{bmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{bmatrix}$$

i wektor  $u = (x, 1)^t$ . Wtedy

$$(Mu, u) = ax^2 + bx + c = 0.$$

Wyznacznik macierzy  $M$  jest równy  $ac - \frac{1}{4}b^2$ . Niech  $a_k$  oznaczają liczby z rozwinięcia  $x_0 := x$  w ułamek łańcuchowy. Ze wzoru (7.2) otrzymujemy

$$x = \frac{x_n P_{n-1} + P_{n-2}}{x_n Q_{n-1} + Q_{n-2}}.$$

Podstawiamy to wyrażenie do trójmianu kwadratowego i po przekształceniu otrzymujemy

$$a(x_n P_{n-1} + P_{n-2})^2 + b(x_n P_{n-1} + P_{n-2})(x_n Q_{n-1} + Q_{n-2}) + c(x_n Q_{n-1} + Q_{n-2})^2 = 0. \quad (7.10)$$

Rozważmy macierz

$$U = \begin{bmatrix} P_{n-1} & P_{n-2} \\ Q_{n-1} & Q_{n-2} \end{bmatrix}$$

Dla wektora  $v = (x_n, 1)^t$  równanie (7.10) ma postać

$$(MUv, Uv) = 0.$$

Zatem

$$(U^t MUv, v) = 0.$$

To oznacza, że  $x_n$  jest pierwiastkiem trójmianu kwadratowego

$$A_n x_n^2 + B_n x_n + C_n = 0,$$

gdzie

$$\begin{aligned} A_n &= aP_{n-1}^2 + bP_{n-1}Q_{n-1} + cQ_{n-1}^2, \\ B_n &= 2aP_{n-1}Q_{n-1} + b[P_{n-1}Q_{n-2} + P_{n-2}Q_{n-1}] + 2cQ_{n-1}Q_{n-2}, \\ C_n &= aP_{n-2}^2 + bP_{n-1}Q_{n-2} + cQ_{n-2}^2. \end{aligned}$$

Liczby  $A_n$ ,  $B_n$  i  $C_n$  są całkowite oraz  $A_n = C_{n+1}$ . Dalej

$$A_n C_n - \frac{1}{4}B_n^2 = \det(U^t MU) = \det M = ac - \frac{1}{4}b^2.$$

Z (7.8) wynika, że

$$|xQ_{n-1} - P_{n-1}| < \frac{1}{Q_n} < \frac{1}{Q_{n-1}}.$$

Zatem

$$P_{n-1} = xQ_{n-1} + \frac{\delta}{Q_{n-1}},$$

dla pewnej liczby  $\delta$  spełniającej  $|\delta| < 1$ . Zatem

$$\begin{aligned} A_n &= a \left( xQ_{n-1} + \frac{\delta}{Q_{n-1}} \right)^2 + b \left( xQ_{n-1} + \frac{\delta}{Q_{n-1}} \right) Q_{n-1} + cQ_{n-1}^2 \\ &= (ax^2 + bx + c)Q_{n-1}^2 + (2ax + b)\delta + \frac{a\delta^2}{Q_{n-1}^2} = (2ax + b)\delta + \frac{a\delta^2}{Q_{n-1}^2}. \end{aligned}$$

Dalej

$$|A_n| = \left| (2ax + b)\delta + \frac{\delta^2}{Q_{n-1}^2} \right| \leq |2ax + b| + |\delta|.$$

To oznacza, że jest tylko skończenie wiele możliwości na wartość  $A_n$ . Ponadto

$$|C_n| = |A_{n-1}|, \quad |B_n| = \sqrt{b^2 - 4ac + 4A_n C_n},$$

więc jest tylko skończenie wiele trójek  $(A_n, B_n, C_n)$ . Zatem dla pewnej liczby  $k$  mamy  $x_n = x_{n+k}$ , czyli ułamek łańcuchowy liczby  $x$  jest okresowy.

## 8 Całka Riemanna

**Definicja 8.1.** Podziałem  $\mathcal{P}$  przedziału  $[a, b]$  nazywamy skończoną rodzinę punktów  $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ . Przyjmujemy oznaczenie  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .

Dla ograniczonej funkcji  $f(x)$  określonej w  $[a, b]$  określamy liczby  $m_i$  oraz  $M_i$  wzorami

$$m_i = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x).$$

Definiujemy sumy dolne i górne wzorami

$$L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad U(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

**Uwaga.** Jeśli  $f \geq 0$ , to liczba  $L(\mathcal{P}, f)$  przybliża od dołu pole obszaru pod wykresem funkcji, natomiast liczba  $U(\mathcal{P}, f)$  przybliża to pole od góry.

Przypuśćmy, że  $m \leq f(x) \leq M$  dla  $a \leq x \leq b$ . Wtedy

$$L(\mathcal{P}, f) \geq \sum_{i=1}^n m \Delta x_i = m(b-a),$$

$$U(\mathcal{P}, f) \leq \sum_{i=1}^n M \Delta x_i = M(b-a).$$

Określamy całki dolną i górną wzorami

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\mathcal{P}} L(\mathcal{P}, f), \quad \int_a^b f(x) dx = \inf_{\mathcal{P}} U(\mathcal{P}, f).$$

**Definicja 8.2.** Mówimy, że funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w sensie Riemanna na przedziale  $[a, b]$ , jeśli całka dolna jest równa całce górnej. Wtedy wspólną wartość oznaczamy symbolem  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Uwaga.** Pokażemy wkrótce, że funkcje ciągłe są całkowalne. Istnieją jednak funkcje niecałkowalne.

### Przykłady

(a)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Dla przedziału  $[0, 1]$  mamy  $L(\mathcal{P}, f) = 0$  oraz  $U(\mathcal{P}, f) = 1$ . Zatem

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

(b)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

Dla  $\mathcal{P}_n = \{0, 1, 1 + \frac{1}{n}, 2\}$  mamy

$$L(\mathcal{P}_n, f) = 1 + 1 \cdot \frac{1}{n} + 2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3 - \frac{1}{n},$$

$$U(\mathcal{P}_n, f) = 1 + 2 \cdot \frac{1}{n} + 2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3.$$

Zatem

$$\int_0^2 f(x) dx \geq 3, \quad \int_0^{\bar{2}} f(x) dx \leq 3.$$

Pokażemy wkrótce, że

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^{\bar{b}} f(x) dx,$$

zatem

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^{\bar{2}} f(x) dx = 3.$$

(c)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Rozważamy przedział  $[0, 1]$ . Mamy  $L(\mathcal{P}, f) = 0$ . Ustalmy liczbę naturalną  $N \geq 2$ . Określimy specjalny podział  $\mathcal{P}$ . Każdy ułamek nieskracalny postaci  $\frac{p}{q}$ , dla  $q < N$  otaczamy przedziałem o promieniu  $\frac{1}{2N^3}$ . Takich ułamków jest mniej niż  $N^2$ . Przedziałami podziału są wtedy  $\left[\frac{p}{q} - \frac{1}{2N^3}, \frac{p}{q} + \frac{1}{2N^3}\right]$ , gdzie  $q < N$  oraz przedziały pomiędzy nimi. Przedziały postaci  $\left[\frac{p}{q} - \frac{1}{2N^3}, \frac{p}{q} + \frac{1}{2N^3}\right]$  są rozłączne. Rzeczywiście, rozważmy dwie różne liczby  $\frac{p}{q}$  i  $\frac{p'}{q'}$ , dla  $q, q' < N$ . Wtedy

$$\left|\frac{p}{q} - \frac{p'}{q'}\right| = \frac{|pq' - p'q|}{qq'} \geq \frac{1}{qq'} \geq \frac{1}{N^2} > \frac{1}{N^3}.$$

Gdyby przedziały odpowiadające  $\frac{p}{q}$  i  $\frac{p'}{q'}$  zachodziły na siebie, to

$$\left|\frac{p}{q} - \frac{p'}{q'}\right| \leq 2 \cdot \frac{1}{2N^3} = \frac{1}{N^3}.$$

Niech  $A$  składa się z numerów odpowiadającym przedziałom  $\left[\frac{p}{q} - \frac{1}{2N^3}, \frac{p}{q} + \frac{1}{2N^3}\right]$ .

Wtedy

$$\begin{aligned} U(\mathcal{P}, f) &= \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i \in A} M_i \Delta x_i + \sum_{i \notin A} M_i \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i \in A} \Delta x_i + \sum_{i \notin A} \frac{1}{N} \Delta x_i \leq N^2 \cdot \frac{1}{N^3} + \frac{1}{N} = \frac{2}{N}. \end{aligned}$$

Ponieważ  $N$  jest dowolną liczbą naturalną, to  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ .

**Definicja 8.3.** Podział  $\mathcal{P}'$  przedziału  $\mathcal{P}$  nazywamy rozdrobnieniem podziału  $\mathcal{P}$ , jeśli  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$ . Dla podziałów  $\mathcal{P}_1$  i  $\mathcal{P}_2$  podział  $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$  nazywamy wspólnym rozdrobnieniem  $\mathcal{P}_1$  i  $\mathcal{P}_2$ .

**Twierdzenie 8.4.** Jeśli  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$ , to  $L(\mathcal{P}, f) \leq L(\mathcal{P}', f)$  oraz  $U(\mathcal{P}, f) \geq U(\mathcal{P}', f)$ , tzn. przy rozdrobnieniu sumy dolne się zwiększają a sumy górne zmniejszają.

*Dowód.* Wystarczy rozważyć przypadek  $\mathcal{P}' = \mathcal{P} \cup \{x'\}$ . Niech

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \{x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_n\}, \\ \mathcal{P}' &= \{x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x', x_i, \dots, x_n\}. \end{aligned}$$

Oznaczmy

$$\omega_1 = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x'} f(x), \quad \omega_2 = \inf_{x' \leq x \leq x_i} f(x).$$

Wtedy  $\omega_1, \omega_2 \geq m_i$  zatem

$$\begin{aligned} L(\mathcal{P}', f) - L(\mathcal{P}, f) &= \omega_1(x' - x_{i-1}) + \omega_2(x_i - x') - m_i \Delta x_i \\ &\geq m_i(x' - x_{i-1}) + m_i(x_i - x') - m_i \Delta x_i = 0. \end{aligned}$$

Podobnie pokazujemy, że  $U(\mathcal{P}', f) \leq U(\mathcal{P}, f)$ .  $\square$

**Wniosek 8.5.** (i) Dla dwu podziałów  $\mathcal{P}_1$  i  $\mathcal{P}_2$  mamy  $L(\mathcal{P}_1, f) \leq U(\mathcal{P}_2, f)$ .

$$(ii) \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^{\bar{b}} f(x) dx.$$

*Dowód.* Mamy

$$L(\mathcal{P}_1, f) \leq L(\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2, f) \leq U(\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2, f) \leq U(\mathcal{P}_2, f).$$

Biorąc kres górny względem  $\mathcal{P}_1$  otrzymamy

$$\int_a^b f(x) dx \leq U(\mathcal{P}_2, f).$$

Teraz bierzemy kres dolny względem  $\mathcal{P}_2$  i otrzymujemy część (ii) wniosku.  $\square$

**Twierdzenie 8.6.** *Ograniczona funkcja  $f(x)$  na przedziale  $[a, b]$  jest całkowna wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć podział  $\mathcal{P}$ , dla którego*

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) < \varepsilon. \quad (8.1)$$

*Dowód.* Udowodnimy tylko implikację ( $\Leftarrow$ ). Załóżmy, że dla  $\varepsilon > 0$  istnieje  $\mathcal{P}$  spełniający (8.1). Wtedy

$$L(\mathcal{P}, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^{\bar{b}} f(x) dx \leq U(\mathcal{P}, f) < L(\mathcal{P}, f) + \varepsilon.$$

Czyli

$$0 \leq \int_a^{\bar{b}} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx < \varepsilon.$$

$\square$

**Wniosek 8.7.** *Każda funkcja ciągła na przedziale  $[a, b]$  jest całkowna. Ponadto dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć liczbę  $\delta > 0$  taką, że dla każdego podziału  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , jeśli*

$$d(\mathcal{P}) := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i < \delta,$$

to dla dowolnego wyboru punktów pośrednich  $x_{i-1} \leq t_i \leq x_i$  mamy

$$\left| \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$



*Dowód.* Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Z jednostajnej ciągłości można znaleźć liczbę  $\delta > 0$  taką, że jeśli  $|x - x'| < \delta$ , to  $|f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . Niech  $\mathcal{P}$  będzie podziałem spełniającym  $d(\mathcal{P}) < \delta$ . Wtedy

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

Stąd mamy całkowalność funkcji  $f$ . Ponadto

$$L(\mathcal{P}, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(\mathcal{P}, f),$$

oraz

$$L(\mathcal{P}, f) \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i \leq U(\mathcal{P}, f),$$

bo  $m_i \leq f(t_i) \leq M_i$ . Z nierówności (8.1) liczby  $\sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$  oraz  $\int_a^b f(x) dx$  leżą w przedziale o długości mniejszej niż  $\varepsilon$ .  $\square$

Liczbę  $d(\mathcal{P})$  nazywamy średnicą podziału  $\mathcal{P}$ . Wyrażenie

$$S(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

nosi nazwę sumy całkowej. Mamy następujące typy sum całkowych:

- (a)  $t_i = x_{i-1}$  - lewy koniec,
- (b)  $t_i = x_i$  - prawy koniec,
- (c)  $t_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$  - środek przedziału,
- (d) indywidualnie dobierane punkty  $t_i$ .

**Wniosek 8.8.** Niech  $f$  będzie funkcją ciągłą na przedziale  $[a, b]$ . Rozważmy ciąg podziałów  $\mathcal{P}_n$  takich, że  $d(\mathcal{P}_n) \xrightarrow{n} 0$  (np.  $\mathcal{P}_n$  jest podziałem na  $n$  równych części). Wtedy

$$S(\mathcal{P}_n, f) \xrightarrow{n} \int_a^b f(x) dx.$$

*Dowód.* Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Z poprzedniego wniosku istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że

$$\left| S(\mathcal{P}, f) - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon,$$

dla  $d(\mathcal{P}) < \delta$ . Z założenia istnieje próg  $N$  taki, że jeśli  $n > N$ , to  $d(\mathcal{P}_n) < \delta$ . Wtedy dla  $n > N$  mamy

$$\left| S(\mathcal{P}_n, f) - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

□

**Uwaga.** Wkrótce udowodnimy, że  $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ . Chcemy obliczyć granicę wyrażenia  $\frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$ . Mamy

$$\frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left( \frac{k}{n} \right)^2 \xrightarrow{n} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

bo wyrażenie w środku jest sumą całkową typu prawy koniec dla funkcji  $f(x) = x^2$  i dla podziału przedziału  $[0, 1]$  na  $n$  równych części.

**Przykład.**

$$f(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x} & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Pokażemy, że funkcja  $f$  jest całkowalna. Rozważymy podział

$$\mathcal{P} = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}, \frac{1}{n} + \frac{2}{n^3}, \dots, \frac{1}{n} + \frac{n^3 - n^2}{n^3} \right\}.$$

Niech  $x, y \geq \frac{1}{n}$  oraz  $|x - y| \leq \frac{1}{n^3}$ . Wtedy

$$\left| \cos \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{y} \right| = \frac{|\sin \frac{1}{\xi}|}{\xi^2} |x - y| \leq \frac{1}{\frac{1}{n^2}} \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n},$$

bo  $\xi \geq \frac{1}{n}$ . Zatem największa rozpiętość wartości funkcji na przedziałach podziału  $\mathcal{P}$ , które mają długość  $\frac{1}{n^3}$ , nie przekracza  $\frac{1}{n}$ . Otrzymujemy więc

$$\begin{aligned} U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) &= (M_0 - m_0) \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^{n^3-n^2} (M_i - m_i) \frac{1}{n^3} \\ &\leq \frac{2}{n} + \frac{n^3 - n^2}{n} \frac{1}{n^3} \leq \frac{3}{n}. \end{aligned}$$

**Zadanie.** Znaleźć funkcję  $f : [0, 1] \xrightarrow{\text{na}} [0, 1]$ , której wykres jest gęstym podzbiorem w  $[0, 1] \times [0, 1]$ .

Zapis  $f \in \mathcal{R}$  oznacza, że  $f$  jest całkowna w sensie Riemanna.

**Twierdzenie 8.9.** (i) Jeśli  $f, g \in \mathcal{R}$ , to  $f \pm g, cf \in \mathcal{R}$  oraz

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx, \\ \int_a^b cf(x) dx &= c \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

(ii) Jeśli  $f, g \in \mathcal{R}$  oraz  $f(x) \leq g(x)$  dla  $a \leq x \leq b$ , to

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

(iii) Jeśli  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  oraz  $a < c < b$ , to  $f \in \mathcal{R}[a, c] \cap \mathcal{R}[c, b]$  oraz

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

(iv) Jeśli  $f \in \mathcal{R}$  oraz  $|f(x)| \leq M$  dla  $a \leq x \leq b$ , to

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b - a).$$

*Dowód.* Dla liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć podziały  $\mathcal{P}_1$  i  $\mathcal{P}_2$ , dla których

$$U(\mathcal{P}_1, f) - L(\mathcal{P}_1, f) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad U(\mathcal{P}_2, g) - L(\mathcal{P}_2, g) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Wtedy dla podziału  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$  mamy

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad U(\mathcal{P}, g) - L(\mathcal{P}, g) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

W rezultacie

$$[U(\mathcal{P}, f) + U(\mathcal{P}, g)] - [L(\mathcal{P}, f) + L(\mathcal{P}, g)] < \varepsilon. \quad (8.2)$$

Dalej

$$\begin{aligned} U(\mathcal{P}, f + g) &= \sum_{i=1}^n M_i(f + g)\Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n M_i(f)\Delta x_i + \sum_{i=1}^n M_i(g)\Delta x_i = U(\mathcal{P}, f) + U(\mathcal{P}, g). \end{aligned} \quad (8.3)$$

Podobnie

$$L(\mathcal{P}, f + g) \geq L(\mathcal{P}, f) + L(\mathcal{P}, g). \quad (8.4)$$

W świetle (8.2) otrzymujemy

$$U(\mathcal{P}, f + g) - L(\mathcal{P}, f + g) < \varepsilon.$$

Stąd  $f + g$  jest całkowna. Wartość całki  $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$  leży pomiędzy liczbami  $L(\mathcal{P}, f + g)$  i  $U(\mathcal{P}, f + g)$ . Z (8.3) i (8.4) wartość ta leży w przedziale pomiędzy liczbami  $L(\mathcal{P}, f) + L(\mathcal{P}, g)$  i  $U(\mathcal{P}, f) + U(\mathcal{P}, g)$ . Ale wielkość  $\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$  też leży w tym przedziale. Z (8.2) długość tego przedziału jest mniejsza niż  $\varepsilon$ . To oznacza, że

$$\left| \int_a^b [f(x) + g(x)] dx - \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Stąd otrzymujemy

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

Dla liczby  $c \geq 0$  i podziału  $\mathcal{P}$  mamy

$$m_i(cf) = cm_i(f), \quad M_i(cf) = cM_i(f),$$

natomiast dla  $c < 0$

$$m_i(cf) = cM_i(f), \quad M_i(cf) = cm_i(f).$$

To wystarcza do przeprowadzenia dowodu równości  $\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$ .

Część (ii) twierdzenia jest oczywista. Przechodzimy do dowodu (iii). Dla liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć podział  $\mathcal{P}_0$  przedziału  $[a, b]$  spełniający  $U(\mathcal{P}_0, f) - L(\mathcal{P}_0, f) < \varepsilon$ . Wtedy dla podziału  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_0 \cup \{c\}$  mamy

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) < \varepsilon. \quad (8.5)$$

Podział  $\mathcal{P}$  możemy zapisać jako sumą podziałów  $\mathcal{P}_1$  i  $\mathcal{P}_2$  przedziałów  $[a, c]$  i  $[c, b]$ , odpowiednio. Ponadto

$$U_{[a,b]}(\mathcal{P}, f) = U_{[a,c]}(\mathcal{P}_1, f) + U_{[c,b]}(\mathcal{P}_2, f), \quad (8.6)$$

$$L_{[a,b]}(\mathcal{P}, f) = L_{[a,c]}(\mathcal{P}_1, f) + L_{[c,b]}(\mathcal{P}_2, f). \quad (8.7)$$

Na podstawie (8.5) otrzymujemy więc

$$U_{[a,c]}(\mathcal{P}_1, f) - L_{[a,c]}(\mathcal{P}_1, f) < \varepsilon,$$

$$U_{[c,b]}(\mathcal{P}_2, f) - L_{[c,b]}(\mathcal{P}_2, f) < \varepsilon.$$

Stąd funkcja  $f$  jest całkowna w przedziałach  $[a, c]$  i  $[c, b]$ . Wartość  $\int_a^b f(x) dx$  leży pomiędzy liczbami  $L_{[a,b]}(\mathcal{P}, f)$  i  $U_{[a,b]}(\mathcal{P}, f)$ . Na podstawie (8.6) i (8.7) wartość  $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$  też leży pomiędzy tymi liczbami. Wtedy z (8.5) otrzymujemy

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Założmy, że  $|f(x)| \leq M$ . Wtedy  $-M \leq f(x) \leq M$ . Zatem

$$-M(b-a) = \int_a^b (-M) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a).$$

□

**Uwaga.** Przyjmujemy, że  $\int_a^a f(x) dx = 0$  oraz dla  $b < a$  określamy

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Wtedy wzór w Twierdzeniu 6.9(iii) jest prawdziwy niezależnie od konfiguracji liczb  $a$ ,  $b$  i  $c$ .

**Twierdzenie 8.10.** *Przypuśćmy, że funkcja  $f(x)$  jest całkowalna na przedziale  $[a, b]$  oraz  $m \leq f(x) \leq M$  dla  $a \leq x \leq b$ . Niech  $g(y)$  będzie funkcją ciągłą na  $[m, M]$ . Wtedy funkcja złożona  $g(f(x))$  jest całkowalna na  $[a, b]$ .*

*Dowód.* Ustalmy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Istnieje liczba  $\delta > 0$  taka, że jeśli  $|y_1 - y_2| < \delta$ , to  $|g(y_1) - g(y_2)| < \varepsilon$ . Z całkowalności funkcji  $f$  można znaleźć podział  $\mathcal{P}$  taki, że

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i < \delta \varepsilon.$$

Jeśli liczba  $M_i - m_i$  jest duża, to liczba  $\Delta x_i$  musi być mała. Niech

$$A = \{i : M_i - m_i < \delta\}, \quad B = \{i : M_i - m_i \geq \delta\}.$$

Dla  $i \in A$  maksymalna rozpiętość wartości funkcji  $f$  na przedziale  $[x_{i-1}, x_i]$  jest mniejsza od  $\delta$ . Zatem maksymalna rozpiętość wartości funkcji  $g(f(x))$  na tym przedziale jest mniejsza od  $\varepsilon$ . Oznaczmy

$$M_i^* = \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} g(f(x)), \quad m_i^* = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} g(f(x)), \quad K = \max_{m \leq y \leq M} |g(y)|.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} U(\mathcal{P}, g \circ f) - L(\mathcal{P}, g \circ f) &= \sum_{i=1}^n (M_i^* - m_i^*) \Delta x_i \\ &= \sum_{i \in A} (M_i^* - m_i^*) \Delta x_i + \sum_{i \in B} (M_i^* - m_i^*) \Delta x_i \leq \varepsilon \sum_{i \in A} \Delta x_i + 2K \sum_{i \in B} \Delta x_i \\ &\leq \varepsilon(b-a) + \frac{2K}{\delta} \sum_{i \in B} (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \varepsilon(b-a) + \frac{2K}{\delta} \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \\ &\leq \varepsilon(b-a) + \frac{2K}{\delta} \delta \varepsilon = \varepsilon(b-a + 2K). \end{aligned}$$

□

**Wniosek 8.11.** *Jeśli funkcje  $f$  i  $g$  są całkowne na przedziale  $[a, b]$ , to również funkcje  $|f|$ ,  $f^2$  oraz  $fg$  są całkowne. Ponadto*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

*Dowód.* Dla funkcji  $|f|$  i  $f^2$  stosujemy poprzednie twierdzenie z  $g(y) = |y|$  i  $g(y) = y^2$ . Dalej

$$fg = \frac{1}{4}(f+g)^2 - \frac{1}{4}(f-g)^2.$$

Stąd  $fg$  jest całkowna. Mamy  $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ . Całkując nierówność otrzymamy

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

□

**Uwaga.** Metody szacowania wartości całek.

1. Obliczenie wartości całki.

2.  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ .

3. Znaleźć funkcje  $g(x)$  i  $h(x)$  takie, że  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ . Wtedy

$$\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b h(x) dx.$$

3.  $L(\mathcal{P}, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(\mathcal{P}, f)$ .

**Przykład.** Stosując metodę 2 otrzymamy

$$2 \leq \int_0^2 \sqrt{1+x^4} dx \leq 2\sqrt{17}.$$

Lepszy wynik uzyskamy rozdzielając całkę

$$\int_0^2 \sqrt{1+x^4} dx = \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx + \int_1^2 \sqrt{1+x^4} dx.$$

Wtedy

$$1 + \sqrt{2} \leq \int_0^2 \sqrt{1+x^4} dx \leq \sqrt{2} + \sqrt{17}.$$

## 8.1 Zasadnicze twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego

**Twierdzenie 8.12.** *Jeśli funkcja  $f(x)$  jest całkowna na  $[a, b]$  to funkcja  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  jest ciągła na  $[a, b]$ . Jeśli  $f$  jest ciągła w punkcie  $x_0$ , to  $F(x)$  jest różniczkowalna w  $x_0$  oraz  $F'(x_0) = f(x_0)$  dla  $a < x_0 < b$  i  $F'_+(a) = f(a)$ ,  $F'_-(b) = f(b)$ .*

*Dowód.* Załóżmy, że  $|f(x)| \leq M$ , czyli  $-M \leq f(x) \leq M$ . Dla  $a \leq x_1 \leq x_2 \leq b$  mamy

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_a^{x_2} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt \right| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| \leq M(x_2 - x_1)$$

Jeśli  $f$  jest ciągła w  $x_0$ , to dla liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć liczbę  $\delta > 0$  taką, że dla  $|t - x_0| < \delta$  mamy  $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ . Załóżmy, że  $0 < |x - x_0| < \delta$ . Wtedy

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left[ \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right] - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt - \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(x_0) dt \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x [f(t) - f(x_0)] dt \right| \\ &\leq \begin{cases} \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt & \text{dla } x > x_0, \\ \frac{1}{x_0 - x} \int_x^{x_0} |f(t) - f(x_0)| dt & \text{dla } x < x_0. \end{cases} \end{aligned}$$



W obu przypadkach argument całkowania  $t$  leży pomiędzy  $x_0$  i  $x$ . Zatem  $|t - x_0| \leq |x - x_0| < \delta$ . Wtedy  $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ . W obu przypadkach funkcja podcałkowa jest mniejsza niż  $\varepsilon$ . Zatem niezależnie od przypadku otrzymujemy oszacowanie przez  $\varepsilon$ . W przypadku  $x > x_0$  dostajemy  $F'_+(x_0) = f(x_0)$  a z  $x < x_0$  wnioskujemy, że  $F'_-(x_0) = f(x_0)$ .  $\square$

**Wniosek 8.13.** Dla funkcji  $f(x)$  ciągłej na przedziale  $[a, b]$  istnieje funkcja  $F(x)$  taka, że  $F'(x) = f(x)$  dla  $a < x < b$  oraz  $F'_+(a) = f(a)$  i  $F'_-(b) = f(b)$ . Funkcję  $F(x)$  nazywamy **funkcją pierwotną** do funkcji  $f(x)$ .

**Twierdzenie 8.14** (Zasadnicze twierdzenie rric). Jeśli funkcja  $f(x)$  jest całkowna na  $[a, b]$  oraz  $F(x)$  jest funkcją pierwotną do  $f(x)$ , to

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_{x=a}^{x=b}.$$

*Dowód.* Dla liczby  $\varepsilon > 0$  bierzemy podział  $\mathcal{P}$  taki, że

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) < \varepsilon.$$

Niech  $x_0, x_1, \dots, x_n$  oznaczają punkty podziału  $\mathcal{P}$ . Wtedy z twierdzenia Lagrange'a otrzymujemy

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_1) - F(x_0) + F(x_2) - F(x_1) + \dots + F(x_n) - F(x_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n F'(t_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i =: S(\mathcal{P}, f), \end{aligned}$$

dla pewnych punktów  $x_{i-1} \leq t_i \leq x_i$ . Mamy

$$\begin{aligned} L(\mathcal{P}, f) &\leq S(\mathcal{P}, f) \leq U(\mathcal{P}, f), \\ L(\mathcal{P}, f) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq U(\mathcal{P}, f). \end{aligned}$$

Zatem

$$\left| F(b) - F(a) - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| S(\mathcal{P}, f) - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

$\square$

**Uwaga.** Wzór w twierdzeniu jest prawdziwy również dla  $a \geq b$ .

**Przykłady.**

$$(a) \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$(b) \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Twierdzenie 6.14 może być użyte do obliczania różnego rodzaju granic.

**Przykłady.**

(a) Chcemy obliczyć

$$\lim_n \left( \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \dots + \frac{2n-1}{n^2} \right).$$

Wyrażenie pod granicą możemy zapisać w postaci

$$\frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{2n-1}{n} \right).$$

Przyjmijmy, że  $x_i = \frac{2i}{n}$  oraz  $t_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ . Mamy  $\Delta x_i = \frac{2}{n}$ . Zatem

wyrażenie pod granicą ma postać sumy całkowitej dla całki  $\frac{1}{2} \int_0^2 x dx = 1$ .

Stąd granica wynosi 1. Można zauważyć, że wyrażenie pod granicą jest równe 1, niezależnie od wartości  $n$ .

(b) Mamy do obliczenia

$$\begin{aligned} & \lim_n \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right) \\ &= \lim_n \frac{1}{n} \left( \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} + \frac{1}{\sqrt{1+\frac{2^2}{n^2}}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{1+\frac{n^2}{n^2}}} \right) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \log(x + \sqrt{x^2+1}) \Big|_0^1 = \log(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$


---

**Twierdzenie 8.15** (Całkowanie przez podstawienie). *Przypuśćmy, że funkcja  $f(u)$  jest ciągła, a funkcja  $\varphi(x)$  jest różniczkowalna w sposób ciągły na przedziale  $[a, b]$  oraz zbiór wartości  $\varphi([a, b])$  jest zawarty w obszarze określoności funkcji  $f$ . Wtedy*

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du. \quad (8.8)$$

*Dowód.* Symbolem  $F$  oznaczmy funkcję pierwotną do  $f$ . Wtedy

$$[F(\varphi(x))] = F'(\varphi(x))\varphi'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

Z Twierdzenia 6.14 otrzymujemy zatem

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) \Big|_a^b = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du.$$

□

**Uwaga.** Patrząc mechanicznie na wzór (8.8) widzimy, że nastąpiła zamiana  $u = \varphi(x)$  i  $du = \varphi'(x) dx$ , oraz końce przedziału całkowania zostały odpowiednio zmodyfikowane.

### Przykłady.

(a) Dla całki  $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx$  stosujemy podstawienie  $u = \sin x =: \varphi(x)$ ,

$f(u) = u$ . Wtedy  $du = \cos x dx$ . W wyniku otrzymujemy  $\int_0^1 u du = \frac{1}{2}$ .

(b) Wzór (8.8) może być zastosowany w przeciwną stronę. Rozważmy całkę

$$\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}.$$

Zastosujemy podstawienie  $u = \sinh x$ . Wtedy  $du = \cosh x dx$ . Trzeba znaleźć granice całkowania  $a$  i  $b$  odpowiadające liczbom 0 i 1. W tym

celu rozwiązujemy równania  $\sinh a = 0$  i  $\sinh b = 1$ . Otrzymujemy  $a = 0$ . Drugie równanie przekształcamy do postaci

$$\frac{1}{2}e^{2b} - e^b - \frac{1}{2} = 0.$$

Jedynym dodatnim pierwiastkiem trójmianu kwadratowego jest  $1 + \sqrt{2}$ . Zatem  $e^b = 1 + \sqrt{2}$ , czyli  $b = \log(1 + \sqrt{2})$ . Otrzymujemy więc

$$\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int_0^{\log(1+\sqrt{2})} \frac{\cosh x}{\sqrt{1+\sinh^2 x}} dx = \int_0^{\log(1+\sqrt{2})} dx = \log(1 + \sqrt{2}),$$

bo  $\cosh x = \sqrt{1 + \sinh^2 x}$ .

**Twierdzenie 8.16** (Całkowanie przez części). *Załóżmy, że funkcje  $u$  i  $v$  są ciągle natomiast  $u'$  i  $v'$  są całkowalne w sensie Riemanna na przedziale  $[a, b]$ . Wtedy*

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

*Dowód.* Mamy  $(uv)' = u'v + uv'$ . Z Twierdzenia 8.14 otrzymujemy więc

$$u(x)v(x)\Big|_a^b = \int_a^b [u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

□

**Przykład.**

$$\int_0^\pi x \sin x dx = -x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx = \pi.$$

**Uwaga.** Często łatwiej znaleźć funkcję pierwotną zamiast stosować całkowanie przez części. W przykładzie  $(-x \cos x + \sin x)' = x \sin x$ . Główną częścią funkcji pierwotnej jest składnik  $-x \cos x$ . Po obliczeniu pochodnej pojawia się dodatkowy składnik  $-\cos x$ . Stąd w funkcji pierwotnej występuje korekta o  $\sin x$ . Podobnie przy obliczaniu całki  $\int_0^1 x^2 e^x dx$  możemy łatwo znaleźć funkcję pierwotną metodą korekt. Otrzymamy

$$(x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x)' = x^2 e^x.$$

Zatem

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2)e^x \Big|_0^1 = e - 2.$$

**Twierdzenie 8.17** (Reszta we wzorze Taylora w postaci całkowej). *Jeśli funkcja  $f(x)$  jest  $n + 1$ -krotnie różniczkowalna w sposób ciągły w otoczeniu punktu  $a$ , to dla punktów  $b$  z tego otoczenia mamy*

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + R_{n+1},$$

gdzie

$$R_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^b (b-x)^n f^{(n+1)}(x) dx.$$

*Dowód.* Zastosujemy wielokrotne całkowanie przez części.

$$\begin{aligned} f(b) &= f(a) + \int_a^b f'(x) dx = f(a) - \int_a^b (b-x)' f'(x) dx \\ &= f(a) - (b-x) f'(x) \Big|_a^b + \int_a^b (b-x) f''(x) dx \\ &= f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{1}{2} \int_a^b [-(b-x)^2]' f''(x) dx \\ &= f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{1}{2} (b-a)^2 f''(a) + \frac{1}{2} \int_a^b (b-x)^2 f'''(x) dx \\ &= \dots = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + R_{n+1}. \end{aligned}$$

□

**Twierdzenie 8.18** (Twierdzenie o wartości średniej). *Funkcje  $f$  i  $g$  są całkowne na  $[a, b]$ , przy czym  $g(x) \geq 0$  dla  $a \leq x \leq b$ . Wtedy*

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \lambda \int_a^b g(x) dx$$

dla liczby  $\lambda$  leżącej pomiędzy kresami dolnym  $m$  i górnym  $M$  funkcji  $f$ .

*Dowód.* Mamy  $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$ . Całkując otrzymamy

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

Jeśli  $\int_a^b g(x) dx = 0$ , to również  $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$ . W przypadku  $\int_a^b g(x) dx > 0$  otrzymujemy

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

□

**Przykład.**

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx = \lambda \int_0^\pi \sin x dx = 2\lambda$$

dla pewnej liczby  $m \leq \lambda \leq M$ .

**Wniosek 8.19.** *Jeśli funkcja  $f$  jest ciągła a funkcja  $g(x)$  nieujemna i całkowna, to*

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

dla pewnego punktu  $a \leq \xi \leq b$ .

*Dowód.* Z poprzedniego twierdzenia mamy  $m \leq \lambda \leq M$ . Z własności Darboux można znaleźć  $\xi$  taki, że  $f(\xi) = \lambda$ . □

**Przykład.** Jeśli  $f$  jest ciągła, to

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx = 2f(\xi).$$

**Twierdzenie 8.20.** *Jeśli  $g(x)$  jest nieujemną funkcją rosnącą a  $f(x)$  funkcją całkowną na  $[a, b]$ , to*

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\xi^b f(x) dx \tag{8.9}$$

dla pewnego punktu  $\xi$  z przedziału  $[a, b]$ .

*Dowód.* Załóżymy, że  $g$  jest różniczkowalna w sposób ciągły i że  $f$  jest ciągła. Określmy

$$F(x) = \int_x^b f(t) dt.$$

Wtedy  $F'(x) = -f(x)$ . Zatem

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= \int_a^b (-F(x))'g(x) dx \\ &= -F(x)g(x) \Big|_a^b + \int_a^b F(x)g'(x) dx = F(a)g(a) + \int_a^b F(x)g'(x) dx. \end{aligned}$$

Niech  $m$  i  $M$  oznaczają kresy dolny i górny funkcji  $F$ . Z Twierdzenia 8.18 otrzymujemy

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \geq mg(a) + m \int_a^b g'(x) dx = mg(b).$$

Podobnie

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq Mg(b).$$

Jeśli  $g(b) > 0$ , to

$$m \leq \frac{1}{g(b)} \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M.$$

Z własności Darboux dla funkcji  $F(x)$  dostajemy

$$\frac{1}{g(b)} \int_a^b f(x)g(x) dx = F(\xi) = \int_\xi^b f(x) dx$$

dla pewnego punktu  $\xi$  w  $[a, b]$ . □

**Uwaga.** Jeśli  $g(x)$  jest nieujemna i malejąca, to

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx$$

**Przykład.** Dla  $0 < a < b$  mamy

$$\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{a} \int_a^\xi \sin x dx = \frac{\cos a - \cos \xi}{a}.$$

Zatem

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$


---

## 8.2 Wzory Wallisa i Stirlinga

Dla dwu ciągów liczb dodatnich  $a_n$  i  $b_n$  zapis  $a_n \approx b_n$  oznacza, że  $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow[n]{} 1$ .

We wzorze

$$\binom{2n}{0} + \dots + \binom{2n}{n} + \dots + \binom{2n}{2n} = 4^n$$

liczba  $\binom{2n}{n}$  jest największa. Wzór Wallisa podaje informację jaki jest stosunek tej liczby do sumy wszystkich symboli, czyli do  $4^n$ .

**Twierdzenie 8.21** (Wzór Wallisa).

$$\lim_n \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}.$$

$$\text{Tzn. } \binom{2n}{n} \approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

*Dowód.* Oznaczmy  $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ . Mamy  $I_0 = \frac{\pi}{2}$  oraz  $I_1 = 1$ . Dalej dla



$n \geq 2$  mamy

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} (-\cos x)' (\sin x)^{n-1} dx \\ &= -\cos x (\sin x)^{n-1} \Big|_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 x (\sin x)^{n-2} dx \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} [1 - \sin^2 x] (\sin x)^{n-2} dx = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n. \end{aligned}$$

Zatem

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}. \quad (8.10)$$

Poprzez iterację (8.10) otrzymujemy

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \dots = \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 3 \cdot 1}{2n(2n-2)\dots 4 \cdot 2} I_0 = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \frac{\pi}{2}, \quad (8.11)$$

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} I_{2n-1} = \dots = \frac{(2n)(2n-2)\dots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1)\dots 5 \cdot 3} I_1 = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}. \quad (8.12)$$

Ciąg  $I_n$  jest malejący, czyli  $I_{2n+2} \leq I_{2n+1} \leq I_{2n}$ . Zatem na podstawie (8.10) dostajemy

$$\frac{2n+1}{2n+2} = \frac{I_{2n+2}}{I_{2n}} \leq \frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} \leq 1.$$

Wnioskujemy, że  $I_{2n+1}/I_{2n} \xrightarrow{n} 1$ . Stąd korzystając z (8.11) i (8.12) mamy

$$1 \leftarrow \frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} = \sqrt{\frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!} \frac{4^n (n!)^2}{(2n)!} \frac{2}{\pi}} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n)! \sqrt{\pi n}} \sqrt{\frac{2n}{2n+1}}.$$

□

**Twierdzenie 8.22** (Wzór Stirlinga).

$$\lim_n \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}} = 1,$$

tzn.  $n! \approx n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ .

*Dowód.* Udowodnimy następującą nierówność, z której wynika teza twierdzenia.

$$n^n e^{-n\sqrt{2\pi n}} < n! \leq n^n e^{-n\sqrt{2\pi n}} e^{\frac{1}{4n}}. \quad (8.13)$$

Oznaczmy

$$a_n = \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}} = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}.$$

Wtedy

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{(n+1)e} \frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

Dalej

$$\log \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1.$$

Rozważmy fragment wykresu funkcji  $y = 1/x$  od punktu  $x_1 = n$  do punktu  $x_2 = n + 1$ . Wykres jest wypukły w dół. Zatem pole trapezu pod sieczną przechodzącą przez punkty  $(x_1, 1/x_1)$  i  $(x_2, 1/x_2)$  jest większe niż pole pod wykresem funkcji. Z kolei to ostatnie pole jest większe niż pole trapezu pod styczną do wykresu w punkcie  $(x_3, 1/x_3)$  dla  $x_3 = (x_1 + x_2)/2 = n + \frac{1}{2}$ . Pole pod wykresem wynosi

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \log(n+1) - \log n = \log \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Zatem

$$\frac{1}{n + \frac{1}{2}} < \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n + \frac{1}{2}}{n(n+1)}.$$

Pomnóżmy nierówność przez  $n + \frac{1}{2}$  i odejmijmy 1. Wtedy

$$0 < \left(n + \frac{1}{2}\right) \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 < \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2}{n(n+1)} - 1 = \frac{1}{4n(n+1)}.$$

To oznacza, że

$$0 < \log \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right),$$

czyli

$$1 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{e^{\frac{1}{4n}}}{e^{\frac{1}{4(n+1)}}}.$$

Stąd ciąg  $a_n$  jest malejący. Niech  $\alpha = \lim_n a_n$ . Ostatnia nierówność pociąga również

$$1 \leq \frac{a_n}{a_{n+k}} < \frac{e^{\frac{1}{4n}}}{e^{\frac{1}{4(n+k)}}}.$$

Przechodzimy do granicy, gdy  $k \rightarrow \infty$ . Otrzymujemy

$$1 < \frac{a_n}{\alpha} \leq e^{\frac{1}{4n}}. \quad (8.14)$$

To oznacza, że  $\alpha > 0$ . Obliczymy teraz wartość liczby  $\alpha$ . Mamy

$$\frac{a_n^2}{a_{2n}\sqrt{2}} = \frac{(n!)^2 e^{2n}}{n^{2n+1}} \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)! e^{2n}\sqrt{2}} = \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!\sqrt{n}} \xrightarrow{n} \sqrt{\pi}.$$

Ale

$$\frac{a_n^2}{a_{2n}\sqrt{2}} \xrightarrow{n} \frac{\alpha^2}{\alpha\sqrt{2}} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}.$$

Stąd  $\alpha = \sqrt{2\pi}$ . Z (8.14) uzyskujemy

$$1 < \frac{a_n}{\sqrt{2\pi n}} \leq e^{\frac{1}{4n}},$$

co jest równoznaczne z (8.13).  $\square$

**Twierdzenie 8.23.** Ciąg funkcji  $f_n$  ciągłych na przedziale  $[a, b]$  jest jednostajnie zbieżny do funkcji  $f$ . Wtedy

$$\lim_n \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

**Uwaga.** Twierdzenie mówi, że

$$\lim_n \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_n f_n(x) dx,$$

tzn. można wejść z granicą pod znak całki, przy zbieżności jednostajnej.

*Dowód.* Dla ustalonej liczby  $\varepsilon > 0$  można znaleźć próg  $N$  taki, że dla  $n > N$  oraz  $a \leq x \leq b$  mamy  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/(b-a)$ , czyli

$$f(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} < f_n(x) < f(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Całkując otrzymamy

$$\int_a^b f(x) dx - \varepsilon < \int_a^b f_n(x) dx < \int_a^b f(x) dx + \varepsilon,$$

tzn.

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

□

**Przykłady.**

(a)  $f_n(x) = x^n(1-x)$ ,  $0 \leq x \leq 1$ . Można pokazać, że  $f_n(x) \rightrightarrows 0$ . Zatem

$$\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n} 0.$$

(b)  $f_n(x) = x^n$ . Mamy

$$f_n(x) \xrightarrow{n} \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x = 1. \end{cases}$$

Zatem  $f_n(x)$  nie jest zbieżny jednostajnie, ale  $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n} 0$ .

(c)  $f_n(x) = n^3 x^n(1-x)$ . Mamy  $f_n(x) \xrightarrow{n} 0$ , dla  $0 \leq x \leq 1$ . Ale

$$\int_0^1 n^3 x^n(1-x) dx = n^3 \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{n^3}{(n+1)(n+2)} \xrightarrow{n} \infty.$$

### 8.3 Całka nieoznaczona

**Definicja 8.24.** *Przypuśćmy, że funkcje  $f(x)$  i  $F(x)$  są określone na ustalonym przedziale i spełniają  $F'(x) = f(x)$ . Funkcję  $F(x)$  nazywamy funkcją pierwotną do funkcji  $f(x)$  lub całką nieoznaczoną funkcji  $f(x)$  i zapisujemy*

$$\int f(x) dx = F(x).$$

Jeśli  $G(x)$  jest inną funkcją pierwotną do  $f(x)$ , to  $G(x) = F(x) + C$  dla pewnej stałej  $C$ . Rzeczywiście,

$$(G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Zatem funkcja  $G(x) - F(x)$  jest stała na przedziale. Stwierdzenie nie jest prawdziwe dla dwu przedziałów. Na przykład niech  $x \in (0, 1) \cup (2, 3)$ . Niech  $F(x) = x^2$  oraz

$$G(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & 0 < x < 1, \\ x^2 - 1 & 2 < x < 3. \end{cases}$$

Wtedy  $G'(x) = F'(x) = 2x$ .

**Przykład.**

$$\int \frac{1}{x} dx = \begin{cases} \log x & x > 0, \\ \log(-x) & x < 0 \end{cases} = \log |x|.$$

Zapis stosowany w wielu podręcznikach

$$\int \frac{1}{x} dx = \log |x| + C$$

jest mylący, bo sugeruje, że na obu półprostyach dodatniej i ujemnej musimy wziąć tę samą stałą.

---

**Twierdzenie 8.25.**

$$\begin{aligned} \int [f(x) + g(x)] dx &= \int f(x) dx + \int g(x) dx, \\ \int cf(x) dx &= c \int f(x) dx. \end{aligned}$$

**Twierdzenie 8.26** (Całkowanie przez podstawienie). *Załóżmy, że funkcja  $\varphi(x)$  jest różniczkowalna w sposób ciągły natomiast funkcja  $f(u)$  jest ciągła na zbiorze wartości funkcji  $\varphi$ . Wtedy*

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)),$$

gdzie  $F(u) = \int f(u) du$ .

*Dowód.*

$$\frac{d}{dx}F(\varphi(x)) = F'(\varphi(x))\varphi'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

□

**Uwaga.** Tezę możemy zapisać w postaci

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(u), \quad \text{gdzie } u = \varphi(x).$$

Inaczej

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(u) du, \quad \text{gdzie } u = \varphi(x).$$

### Stosowanie twierdzenia

1. Chcemy obliczyć  $\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx$ . Obliczamy  $\int f(u) du$  i po wykonaniu obliczeń podstawiamy  $u = \varphi(x)$ . Formalnie wyrażenie  $\varphi'(x) dx$  zamieniło się na  $du$ , tzn.  $du = \varphi'(x) dx$ . To jest zgodne z zapisem Leibniza, bo  $\varphi(x) = \frac{du}{dx}$ .
2. Chcemy obliczyć  $\int f(u) du$ . Podstawiamy  $u = \varphi(x)$ . Obliczamy  $\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx$ . Następnie pozbywamy się zmiennej  $x$  przez podstawienie  $u = \varphi(x)$ . Ponownie  $du = \varphi'(x) dx$ .

### Przykłady.

(a)

$$\int e^{-\sqrt{x}} dx = \int 2\sqrt{x}e^{-\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx.$$

Stosujemy podstawienie  $u = \varphi(x) = \sqrt{x}$ ,  $f(u) = 2ue^{-u}$ . Zatem  $du = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ . Otrzymujemy więc

$$\int e^{-\sqrt{x}} dx = \int 2ue^{-u} du = -2ue^{-u} - 2e^{-u} = -2\sqrt{x}e^{-\sqrt{x}} - 2e^{-\sqrt{x}}.$$

(b)

$$\begin{aligned} \int \sin \sqrt{u} du & \underset{u=x^2}{=} \int \sin x \cdot 2x dx = -2x \cos x + 2 \sin x \\ & = -2\sqrt{u} \sin \sqrt{u} + 2 \sin \sqrt{u}. \end{aligned}$$

**Twierdzenie 8.27** (Całkowanie przez części).

$$\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx.$$

*Dowód.* Mamy  $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ . Zatem

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx.$$

□

**Przykłady.**

$$(a) \int x e^{-x} dx = \int (-e^{-x})' x dx = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x}.$$

$$(b) \int \log x dx = \int x' \log x dx = x \log x - \int x \frac{1}{x} dx = x \log x - x.$$

$$(c) \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x = e^x \sin x - \left[ e^x \cos x + \int e^x \sin x dx \right].$$

$$(d) \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \frac{\sin x}{\sin x} - \int \sin x \left( -\frac{\cos x}{\sin^2 x} \right) dx = 1 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx.$$

**8.4 Całkowanie funkcji wymiernych**

Będziemy się zajmowali obliczeniem  $\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$ , gdzie  $p(x)$  i  $q(x)$  są wielomianami. Jeśli  $\deg p \geq \deg q$ , to wykonujemy dzielenie z resztą

$$p(x) = w(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg q.$$

Wtedy

$$\frac{p(x)}{q(x)} = w(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

**Przykłady.**

$$(a) \int \frac{1}{x} dx = \log |x|. \text{ Zatem}$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log |f(x)|.$$

(b)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-2)(x-3)} &= \int \left( \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right) dx \\ &= \log |x-3| - \log |x-2| = \log \left| \frac{x-3}{x-2} \right|. \end{aligned}$$



Ogólnie przy całkowaniu  $r(x)/q(x)$  rozkładamy mianownik na czynniki postaci  $(x - \alpha)^n$  oraz  $[(x - \beta)^2 + \gamma^2]^m$ . Wtedy wyrażenie  $r(x)/q(x)$  rozkłada się na sumę wyrażeń postaci

$$\frac{c_1}{x - \alpha} + \frac{c_2}{(x - \alpha)^2} + \dots + \frac{c_n}{(x - \alpha)^n},$$

$$\frac{d_1x + e_1}{(x - \beta)^2 + \gamma^2} + \frac{d_2x + e_2}{[(x - \beta)^2 + \gamma^2]^2} + \dots + \frac{d_mx + e_m}{[(x - \beta)^2 + \gamma^2]^m}.$$

**Przykład.**

$$\int \frac{dx}{x^3 + 1} dx = \int \frac{dx}{(x + 1)(x^2 - x + 1)}.$$

Wiemy, że

$$\frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - x + 1}. \quad (8.15)$$

Chcemy znaleźć stałe  $A$ ,  $B$  i  $C$ .

**Sposób I.**

Mnożymy obie strony równości przez  $x + 1$  i podstawiamy  $x = -1$ . Otrzymujemy  $A = \frac{1}{3}$ . Dalej

$$\frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} - \frac{1}{3(x + 1)} = \frac{-x^2 + x + 2}{3(x + 1)(x^2 - x + 1)}$$

$$= -\frac{(x + 1)x - 2}{3(x + 1)(x^2 - x + 1)} = -\frac{x - 2}{3(x^2 - x + 1)}.$$

Ostatecznie otrzymaliśmy

$$\frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{1}{3(x + 1)} - \frac{x - 2}{3(x^2 - x + 1)}. \quad (8.16)$$

**Sposób II.**

Mnożymy równość (8.15) przez  $(x + 1)(x^2 - x + 1)$  i otrzymujemy

$$1 = A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) = (A + B)x^2 + (B + C - A)x + A + C.$$

Następnie rozwiązujemy układ równań

$$\begin{aligned} A + B &= 0, \\ B + C - A &= 0, \\ A + C &= 1. \end{aligned}$$

Na podstawie (8.16) obliczamy

$$\int \frac{dx}{3(x+1)} = \frac{1}{3} \log|x+1|.$$

Dalej

$$\begin{aligned} \frac{x-2}{x^2-x+1} &= \frac{1}{2} \frac{2x-1}{x^2-x+1} - \frac{3}{2} \frac{1}{x^2-x+1}, \\ \frac{1}{x^2-x+1} &= \frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \frac{1}{\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]^2 + 1}. \end{aligned}$$

Ostatecznie otrzymujemy wynik

$$\int \frac{dx}{x^3+1} = \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{6} \log(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

**Przykład.**  $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x^2+1)}.$

Mamy

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}. \quad (8.17)$$

Jak najszybciej znaleźć stałe  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i  $D$ ? Oznaczmy  $f(x) = 1/(x^2+1)$ . Mnożymy równość przez  $(x-1)^2$  i podstawiamy  $x=1$ . Dostajemy  $B = f(1) = \frac{1}{2}$ . Przekształcamy równość do postaci

$$\frac{f(x)}{(x-1)^2} - \frac{f(1)}{(x-1)^2} = \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Po pomnożeniu przez  $x-1$  otrzymujemy

$$\frac{f(x) - f(1)}{x-1} = A + (x-1) \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Czyli

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2} \Big|_{x=1} = -\frac{1}{2}.$$

Na podstawie (8.17) obliczamy

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} &- \frac{1}{2} \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{x-1} \\ &= \frac{2 - (x^2+1) + (x-1)(x^2+1)}{2(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{x(x-1)^2}{2(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{x}{2(x^2+1)}. \end{aligned}$$

Ostatecznie otrzymujemy

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2} \log|x-1| - \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{4} \log(x^2+1).$$

Ogólnie, rozważamy składnik postaci  $\frac{f(x)}{(x-a)^k}$ , gdzie  $f(x)$  jest funkcją nieskończenie wiele razy różniczkowalną w punkcie  $a$ . Ze wzoru Taylora mamy

$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(x-a)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k-1)}(a) + \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(\xi),$$

dla pewnego punktu  $\xi$  pomiędzy  $a$  i  $x$ . Wtedy

$$\frac{f(x)}{(x-a)^k} = \frac{f(a)}{(x-a)^k} + \frac{f'(a)}{(x-a)^{k-1}} + \dots + \frac{f^{(k-1)}(a)}{(k-1)!(x-a)} + R_k(x),$$

oraz

$$\lim_{x \rightarrow a} R_k(x) = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} = \frac{f^{(k)}(a)}{k!},$$

co oznacza, że w mianowniku funkcji  $R_k(x)$  nie występuje czynnik  $x-a$ . Każdy składnik postaci  $c_k/(x-\alpha)^k$  całkujemy według wzorów

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^k} = -\frac{1}{k-1} \frac{1}{(x-\alpha)^{k-1}}, \quad k \geq 0,$$

$$\int \frac{dx}{x-\alpha} = \log|x-\alpha|.$$

Składniki postaci

$$\frac{(d_k x + e_k)}{[(x-\beta)^2 + \gamma^2]^k}$$

przez podstawienie afiniczne sprowadzamy do wyrażeń postaci

$$\frac{(\tilde{d}_k u + \tilde{e}_k)}{(u^2 + 1)^k}.$$

Dalej

$$\frac{(\tilde{d}_k u + \tilde{e}_k)}{(u^2 + 1)^k} = \tilde{d}_k \frac{u}{(u^2 + 1)^k} + \tilde{e}_k \frac{1}{(u^2 + 1)^k}.$$

$$\int \frac{u}{(u^2 + 1)^k} = \begin{cases} \frac{1}{2} \log(u^2 + 1) & k = 1, \\ -\frac{1}{2(k-1)} \frac{1}{(u^2 + 1)^{k-1}} & k \geq 2. \end{cases}$$

Oznaczmy  $I_k = \int \frac{du}{(u^2 + 1)^k}$ . Wtedy  $I_1 = \operatorname{arctg} u$  oraz

$$\begin{aligned} I_k &= \int u' \frac{1}{(u^2 + 1)^k} du = \frac{u}{(u^2 + 1)^k} + k \int \frac{2u^2 du}{(u^2 + 1)^{k+1}} \\ &= \frac{u}{(u^2 + 1)^k} + 2k \int \frac{[(u^2 + 1) - 1] du}{(u^2 + 1)^{k+1}} \\ &= \frac{u}{(u^2 + 1)^k} + 2kI_k - 2kI_{k+1}. \end{aligned}$$

Otrzymujemy więc

$$I_{k+1} = \frac{1}{2k} \frac{u}{(u^2 + 1)^k} + \frac{2k-1}{2k} I_k.$$

## 8.5 Podstawienie wykładnicze i trygonometryczne

**Przykłady.**

- (a)  $\int \sqrt{1 - e^x} dx$ . Podstawiamy  $u = e^x$ ,  $du = e^x dx$  czyli  $dx = \frac{du}{u}$ , aby otrzymać

$$\int \sqrt{1 - e^x} dx = \int \frac{\sqrt{1 - u}}{u} du.$$

Następnie podstawiamy  $v = \sqrt{1 - u}$ . Wtedy  $u = 1 - v^2$ , czyli  $du = -2v dv$ .

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 - u}}{u} du &= \int \frac{v}{1 - v^2} (-2v) dv = \int \frac{2v^2}{v^2 - 1} dv = 2 \int \left( 1 + \frac{1}{v^2 - 1} \right) dv \\ &= 2v \int \left( \frac{1}{v - 1} - \frac{1}{v + 1} \right) dv = 2v + \log |v - 1| - \log |v + 1| \\ &= 2\sqrt{1 - e^x} + \log(1 - \sqrt{1 - e^x}) - \log(1 + \sqrt{1 - e^x}) \\ &= 2\sqrt{1 - e^x} + \log \frac{e^x}{1 + \sqrt{1 - e^x}} - \log(1 + \sqrt{1 - e^x}) \\ &= 2\sqrt{1 - e^x} + x - 2 \log(1 + \sqrt{1 - e^x}). \end{aligned}$$

(b) Przypomnimy podstawowe wzory dotyczące funkcji hiperbolicznych.

$$\begin{aligned}\cosh^2 x &= \sinh^2 x + 1, \\ \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x, \\ \cosh 2x &= 2 \cosh^2 x - 1 = 2 \sinh^2 x + 1.\end{aligned}$$

W całce  $\int \sqrt{x^2 + 1} dx$  wykonujemy podstawienie  $x = \sinh t$ . Wtedy  $dx = \cosh t dt$ . Zatem

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x^2 + 1} dx &= \int \cosh^2 t dt = \frac{1}{2} \int [\cosh 2t + 1] dt \\ &= \frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sinh 2t = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sinh t \cosh t\end{aligned}$$

Z równości  $x = (e^t - e^{-t})/2$  otrzymujemy

$$\frac{1}{2}e^{2t} - xe^t - \frac{1}{2} = 0.$$

Wtedy  $e^t = x + \sqrt{x^2 + 1}$  oraz  $t = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$ . Zatem

$$\int \sqrt{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 + 1}.$$

(c) Przy całce  $\int \sqrt{x^2 - 1} dx$   $x > 1$  wykonujemy podstawienie  $x = \cosh t$ ,  $t > 0$ . Wtedy  $\sqrt{x^2 - 1} = \sinh t$ . Zatem

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x^2 - 1} dx &= \int \sinh^2 t dt = \frac{1}{2} \int [\cosh 2t - 1] dt \\ &= -\frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sinh t \cosh t = \frac{1}{2} \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 1}.\end{aligned}$$

(c) W całce  $\int \sqrt{1 - x^2} dx$  wykonujemy podstawienie  $x = \sin t$ ,  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ . Wtedy

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1 - x^2} dx &= \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int [\cos 2t + 1] dt = \frac{1}{4} \sin 2t + \frac{1}{2}t \\ &= \frac{1}{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2}t = \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} + \frac{1}{2} \arcsin x.\end{aligned}$$

Rozważamy wyrażenie postaci  $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ , gdzie  $R(x, y)$  jest funkcją wymierną dwu zmiennych. Poprzez podstawienie afiniczne  $x = \alpha t + \beta$  sprowadzamy wyrażenie do jednej z trzech postaci i wykonujemy podane w tabeli podstawienia.

$$\begin{array}{lll} R(t, \sqrt{t^2 + 1}) & a > 0, \Delta < 0 & t = \sinh u \\ R(t, \sqrt{t^2 - 1}) & a > 0, \Delta > 0 & t = \cosh u \\ R(t, \sqrt{1 - t^2}) & a < 0, \Delta > 0 & t = \sin u \end{array}$$

Otrzymamy w wyniku wyrażenie postaci  $R(\cosh u, \sinh u)$  lub  $R(\cos u, \sin u)$ . Jeśli nie potrafimy bezpośrednio wskazać funkcji pierwotnej na tym etapie wykonujemy podstawienia  $v = e^u$  lub  $v = \operatorname{tg} \frac{u}{2}$ , odpowiednio. Przy podstawieniu  $v = e^u$  mamy

$$\cosh u = \frac{1}{2}(v + v^{-1}), \quad \sinh u = \frac{1}{2}(v - v^{-1}), \quad du = \frac{dv}{v}.$$

Przy podstawieniu  $v = \operatorname{tg} \frac{u}{2}$  otrzymujemy

$$\begin{aligned} \cos u &= \cos^2 \frac{u}{2} - \sin^2 \frac{u}{2} = \cos^2 \frac{u}{2} \left[ 1 - \operatorname{tg}^2 \frac{u}{2} \right] = \cos^2 \frac{u}{2} (1 - v^2), \\ \sin u &= 2 \sin \frac{u}{2} \cos \frac{u}{2} = 2 \cos^2 \frac{u}{2} \operatorname{tg} \frac{u}{2} = 2 \cos^2 \frac{u}{2} v, \\ dv &= \frac{1}{2} \left( 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{u}{2} \right) du. \end{aligned}$$

Korzystając ze wzoru

$$1 + \operatorname{tg}^2 \frac{u}{2} = \frac{1}{\cos^2 \frac{u}{2}}$$

otrzymamy

$$\cos u = \frac{1 - v^2}{1 + v^2}, \quad \sin u = \frac{2v}{1 + v^2}, \quad du = \frac{2}{1 + v^2} dv.$$

Przy obu podstawieniach otrzymujemy funkcję wymierną zmiennej  $v$ .

**Przykład.** Nie zawsze warto sprowadzać obliczenie do całki z funkcji wymiernej. Czasami lepiej zastosować wzory trygonometryczne, aby szybciej osiągnąć cel. Przy zastosowaniu podstawienia  $v = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$  do całki  $\int \cos^2 x dx$  otrzymamy

$$\int \cos^2 x = \int \left( \frac{1 - v^2}{1 + v^2} \right)^2 \frac{2}{1 + v^2} dv.$$

**Uwaga.** Można uniknąć podstawienia trygonometrycznego. Np. w całce  $\int \sqrt{1-x^2} dx$  dla  $x > 0$  możemy zastosować podstawienie  $x = 1/u$ . Wtedy  $dx = -du/u^2$ .

Zatem

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = - \int \sqrt{1 - \frac{1}{u^2}} \frac{du}{u^2} = - \int \frac{\sqrt{u^2-1}}{u^3} du.$$

## 8.6 Zastosowanie całek oznaczonych do obliczania wielkości fizycznych

### Pole obszaru na płaszczyźnie

Jeśli  $y = f(x)$  jest nieujemną funkcją ciągłą na  $[a, b]$ , to pole  $S$  obszaru pod wykresem funkcji i nad osią  $x$  wynosi

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

Pole obszaru pomiędzy wykresami dwu funkcji ciągłych  $f(x) \leq g(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  wynosi zatem

$$S = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

### Środek masy obszaru

Zakładamy, że obszar mieści się pomiędzy wykresami funkcji  $f(x)$  i  $g(x)$ ,  $a \leq x \leq b$ , przy czym  $f(x) \leq g(x)$ . Przyjmujemy, że masa jest proporcjonalna do powierzchni. Dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części punktami  $x_i$ , gdzie  $i = 0, 1, \dots, n$ . Temu odpowiada podział obszaru na  $n$  wąskich fragmentów związanych z przedziałami  $[x_{i-1}, x_i]$ . Masa fragmentu wynosi w przybliżeniu

$$m_i = [g(x_i) - f(x_i)] \Delta x_i.$$

Środek masy tego fragmentu znajduje się w przybliżeniu w punkcie

$$X_i := \left( x_i, \frac{1}{2}[f(x_i) + g(x_i)] \right).$$

Środek masy całego obszaru jest równy w przybliżeniu środkowi masy układu punktów  $(X_i, m_i)$  dla  $i = 1, 2, \dots, n$ . Środek masy tego układu znajduje się

w punkcie

$$X \approx \left( \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} [f(x_i) + g(x_i)] m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \right).$$

Dalej

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i &= \sum_{i=1}^n [g(x_i) - f(x_i)] \Delta x_i \xrightarrow{n} \int_a^b [g(x) - f(x)] dx, \\ \sum_{i=1}^n x_i m_i &= \sum_{i=1}^n x_i [g(x_i) - f(x_i)] \Delta x_i \xrightarrow{n} \int_a^b x [g(x) - f(x)] dx, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [f(x_i) + g(x_i)] m_i &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [g(x_i)^2 - f(x_i)^2] \Delta x_i \xrightarrow{n} \frac{1}{2} \int_a^b [g(x)^2 - f(x)^2] dx. \end{aligned}$$

Zatem

$$X = \left( \frac{\int_a^b x [g(x) - f(x)] dx}{\int_a^b [g(x) - f(x)] dx}, \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [g(x)^2 - f(x)^2] dx}{\int_a^b [g(x) - f(x)] dx} \right).$$

Przeanalizujemy błąd występujący w obliczeniach. Dla funkcji  $h$  i liczby  $\delta > 0$  określamy oscylację wzorem

$$\text{osc}(h, \delta) = \sup\{|h(x) - h(y)| : a \leq x, y \leq b, |x - y| < \delta\}.$$

Przy obliczaniu pojedynczego składnika błąd nie przekracza

$$\frac{b-a}{n} \text{osc} \left( h, \frac{b-a}{n} \right),$$

gdzie w roli funkcji  $h$  występują funkcje  $g - f$ ,  $x(g - f)$  oraz  $g^2 - f^2$ . Po zsumowaniu błąd nie przekracza wielkości

$$(b-a) \text{osc} \left( h, \frac{b-a}{n} \right) \xrightarrow{n} 0.$$



**Długość krzywej**

Krzywa na płaszczyźnie zadana jest poprzez parametryzację  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ . Zakładamy, że funkcje  $x(t)$  i  $y(t)$  są różniczkowalne w sposób ciągły. Chcemy obliczyć długość krzywej. Dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części punktami  $t_i$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$ . Fragment krzywej pomiędzy kolejnymi punktami  $(x(t_{i-1}), y(t_{i-1}))$  i  $(x(t_i), y(t_i))$  przybliżamy odcinkiem dla każdej wartości  $i = 1, 2, \dots, n$ . Otrzymamy łamaną o długości

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{[x(t_i) - x(t_{i-1})]^2 + [y(t_i) - y(t_{i-1})]^2}.$$

Z twierdzenia Lagrange'a mamy

$$\begin{aligned} x(t_i) - x(t_{i-1}) &= x'(c_i)\Delta t_i, \\ y(t_i) - y(t_{i-1}) &= y'(d_i)\Delta t_i, \end{aligned}$$

dla pewnych punktów  $c_i$  i  $d_i$  pomiędzy  $t_{i-1}$  i  $t_i$ . Zatem

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(c_i)^2 + y'(d_i)^2} \Delta t_i.$$

Określmy wielkość

$$\tilde{L}_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(c_i)^2 + y'(c_i)^2} \Delta t_i \xrightarrow{n} \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Dalej

$$|\tilde{L}_n - L_n| \leq \sum_{i=1}^n \left| \sqrt{x'(c_i)^2 + y'(d_i)^2} - \sqrt{x'(c_i)^2 + y'(c_i)^2} \right|.$$

Skorzystamy z nierówności trójkąta

$$\left| \sqrt{a_2^2 + b_2^2} - \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \right| \leq \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2}.$$

Zatem

$$\begin{aligned} |\tilde{L}_n - L_n| &\leq \sum_{i=1}^n |y'(d_i) - y'(c_i)| \Delta t_i \leq n \frac{b-a}{n} \operatorname{osc} \left( y', \frac{b-a}{n} \right) \\ &= (b-a) \operatorname{osc} \left( y', \frac{b-a}{n} \right) \xrightarrow{n} 0, \end{aligned}$$

bo funkcja  $y'$  jest jednostajnie ciągła. Reasumując otrzymaliśmy

$$L_n \xrightarrow{n} \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Przyjmujemy więc, że długość krzywej wynosi

$$L = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

**Przykład.** Okrąg o promieniu  $r$  możemy sparametryzować przez  $x = r \cos t$ ,  $y = r \sin t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ . Wtedy

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt = 2\pi r.$$

Wracamy do sytuacji ogólnej. Niech  $s(t)$  oznacza długość krzywej, gdy czas zmienia się od  $a$  do  $t$ . Wtedy

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{x'(u)^2 + y'(u)^2} du.$$

Zatem

$$s'(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

W zapisie Leibniza wzór ma postać

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}.$$

Używa się też zapisu

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

Niech  $y = f(x)$  będzie funkcją różniczkowalną w sposób ciągły na  $[a, b]$ . Chcemy obliczyć długość wykresu. Stosujemy parametryzację  $x = t$ ,  $y = f(t)$ . Wtedy

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

**Przykład.**  $y = \sqrt{1 - x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ . Wtedy

$$L = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \pi.$$

**Uwaga.** Funkcja podcałkowa nie jest określona dla  $x = \pm 1$ , więc obliczenie nie jest do końca ścisłe. W celu uściślenia obliczeń można ograniczyć się do  $-1 + \delta \leq x \leq 1 - \delta$ . W wyniku dostaniemy  $\arcsin(1 - \delta) - \arcsin(-1 + \delta)$ . Przy  $\delta \rightarrow 0^+$  otrzymamy  $\pi$ . Całkę z funkcji, która nie jest określona w niektórych punktach przedziału całkowania, nazywamy całką niewłaściwą. Teorią takich całek zajmiemy się w drugiej części kursu.

### Długość krzywej we współrzędnych biegunowych

Dla punktu  $X(x, y)$  określamy współrzędne biegunowe  $(r, \theta)$ , gdzie  $r$  jest odległością punktu od początku układu, natomiast  $\theta$  jest kątem pomiędzy dodatnią półosią  $x$  i półprostą  $OX$ . Zatem  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Ponadto  $x = r \cos \theta$  i  $y = r \sin \theta$ .

Założmy, że krzywa jest zadana przez związek pomiędzy  $r$  i  $\theta$  wzorem  $r = f(\theta)$ ,  $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ . Wtedy

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta, \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2.$$

Zatem

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta]^2 + [f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta]^2} d\theta.$$

Po uproszczeniu otrzymujemy

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{f'(\theta)^2 + f(\theta)^2} d\theta.$$

### Przykłady.

- (a)  $r = \sin \theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ . Można sprawdzić, że krzywa opisuje okrąg o promieniu  $\frac{1}{2}$  i środku w  $(0, \frac{1}{2})$ . Mamy

$$L = \int_0^\pi \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} d\theta = \pi.$$

(b)  $r = \theta$ ,  $0 \leq \theta \leq 4\pi$ . Krzywa opisuje dwa obroty spirali. Mamy

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{4\pi} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta = \frac{1}{2}\theta\sqrt{1 + \theta^2} + \frac{1}{2}\log(\theta + \sqrt{1 + \theta^2}) \Big|_0^{4\pi} \\ &= 2\pi\sqrt{1 + 16\pi^2} + \frac{1}{2}\log(4\pi + \sqrt{1 + 16\pi^2}). \end{aligned}$$

### Środek masy krzywej

Rozważamy krzywą  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ . Zakładamy, że masa jest proporcjonalna do długości krzywej. Dzielimy przedział na  $n$  równych części. Masa fragmentu krzywej odpowiadającego przedziałowi  $[t_{i-1}, t_i]$  wynosi

$$m_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(u_i)^2} \Delta t_i,$$

dla pewnego punktu  $u_i$  pomiędzy  $t_{i-1}$  i  $t_i$ . Całą masę tego fragmentu umieszczamy w punkcie  $(x(u_i), y(u_i))$ . Otrzymamy układ  $n$  punktów z masami  $m_i$ . Środek masy tego układu znajduje się w punkcie

$$\left( \frac{\sum_{i=1}^n m_i x(u_i)}{\sum_{i=1}^n m_i}, \frac{\sum_{i=1}^n m_i y(u_i)}{\sum_{i=1}^n m_i} \right).$$

Dalej

$$\sum_{i=1}^n m_i = \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(u_i)^2} \Delta t_i = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt,$$

$$\sum_{i=1}^n m_i x(u_i) = \sum_{i=1}^n x(u_i) \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(u_i)^2} \Delta t_i \xrightarrow{n} \int_a^b x(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Podobnie

$$\sum_{i=1}^n m_i y(u_i) \xrightarrow{n} \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Środek masy znajduje się więc w punkcie

$$\left( \frac{\int_a^b x(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}{\int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}, \frac{\int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}{\int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt} \right).$$

Mamy  $s'(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ . Przyjmijmy oznaczenie  $ds = s'(t) dt$ . Środek masy ma wtedy współrzędne

$$\left( \frac{\int_a^b x ds}{\int_a^b ds}, \frac{\int_a^b y ds}{\int_a^b ds} \right).$$

**Przykład.**  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ . Wykres opisuje górny półokrąg o promieniu 1. Obliczamy drugą współrzędną środka masy. Mamy

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 dx = 2.$$

Współrzędna ta wynosi zatem  $\frac{2}{\pi}$ .

---

### Pole powierzchni figur obrotowych

Chcemy obliczyć pole powierzchni bocznej  $S$  figury otrzymanej przez obrót krzywej  $x = x(t)$ ,  $y = y(t) \leq 0$ ,  $a \leq t \leq b$  wokół osi  $x$ . Dzielimy przedział czasu na  $n$  równych części punktami  $t_i$ . Rozważamy fragment krzywej odpowiadający przedziałowi  $[t_{i-1}, t_i]$ . Długość tego fragmentu wynosi

$$L_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{x'(u)^2 + y'(u)^2} du = \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(u_i)^2} \Delta t_i$$

dla pewnego momentu  $t_{i-1} < u_i < t_i$ . Pole powierzchni otrzymanej przez obrót fragmentu jest równe w przybliżeniu  $2\pi y(u_i) L_i$ . Zatem

$$S \approx 2\pi \sum_{i=1}^n y(u_i) \sqrt{x'(u_i)^2 + y'(u_i)^2} \Delta t_i.$$

Przechodząc do granicy, gdy  $n \rightarrow \infty$  otrzymamy

$$S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

**Uwaga.** Druga współrzędna środka masy krzywej wynosi

$$y_0 = \frac{1}{L} \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt,$$

gdzie  $L$  jest długością krzywej. Zatem

$$S = 2\pi y_0 L.$$

Tzn. pole powierzchni obrotowej jest równe iloczynowi długości krzywej i drogi jaką przebywa środek masy przy obrocie (**reguła Guldina**).

Jeśli krzywa jest fragmentem wykresu funkcji  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$ , to pole powierzchni obrotowej wyraża się wzorem

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

### Przykłady.

- (a) Jakie jest pole powierzchni bocznej stożka ściętego o długości tworzącej  $l$  i promieniach podstaw  $r$  i  $R$ ? Powierzchnię otrzymujemy przez obrót odcinka o długości  $l$ , którego końce znajdują się na wysokościach  $r$  i  $R$  nad osią  $x$ . Druga współrzędna środka masy wynosi  $(r + R)/2$ . Zatem

$$S = 2\pi \frac{r + R}{2} l = \pi(r + R)l.$$

- (b) Jakie jest pole powierzchni torusa, czyli figury powstałej przez obrót okręgu o środku w  $(a, b)$  i promieniu  $r \leq b$ ? Środek masy znajduje się w  $(a, b)$ . Zatem

$$S = 2\pi b 2\pi r = 4\pi^2 br.$$

- (c) Rozważamy górny półokrąg  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ . Chcemy obliczyć pole powierzchni otrzymanej przez obrót fragmentu wykresu  $a \leq x \leq b$ . Mamy

$$S = 2\pi \int_a^b \sqrt{1-x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} dx = 2\pi(b-a).$$

Pole powierzchni zależy tylko od długości przedziału  $[a, b]$ .

### Objętość bryły obrotowej przy obrocie wokół osi $x$

Rozważamy wykres funkcji ciągłej i nieujemnej  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$ . Chcemy obliczyć objętość  $V$  bryły otrzymanej przez obrót obszaru pomiędzy wykresem funkcji i osią  $x$ , przy obrocie wokół osi  $x$ . Dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części punktami  $x_i$ . Symbolem  $V_i$  oznaczamy objętość fragmentu bryły odpowiadającej przedziałowi  $[x_{i-1}, x_i]$ . Niech  $m_i$  i  $M_i$  oznaczają minimum i maksimum funkcji na przedziale  $[x_{i-1}, x_i]$ . Fragment bryły zawiera w sobie walec o wysokości  $\Delta x_i$  i promieniu  $m_i$  a sam jest zawarty w walcu o wysokości  $\Delta x_i$  i promieniu  $M_i$ . Zatem

$$\pi m_i^2 \Delta x_i \leq V_i \leq \pi M_i^2 \Delta x_i.$$

Z własności Darboux dla funkcji  $f(x)^2$  mamy  $V_i = \pi f(t_i)^2 \Delta x_i$ , dla pewnej wartości  $x_{i-1} < t_i < x_i$ . Całkowita objętość wynosi więc

$$V = \pi \sum_{i=1}^n f(t_i)^2 \Delta x_i \xrightarrow[n]{} \pi \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Rozważamy obszar  $A$  pomiędzy wykresami dwu funkcji  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  oraz  $0 \leq f(x) \leq g(x)$ . Objętość bryły otrzymanej przez obrót wokół osi  $x$  wynosi

$$V = \pi \int_a^b [g(x)^2 - f(x)^2] dx.$$

**Uwaga.** Druga współrzędna środka masy obszaru  $A$  jest równa

$$y_0 = \frac{1}{2S} \int_a^b [g(x)^2 - f(x)^2] dx,$$

gdzie  $S$  jest polem obracanego obszaru. Zatem

$$V = 2\pi y_0 S.$$

To oznacza, że objętość jest równa iloczynowi powierzchni obracanego obszaru i drogi jaką przebywa środek masy obszaru przy obrocie (**reguła Guldina**).

**Przykład.** Rozważmy obszar ograniczony przez  $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ ,  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ , dla  $0 < r < R$  oraz  $-r \leq a < b \leq r$  i  $a \leq x \leq b$ . Objętość bryły obrotowej jest równa

$$V = \pi \int_a^b [(\sqrt{R^2 - x^2})^2 - (\sqrt{r^2 - x^2})^2] dx = \pi(R^2 - r^2)(b - a).$$

Objętość zależy tylko od długości przedziału  $[a, b]$ .

### Objętość bryły obrotowej przy obrocie wokół osi $y$

Rozważamy ponownie wykres funkcji ciągłej i nieujemnej  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$ . Chcemy obliczyć objętość  $V$  bryły otrzymanej przez obrót obszaru pomiędzy wykresem funkcji i osią  $x$ , tym razem przy obrocie wokół osi  $y$ . Dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części punktami  $x_i$  i symbolem  $V_i$  oznaczamy objętość fragmentu bryły odpowiadającej przedziałowi  $[x_{i-1}, x_i]$ . Wtedy

$$V_i \approx \pi x_i^2 f(x_i) - \pi x_{i-1}^2 f(x_i) = \pi(x_{i-1} + x_i)f(x_i)\Delta x_i \approx 2\pi x_i f(x_i)\Delta x_i.$$

Po zsumowaniu otrzymamy

$$2\pi \sum_{i=1}^n x_i f(x_i) \Delta x_i \xrightarrow{n} 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

Zatem

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

Rozważmy teraz obszar pomiędzy wykresami funkcji  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  oraz  $0 \leq f(x) \leq g(x)$ . Objętość bryły przy obrocie wokół osi  $y$  wynosi

$$V = 2\pi \int_a^b x[g(x) - f(x)] dx.$$



Zatem

$$V = 2\pi x_0 S,$$

gdzie  $S$  jest polem obracanego obszaru, a  $x_0$  jest pierwszą współrzędną środka masy. To oznacza, że reguła Guldina jest spełniona przy obrocie wokół osi  $y$ .

**Przykład.**  $y = 1 - (x - 2)^2$ ,  $1 \leq x \leq 3$ . Wtedy

$$V = 2\pi \int_1^3 x[1 - (x - 2)^2] dx.$$

### Praca

Przypuśćmy, że przy przesuwaniu obiektu wzdłuż linii prostej do punktu  $a$  do punktu  $b$  wywieramy stałą siłę  $c$ . Wtedy wykonana praca jest równa  $c(b - a)$ . W przypadku, gdy siła nie jest stała i wynosi  $f(x)$  dla  $a \leq x \leq b$ , to dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części. Praca potrzebna do przesunięcia od  $x_{i-1}$  do  $x_i$  wynosi w przybliżeniu  $f(x_i)\Delta x_i$ . Całkowita praca jest równa w przybliżeniu

$$W \approx \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i \xrightarrow{n} \int_a^b f(x) dx.$$

Przyjmujemy więc

$$W = \int_a^b f(x) dx.$$

**Przykład.** Pchamy ciekącą taczkę przez 100 m. Z powodu wycieku siła wywierana na taczkę wynosi

$$f(x) = 60 \left( 1 - \frac{x^2}{2000} \right) \text{ (N)}.$$

Zatem

$$W = \int_0^{100} 60 \left( 1 - \frac{x^2}{2000} \right) dx \text{ (J)}.$$

W 1676 Robert Hooke sformułował prawo mechaniki: siła wywierana przez sprężynę rozciągniętą o  $x$  jednostek poza naturalną długość sprężyny jest proporcjonalna do  $x$  (dla małych wartości  $x$ ). Tzn.  $g(x) = -kx$ , gdzie  $k$

jest stałym współczynnikiem. Zatem praca potrzebna do rozciągnięcia sprężyny od  $a$  do  $b$  jednostek poza naturalną długość wynosi

$$W = \int_a^b kx \, dx.$$

**Przykład.** Praca potrzebna do rozciągnięcia sprężyny o 10 cm wynosi 10 J. Ile wynosi praca potrzebna do rozciągnięcia o dodatkowe 20 cm ? Mamy

$$W_{10} = \int_0^{0,1} kx \, dx = 10.$$

Czyli  $k = 2000$ . Dalej

$$W_{10,30} = \int_{0,1}^{0,3} 2000x \, dx = 2000 \cdot 0,20,2 = 80 \text{ (J)}.$$

### Praca potrzebna do wypompowania pojemnika

Chcemy wypompować wodę z pojemnika przez odpływ znajdujący się na pewnej wysokości. Jeśli mamy podnieść warstwę wody o objętości  $V$  ( $\text{m}^3$ ) o  $l$  metrów w górę, to wykonana praca będzie równa

$$W = 9,8 \cdot 1000 \cdot Vl.$$

Zakładamy, że woda mieści się pomiędzy poziomami  $x = a$  i  $x = b$ . Dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części. Objętość warstwy wody pomiędzy poziomami  $x_{i-1}$  i  $x_i$  wynosi w przybliżeniu  $A(x_i)\Delta x_i$ , gdzie  $A(x)$  oznacza pole powierzchni przekroju pojemnika na poziomie  $x$ . Praca potrzebna do podniesienia warstwy wynosi  $W_i \approx 9800 A(x_i)\Delta x_i(l - x_i)$ . Całkowita praca wynosi w przybliżeniu

$$W \approx 9800 \sum_{i=1}^n (l - x_i)A(x_i)\Delta x_i.$$

Zatem

$$W = 9800 \int_a^b (l - x)A(x) \, dx.$$

**Przykład.** Pojemnik w kształcie dolnej półkuli o promieniu 10 m jest wypełniony wodą. Chcemy wypompować wodę przez odpływ znajdujący się 1 m nad poziomem wody. Umieszczamy skalę tak, że woda mieści się pomiędzy poziomami  $-10$  i  $0$ . Przekrój pojemnika na wysokości  $x$  jest kołem o promieniu  $r(x) = \sqrt{100 - x^2}$ . Zatem  $A(x) = \pi(100 - x^2)$ . Otrzymujemy więc

$$W = 9800 \int_{-10}^0 (1 - x)\pi(100 - x^2) dx.$$

### Objętości brył w $\mathbb{R}^3$

Przypuśćmy, że bryła mieści się pomiędzy płaszczyznami pionowymi  $x = a$  i  $x = b$ . Niech  $A(x)$  oznacza pole przekroju bryły płaszczyzną pionową w punkcie  $x$ . Aby obliczyć objętość bryły dzielimy przedział  $[a, b]$  na  $n$  równych części. Objętość fragmentu bryły pomiędzy płaszczyznami  $x = x_{i-1}$  i  $x = x_i$  wynosi w przybliżeniu  $V_i \approx A(x_i)\Delta x_i$ . Zatem całkowita objętość jest równa

$$V = \sum_{i=1}^n A(x_i)\Delta x_i.$$

Stąd

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

**Uwaga.** Ze wzoru wynika, że dwie bryły mające te same pola przekrojów na każdym poziomie mają równe objętości.

**Przykład.** Jaka jest objętość piramidy o wysokości 4 m i podstawie 3 m na 3 m? Umieszczamy oś  $x$  pionowo. Zakładamy, że podstawa piramidy znajduje się na poziomie  $-4$ , natomiast wierzchołek na poziomie  $0$ . Przekrój piramidy płaszczyzną prostopadłą do osi  $x$  na poziomie  $x$  jest kwadratem o boku  $a = -\frac{3}{4}x$ . Zatem  $A(x) = \frac{9}{16}x^2$  oraz

$$V = \frac{9}{16} \int_{-4}^0 x^2 dx = \frac{9}{16} \int_0^4 x^2 dx = 12.$$

## 8.7 Przybliżone obliczanie całek

Przy obliczaniu całek oznaczonych nie zawsze możliwe jest dokładne podanie wartości liczbowej.

**Przykłady.**

- (a) Chcemy obliczyć długość wykresu funkcji  $y = \frac{1}{3}x^3$  dla  $0 \leq x \leq 1$ .  
Wtedy

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4} dx.$$

- (b) Rozważmy elipsę o półosiach 1 i 2. Możemy użyć parametryzacji  $x = \cos t$ ,  $y = 2 \sin t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ . Wtedy długość elipsy wynosi

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 3 \cos^2 t} dt.$$

### Metoda trapezów

Mamy do obliczenia  $\int_a^b f(x) dx$ , gdzie  $f(x) \geq 0$ . Dzielimy przedział na  $n$  równych części. Kolejne punkty wykresu  $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$  i  $(x_i, f(x_i))$  łączymy odcinkiem. Otrzymujemy łamaną, która przybliża wykres funkcji. Pole pod tą łamaną przybliża pole pod wykresem funkcji, czyli liczbę  $\int_a^b f(x) dx$ . Zatem

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} \frac{b-a}{n} + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \frac{b-a}{n} + \dots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \frac{b-a}{n},$$

czyli

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2n} [f(a) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(b)].$$

**Przykład.**  $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \log 2$ . Zastosujemy metodę trapezów dla  $n = 4$ . Wtedy

$$\log 2 \approx \frac{1}{8} \left[ 1 + 2 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{2} \right] = 0,697023 \dots$$

Wiadomo, że  $\log 2 = 0,693147\dots$ , więc dokładność obliczenia jest równa około 0,4 procenta. Błąd w metodzie trapezów wynosi

$$E_n^T(f) = \left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2n} [f(a) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(b)] \right|.$$

Można udowodnić, że

$$E_n^T(f) \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

Dla funkcji  $f(x) = \frac{1}{x}$  mamy  $f''(x) = \frac{2}{x^3}$ . Zatem

$$E_4^T\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{12 \cdot 16} \cdot 2 = \frac{1}{96}.$$

### Metoda Simpsona

Thomas Simpson (1710-61) był angielskim matematykiem, który w 1743 opracował metodę przybliżonego obliczania całek. Dzielimy przedział  $[a, b]$  na parzystą liczbę  $n = 2k$  części o długości  $h = \frac{b-a}{n}$ . Trzy kolejne punkty wykresy  $(x_0, f(x_0))$ ,  $(x_1, f(x_1))$  i  $(x_2, f(x_2))$  łączymy parabolą  $p(x)$ . Mamy zatem

$$p(x) = f(x_0) \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{2h^2} - f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{h^2} + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2h^2}.$$

Całkę  $\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx$  zastępujemy przez

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)].$$

Ostatnia równość wynika ze wzorów

$$\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_1) dx = \int_{x_0}^{x_2} (x-x_1)(x-x_2) dx = \frac{2h^3}{3},$$

$$\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_2) dx = -\frac{4h^3}{3}.$$

To samo wykonujemy dla wszystkich pozostałych przedziałów postaci  $[x_2, x_4]$ ,  $[x_4, x_6]$ ,  $\dots$ ,  $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ . Tzn.

$$\int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x) dx \approx \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} p_i(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})],$$

gdzie  $p_i$  oznacza wielomian kwadratowy dla przedziału  $[x_{2i-2}, x_{2i}]$ . Reasumując otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \\ \approx \frac{b-a}{3n} [f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(b)]. \end{aligned}$$

**Przykład.** Zastosujemy metodę Simpsona dla całki  $\log 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$  przy

$n = 4$ . Wtedy

$$\log 2 \approx \frac{1}{12} \left[ 1 + 4 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 4 \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{2} \right] = 0,693253\dots$$

Wiemy, że  $\log 2 = 0,693147\dots$ , więc dokładność obliczenia jest dziesięciokrotnie lepsza niż przy metodzie trapezów, przy tej samej ilości włożonej pracy.

Można udowodnić, że błąd w metodzie Simpsona spełnia

$$E_n^S(f) \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|.$$

## 9 Twierdzenie Weierstrassa i wielomiany Bernsteina

**Twierdzenie 9.1** (Weierstrass). *Dla dowolnej funkcji ciągłej  $f(x)$  na przedziale  $[0, 1]$  można znaleźć ciąg wielomianów  $p_n(x)$  spełniający  $p_n \rightrightarrows f$  na przedziale  $[0, 1]$ . To oznacza, że dla dowolnej liczby  $\varepsilon > 0$  w pasie o promieniu  $\varepsilon$  wokół wykresu funkcji  $f(x)$  znajduje się wykres jakiegoś wielomianu.*

**Uwaga.** Teza twierdzenia jest prawdziwa dla dowolnego przedziału  $[a, b]$ . Rzeczywiście, dla  $f \in C[a, b]$  określamy  $\tilde{f}(x) = f((b-a)x + a)$ . Wtedy  $\tilde{f} \in C[0, 1]$ . Jeśli  $\tilde{p}_n \rightrightarrows \tilde{f}$ , to  $p_n \rightrightarrows f$ , gdzie  $p_n(x) = \tilde{p}_n\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ .

*Dowód* (wg S. Bernsteina (1880-1968)). Dla funkcji ciągłej  $f(x)$  i liczby  $n$  określamy wielomiany Bernsteina wzorem

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

Mamy

$$B_n(1)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = [x + (1-x)]^n = 1.$$

Dalej

$$\begin{aligned} B_n(x)(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = x \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^{k-1} (1-x)^{(n-1)-(k-1)} \\ &\stackrel{=}{=} x \sum_{l=0}^{n-1} \binom{n-1}{l} x^l (1-x)^{(n-1)-l} = x B_{n-1}(1)(x) = x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_n(x^2)(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \binom{n-1}{k-1} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{n} \binom{n-1}{k-1} x^k (1-x)^{n-k} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{n-1}{n} x B_{n-1}(x)(x) + \frac{x}{n} B_{n-1}(1) = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{1}{n} x = x^2 + \frac{x-x^2}{n}. \end{aligned}$$

Rozważamy funkcję ciągłą  $f$  na  $[0, 1]$ . Ustalamy liczbę  $\varepsilon > 0$ . Z jednostajnej ciągłości można znaleźć liczbę  $\delta > 0$  taką, że

$$|t-s| < \delta \implies |f(t) - f(s)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ustalmy punkt  $x$  w przedziale  $[0, 1]$ . Liczby naturalne  $N_n = \{0, 1, 2, \dots, n\}$  podzielimy na dwa podzbiory

$$\begin{aligned} A &= \{k \in N_n : \left|\frac{k}{n} - x\right| < \delta\}, \\ B &= N_n \setminus A. \end{aligned}$$

Wtedy

$$\begin{aligned}
 & |B_n(f)(x) - f(x)| \\
 &= \left| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f(x) x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &= \left| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left[ f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \underbrace{\sum_{k \in A} \binom{n}{k} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| x^k (1-x)^{n-k}}_{S_A} + \underbrace{\sum_{k \in B} \binom{n}{k} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| x^k (1-x)^{n-k}}_{S_B}.
 \end{aligned}$$

Dalej

$$S_A \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k \in A} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Niech  $M = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$ . Wtedy

$$\begin{aligned}
 S_B &\leq 2M \sum_{k \in B} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{k \in B} \binom{n}{k} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \frac{2M}{\delta^2} [x^2 B_n(1) - 2x B_n(x)(x) + B_n(x^2)(x)] \\
 &= \frac{2M}{\delta^2} \left[ x^2 - 2x^2 + x^2 + \frac{x(1-x)}{n} \right] = \frac{2M}{\delta^2 n} (x - x^2) \leq \frac{M}{2\delta^2 n}.
 \end{aligned}$$

Dla  $n > \frac{M}{\delta^2 \varepsilon}$  mamy  $S_B < \varepsilon/2$ . Zatem  $|B_n(f)(x) - f(x)| < \varepsilon$  dla odpowiednio dużych wartości  $n$ .  $\square$

**Uwaga.** Dla funkcji  $f$  i liczby  $x$  wielkość  $B_n(f)(x)$  jest średnią ważoną liczb  $f\left(\frac{k}{n}\right)$ , dla  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ , ze współczynnikami  $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ . Suma współczynników jest równa 1. Sprawdźmy, który współczynnik jest największy. W tym celu rozwiązujemy nierówność

$$\binom{n}{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-(k-1)} \leq \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$



Po prostych przekształceniach otrzymujemy warunek równoważny

$$\frac{k}{n+1} \leq x.$$

Zatem największy współczynnik odpowiada wartości  $k_0$ , dla której

$$\frac{k_0}{n+1} \leq x < \frac{k_0+1}{n+1}.$$

Zauważmy, że

$$\frac{k_0}{n+1} < \frac{k_0}{n} < \frac{k_0+1}{n+1}.$$

Zatem

$$\left| \frac{k_0}{n} - x \right| < \frac{1}{n+1}.$$

**Przykład.** Prawdopodobieństwo sukcesu w jednej próbie wynosi  $p$ ,  $0 < p <$

1. Wykonujemy próbę  $n$  razy. Przy  $n$  próbach wygrana wynosi  $f\left(\frac{k}{n}\right)$ , gdzie  $k$  jest liczbą sukcesów, a  $f$  jest ustaloną funkcją ciągłą na  $[0, 1]$ . Np. jeśli  $f\left(\frac{1}{5}\right) = 10$ , to przy 12 sukcesach w 60 próbach, wypłata wynosi 10. Wartość oczekiwana wygranej przy  $n$  próbach wyraża się wzorem

$$E_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) p^k (1-p)^{n-k} = B_n(f)(p) \xrightarrow[n]{} f(p).$$

**Przykład.** Rzucamy kostką do gry. Sukcesem jest wypadnięcie szóstki. Funkcja wypłaty  $f(x)$  spełnia

$$f(1) = 10^6, \quad f\left(\frac{1}{6}\right) = -0,01.$$

Czy gra jest opłacalna przy dużej liczbie rzutów ?