

Analiza funkcjonalna II

Ryszard Szwarc

Wykład prowadzony w semestrze letnim 2008

Opracowany na podstawie notatek Wiktora Malinowskiego

Wrocław 2010

Spis treści

1	Operatory ograniczone na przestrzeni Banacha	2
2	Operatory dodatnie	16
3	Zbieżność operatorów	25
4	Operatory zwarte	28
5	Operatory unitarne	45
6	Zadania	54

1 Operatory ograniczone na przestrzeni Banacha

Niech $T : X \rightarrow X$ będzie ciągłym operatorem liniowym na przestrzeni Banacha X . Przypominamy, że normę operatora T określamy wzorem

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\| : \|x\| \leq 1\}.$$

Symbolem $B(X) := B(X, X)$ oznaczamy przestrzeń Banacha wszystkich ciągłych operatorów liniowych z X w X .

Przykład 1.1. Rozważmy odwzorowanie liniowe $T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$. Chcemy zbadać dla jakich zespolonych liczb λ operator (tzn. macierz) $\lambda I - T$ jest odwracalny. Jak wiadomo z kursu algebry liniowej warunkiem równoważnym jest $\det(\lambda I - T) \neq 0$. Liczby λ , dla których ostatni wyznacznik zeruje się nazywamy wartościami własnymi. Wiadomo, że jeśli $\det(\lambda I - T) = 0$, to istnieje niezerowy wektor $v \in \mathbb{C}^n$ taki, że $Tv = \lambda v$. Tzn. macierz $\lambda I - T$ nie jest różnowartościowa. Innym równoważnym warunkiem jest, że $\text{Im}(\lambda I - T) \subsetneq \mathbb{C}^n$.

Definicja 1.2. Zbiorem **rezolwenty** $\rho(T)$ nazywamy zbiór tych liczb zespolonych λ , dla których operator $\lambda I - T$ jest odwracalny. Dopelnienie $\mathbb{C} \setminus \rho(T)$ nazywamy **spektrum** operatora T i oznaczamy symbolem $\sigma(T)$.

Definicja 1.3. *Spektrum punktowym $\sigma_p(T)$ nazywamy zbiór wartości własnych operatora T , tzn. zbiór liczb zespolonych λ takich, że $\lambda I - T$ nie jest operatorem różnowartościowym. Wtedy istnieje niezerowy element x w X taki, że $Tx = \lambda x$.*

Definicja 1.4. *Spektrum resztowym $\sigma_r(T)$ nazywamy zbiór liczb zespolonych λ , dla których obraz $\text{Im}(\lambda I - T)$ nie jest gęstą podprzestrzenią w X .*

Przykład 1.5. Rozważmy przestrzeń

$$X = \ell^2 = \{(x_n)_{n=0}^{\infty} : \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 < \infty\}.$$

Dla $x = (x_n)_{n=0}^{\infty}$ określmy operator S wzorem

$$(Sx)_n = \begin{cases} x_{n-1} & n \geq 1 \\ 0 & n = 0. \end{cases}$$

Tzn.

$$S(x_0, x_1, x_2, \dots) = (0, x_0, x_1, x_2, \dots).$$

Mamy $\|Sx\|_2 = \|x\|_2$, zatem $\|S\| = 1$. To oznacza, że operator S jest izometrią.

Sprawdzamy różnowartościowość operatora $\lambda I - S$. W tym celu rozwiązujemy równanie $(\lambda I - S)x = 0$, czyli $Sx = \lambda x$. Otrzymujemy nieskończony ciąg równań

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda x_0 \\ x_{n-1} &= \lambda x_n, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Jeśli $\lambda = 0$, to $x_n = 0$ dla wszystkich n . Załóżmy, że $\lambda \neq 0$. Wtedy $x_0 = 0$ oraz

$$x_n = \lambda^{-1} x_{n-1} = \lambda^{-n} x_0 = 0.$$

To oznacza, że operator S nie posiada wartości własnych.

Zbadamy teraz $\sigma_r(S)$. Załóżmy, że obraz $\text{Im}(\lambda I - S)$ nie jest gęsty w ℓ^2 . Równoważnie istnieje niezerowy element $y \in \ell^2$ taki, że $y \perp \text{Im}(\lambda I - S)$. Niech $V = \text{lin}\{e_0, e_1, e_2, \dots\}$, gdzie $e_k = (0, \dots, 0, \underset{k}{1}, 0, \dots)$. Przestrzeń V jest gęsta w ℓ^2 , tzn. $\overline{V} = \ell^2$. Zatem

$$(\lambda I - S)(V) \subset \text{Im}(\lambda I - S) = (\lambda I - S)(\ell^2) = (\lambda I - S)(\overline{V}) \subset \overline{(\lambda I - S)(V)}.$$

Skorzystalismy z własności znanej z kursu topologii, że obraz przez odwzorowanie ciągle domknięcia zbioru jest zawarty w domknięciu obrazu tego zbioru. To oznacza, że

$$\overline{\text{Im}(\lambda I - S)} = \overline{(\lambda I - S)(V)}.$$

Otrzymujemy, że warunek $y \perp \text{Im}(\lambda I - S)$ jest równoważny z warunkiem $y \perp (\lambda I - S)(V)$. Ostatni warunek implikuje, że $y \perp (\lambda I - S)(e_k)$ dla $k = 0, 1, 2, \dots$. Rozwiązujemy układ równań

$$\langle y, (\lambda I - S)(e_k) \rangle = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Zatem

$$\langle y, (\lambda e_k - e_{k+1}) \rangle = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Dalej

$$y_{k+1} = \bar{\lambda} y_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Otrzymujemy ostatecznie

$$y_k = \bar{\lambda}^k y_0, \quad k \geq 1.$$

Jeśli $y_0 = 0$, to $y = 0$. Jeśli $y_0 \neq 0$, to $y \in \ell^2$ wtedy i tylko wtedy, gdy $|\lambda| < 1$. Zatem

$$\sigma_r(S) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\}.$$

Pozostaje zbadać liczby λ spełniające $|\lambda| \geq 1$. Sprawdzimy, kiedy $\lambda I - S$ jest „na”. W tym celu dla $y \in \ell^2$ rozwiązujemy równanie $(I - S)x = y$. Wtedy

$$\begin{aligned} \lambda x_0 &= y_0, \\ \lambda x_n - x_{n-1} &= y_n, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Stąd otrzymujemy

$$x_n = \lambda^{-1} y_n + \lambda^{-1} x_{n-1}.$$

Zatem

$$x_n = \lambda^{-1} y_n + \lambda^{-2} y_{n-1} + \dots + \lambda^{-n-1} y_0.$$

Niech $y = e_0$, gdzie

$$e_0 = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ 0, & n \geq 1. \end{cases} \quad (1.1)$$

Wtedy

$$x_n = \lambda^{-n-1}, \quad n \geq 0.$$

Dla $|\lambda| = 1$ ciąg (x_n) nie należy do ℓ^2 . Zatem

$$\sigma(S) \supseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\}.$$

Niech $|\lambda| > 1$. Sprawdzamy normę rozwiązania x z (1.1).

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^n \lambda^{-k-1} y_{n-k} \right|^2 \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k,l=0}^n |\lambda|^{-k-1} |y_{n-k}| |\lambda|^{-l-1} |y_{n-l}| \\ &= \sum_{k,l=0}^{\infty} |\lambda|^{-k-1} |\lambda|^{-l-1} \sum_{n=\max(k,l)}^{\infty} |y_{n-k}| |y_{n-l}| \\ &\leq \sum_{k,l=0}^{\infty} |\lambda|^{-k-1} |\lambda|^{-l-1} \left(\sum_{n=\max(k,l)}^{\infty} |y_{n-k}|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=\max(k,l)}^{\infty} |y_{n-l}|^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \sum_{k,l=0}^{\infty} |\lambda|^{-k-1} |\lambda|^{-l-1} \|y\|_2^2 = \left(\frac{|\lambda|}{|\lambda|-1} \right)^2 \|y\|_2^2. \end{aligned}$$

Zatem

$$\|(\lambda I - S)^{-1} y\|_2 = \|x\|_2 \leq \frac{|\lambda|}{|\lambda|-1} \|y\|_2,$$

czyli

$$\|(\lambda I - S)^{-1}\| \leq \frac{|\lambda|}{|\lambda|-1}.$$

Uwaga 1.6. 1) W przykładzie można zauważyć, że jeśli $\lambda \in \sigma(S)$, to $|\lambda| \leq \|S\|$. Ta własność zachodzi dla każdego ograniczonego operatora (por. Wniosek 1.8).

2) Zbiór $\sigma(S)$ jest domknięty i również ta własność jest spełniona dla dowolnego ograniczonego operatora liniowego (por. Twierdzenie 1.7).

Twierdzenie 1.7. Załóżmy, że ograniczony operator liniowy $T : X \rightarrow X$, gdzie X jest przestrzenią Banacha, spełnia $\|T\| < 1$. Wtedy operator $I - T$ jest odwracalny oraz

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n.$$

Dowód. Szereg $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ jest bezwzględnie zbieżny, bo

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|T\|^n = \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

Dzięki zupełności przestrzeni X symbol $A = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$ określa ograniczony operator liniowy. Zauważmy, że

$$AT = TA = \sum_{n=0}^{\infty} T^{n+1} = A - I.$$

Zatem

$$A(I - T) = (I - T)A = I.$$

Stąd $A = (I - T)^{-1}$. □

Wniosek 1.8. Niech X będzie przestrzenią Banacha oraz $T \in B(X)$. Jeśli $|\lambda| > \|T\|$, to operator $\lambda I - T$ jest odwracalny, tzn. $\lambda \in \rho(T)$.

Dowód. Mamy

$$\lambda I - T = \lambda(I - \lambda^{-1}T), \quad \|\lambda^{-1}T\| < 1.$$

Z poprzedniego twierdzenia operator $I - \lambda^{-1}T$ jest więc odwracalny. Zatem odwracalny jest też $\lambda I - T$. □

Uwaga 1.9. Z twierdzenia wynika, że dla $\|T\| < 1$ mamy

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

Zatem przy założeniu $\|T\| < |\lambda|$ otrzymujemy

$$\|(\lambda I - T)^{-1}\| = |\lambda|^{-1} \|(I - \lambda^{-1}T)^{-1}\| \leq |\lambda|^{-1} \frac{1}{1 - |\lambda|^{-1}\|T\|} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}.$$

Twierdzenie 1.10. Dla $T \in B(X)$, gdzie X jest przestrzenią Banacha, zbiór rezolwenty $\rho(T)$ jest otwartym podzbiorem w \mathbb{C} . Ponadto funkcja

$$R_z(T) = (zI - T)^{-1}, \quad z \in \rho(T)$$

jest analitycznym odwzorowaniem zbioru $\rho(T)$ w $B(X)$, tzn. w otoczeniu każdego punktu z_0 funkcja $R_z(T)$ przedstawia się za pomocą bezwzględnie zbieżnego szeregu potęgowego postaci

$$R_z(T) = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n A_n, \quad A_n \in B(X).$$

Zachodzi też wzór

$$R_z(T) - R_w(T) = -(z - w)R_z(T)R_w(T). \quad (1.2)$$

Uwaga 1.11. Wzór (1.2) można kojarzyć z tożsamością

$$\frac{1}{z - t} - \frac{1}{w - t} = -\frac{z - w}{(z - t)(w - t)}.$$

Dowód. Niech $z_0 \in \rho(T)$. Pokażemy, że liczby z leżące blisko z_0 należą do $\rho(T)$. Mamy

$$zI - T = (z_0I - T) - (z_0 - z)I = (z_0I - T)[I - (z_0 - z)(z_0I - T)^{-1}]. \quad (1.3)$$

Założmy, że

$$|z - z_0| < \frac{1}{\|(z_0I - T)^{-1}\|}.$$

Wtedy

$$\|(z - z_0)(z_0I - T)^{-1}\| < 1.$$

Z Twierdzenia 1.7 operator $I - (z_0 - z)(z_0I - T)^{-1}$ jest odwracalny. Zatem ze wzoru (1.3) operator $zI - T$ jest odwracalny jako złożenie dwu operatorów odwracalnych. Czyli $z \in \rho(T)$, więc zbiór $\rho(T)$ jest otwarty.

Ze wzoru (1.3) i Twierdzenia 1.7 otrzymujemy

$$\begin{aligned} R_z(T) &= (zI - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (z_0 - z)^n (z_0I - T)^{-n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n A_n, \quad A_n = (-1)^n (z_0I - T)^{-n-1}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Obliczamy

$$\begin{aligned} R_z(T) - R_w(T) &= (zI - T)^{-1} - (wI - T)^{-1} \\ &= (zI - T)^{-1}[(wI - T) - (zI - T)](wI - T)^{-1} \\ &= -(z - w)(zI - T)^{-1}(wI - T)^{-1} = -(z - w)R_z(T)R_w(T) \end{aligned}$$

□

Dla $z, z_0 \in \rho(T)$ na podstawie (1.4) mamy

$$R_z(T) - R_{z_0}(T) = \sum_{n=0}^{\infty} (z_0 - z)^n (z_0 I - T)^{-n-1} - (z_0 I - T)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (z_0 - z)^n (z_0 I - T)^{-n-1}.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \|R_z(T) - R_{z_0}(T)\| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} |z - z_0|^n \|(z_0 I - T)^{-1}\|^{n+1} \\ &= \frac{|z - z_0| \|R_{z_0}(T)\|^2}{1 - |z - z_0| \|R_{z_0}(T)\|} \end{aligned}$$

przy założeniu, że $|z - z_0| < \|R_{z_0}(T)\|^{-1}$. Z obliczeń wynika, że

$$\lim_{z \rightarrow z_0} R_z(T) = R_{z_0}(T).$$

Zatem, korzystając z (1.2), otrzymujemy

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{R_z(T) - R_{z_0}(T)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} (-1) R_{z_0}(T) R_z(T) = -R_{z_0}(T)^2.$$

To oznacza, że funkcja $z \mapsto R_z(T)$ posiada pochodną zespoloną jako funkcja z podzbioru $\rho(T)$ w $B(X)$.

Twierdzenie 1.12. *Niech T będzie ograniczonym operatorem liniowym na przestrzeni Banacha X . Wtedy spektrum $\sigma(T)$ jest niepustym i domkniętym podzbiorem w \mathbb{C} .*

Dowód. Domkniętość zbioru wynika z otwartości zbioru rezolwenty. Załóżmy, że spektrum $\sigma(T)$ jest zbiorem pustym. Wtedy funkcja $R_z(T)$ jest określona na całej płaszczyźnie zespolonej. Dla ustalonego elementu $x \in X$ oraz funkcjonału $x^* \in X^*$ rozważamy funkcję

$$f(z) = x^*(R_z(T)x).$$

Funkcja $f(z)$ jest holomorficzna w całej płaszczyźnie zespolonej. Z zadania 18 mamy, że $\|R_z(T)\| \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$. Wtedy $f(z) \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$. Funkcja $f(z)$ jest zatem ograniczona w \mathbb{C} . Na podstawie twierdzenia Liouville'a funkcja f jest stała, czyli $f(z) \equiv 0$. Stąd $x^*(R_z(T)x) = 0$ dla dowolnego funkcjonału x^* , czyli $R_z(T)x = 0$ dla dowolnego elementu $x \in X$. Zatem $R_z(T) = 0$, co stoi w sprzeczności z odwracalnością operatora $R_z(T)$. \square

Uwaga 1.13. Dla $X = \mathbb{C}^n$ operatory $T : X \rightarrow X$ utożsamiamy z macierzami wymiaru $n \times n$. Wtedy za zasadniczego twierdzenia algebry mamy $\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda I - T) \neq 0\} \neq \emptyset$.

Definicja 1.14. *Promieniem spektralnym operatora $T \in B(X)$ nazywamy liczbę*

$$r(T) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Twierdzenie 1.15. *Dla $T \in B(X)$, gdzie X jest przestrzenią Banacha, istnieje granica $\lim_n \|T^n\|^{1/n}$ oraz granica ta jest równa $r(T)$. Ponadto, jeśli X jest przestrzenią Hilberta oraz $T^* = T$, to $r(T) = \|T\|$.*

Dowód. Jeśli $T^{n_0} = 0$ dla pewnej liczby n_0 , to $T^n = 0$ dla $n \geq n_0$. Wtedy $\lim_n \|T^n\|^{1/n} = 0$. Załóżmy zatem, że $T^n \neq 0$ dla wszystkich potęg n . Oznaczmy $a_n = \ln \|T^n\|$. Zauważmy, że

$$a_{n+m} \leq a_n + a_m.$$

Rzeczywiście

$$\begin{aligned} a_{n+m} = \ln \|T^{n+m}\| &= \ln \|T^n T^m\| \leq \ln \|T^n\| \|T^m\| \\ &= \ln \|T^n\| + \ln \|T^m\| = a_n + a_m. \end{aligned}$$

Istnienie granicy ciągu a_n wynika z następnego lematu.

Lemat 1.16. *Jeśli ciąg liczb rzeczywistych a_n spełnia warunek $a_{n+m} \leq a_n + a_m$, to istnieje granica (być może niewłaściwa) ciągu a_n/n oraz*

$$\lim_n \frac{a_n}{n} = \inf_n \frac{a_n}{n}.$$

Dowód. Mamy

$$a_{np+r} \leq a_{np} + a_r \leq na_p + a_r$$

dla dowolnych liczb naturalnych n , p i r . Ustalmy liczbę p . Każdą liczbę m można zapisać w postaci $m = np + r$, gdzie $0 \leq r \leq p - 1$. Zatem

$$\frac{a_m}{m} = \frac{a_{np+r}}{np+r} \leq \frac{n}{np+r} a_p + \frac{1}{np+r} a_r.$$

Gdy $m \rightarrow \infty$, to $n \rightarrow \infty$, więc

$$\limsup \frac{a_m}{m} \leq \frac{a_p}{p}.$$

Ponieważ p jest dowolną liczbą naturalną, to

$$\limsup \frac{a_m}{m} \leq \inf \frac{a_p}{p} \leq \liminf \frac{a_m}{m}.$$

Stąd granice górna i dolna muszą być sobie równe. \square

Z lematu wynika, że

$$\lim_n \|T^n\|^{1/n} = \inf_n \|T^n\|^{1/n}.$$

Założmy, że $|z| > \inf_n \|T^n\|^{1/n}$. Pokażemy, że wtedy operator $zI - T$ jest odwracalny. Istotnie, dla pewnej liczby n mamy $|z| > \|T^n\|^{1/n}$. Stąd $|z|^n > \|T^n\|$. Wtedy

$$z^n I - T^n = z^n \left(I - \frac{1}{z^n} T^n \right)$$

jest operatorem odwracalnym, bo $\|z^{-n} T^n\| < 1$. Z drugiej strony mamy

$$\begin{aligned} z^n I - T^n &= (zI - T)S = S(zI - T), \\ \text{dla } S &= z^{n-1}I + z^{n-2}T + \dots + zT^{n-2} + T^{n-1}. \end{aligned}$$

Odwracalność operatora $zI - T$ wynika z prostego algebraicznego faktu, którego dowód pozostawiamy czytelnikowi.

Fakt 1.17. *Założmy, że w półgrupie A z jednością, element a jest odwracalny oraz $a = bc = cb$ dla pewnych elementów b i c . Wtedy elementy b i c też są odwracalne.*

Otrzymaliśmy, że $z \notin \sigma(T)$. Zatem

$$\sigma(T) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \inf_n \|T^n\|^{1/n}\}.$$

To oznacza, że $r(T) \leq \inf_n \|T^n\|^{1/n}$.

Niech teraz $r > r(T)$. Tzn. operator $R_z(T)$ istnieje dla $|z| \geq r$. Ustalmy element $x \in X$ i funkcjonał $x^* \in X^*$. Funkcja

$$z \mapsto x^*(R_z(T)x)$$

jest holomorficzną dla $|z| > r(T)$. Zatem ta funkcja jest holomorficzną w pierścieniu $r \leq |z| \leq s$. Zatem

$$I_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} x^*(R_z(T)x) z^n dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=s} x^*(R_z(T)x) z^n dz.$$

Rozważmy $s > \|T\|$. Wtedy dla $|z| = s$ możemy rozwinąć $R_z(T)$ w absolutnie zbieżny szereg

$$R_z(T) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-(k+1)} T^k,$$

Zatem

$$I_n = \sum_{k=0}^{\infty} x^*(T^k x) \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=s} z^{n-(k+1)} dz = x^*(T^n x),$$

bo tylko jeden składnik (dla $k = n$) jest niezerowy.

Otrzymujemy zatem

$$x^*(T^n x) = I_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} x^*(R_z(T)x) z^n dz.$$

Dalej

$$|x^*(T^n x)| \leq \frac{1}{2\pi} 2\pi r r^n \max_{|z|=r} \|R_z(T)\| = r^{n+1} \max_{|z|=r} \|R_z(T)\|.$$

Ostatecznie

$$\|T^n\| = \sup_{\substack{\|x^*\| \leq 1 \\ \|x\| \leq 1}} |x^*(T^n x)| \leq r^{n+1} \max_{|z|=r} \|R_z(T)\|.$$

Stąd

$$\lim_n \|T^n\|^{1/n} \leq r.$$

Ponieważ r było dowolną liczbą większą do $r(T)$, to

$$\lim_n \|T^n\|^{1/n} \leq r(T).$$

Niech $T \in B(\mathcal{H})$. Dla $x \in \mathcal{H}$ mamy

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle \leq \|T^*Tx\| \|x\| \leq \|T^*T\| \|x\|^2.$$

Zatem

$$\|T^2\| \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2.$$

Stąd $\|T^*T\| = \|T\|^2$. Jeśli $T^* = T$, to $\|T^2\| = \|T\|^2$. Potęgi operator T są również samosprężone, więc

$$\|T^{2^n}\| = \|T^{2^{n-1}}\|^2 = \|T^{2^{n-2}}\|^4 = \dots = \|T\|^{2^n}.$$

Czyli

$$\|T^{2^n}\|^{1/2^n} = \|T\|.$$

Przechodząc do granicy otrzymamy $r(T) = \|T\|$. \square

Wniosek 1.18. *Jeśli $T \in B(\mathcal{H})$ jest operatorem normalnym, tzn. $T^*T = TT^*$, to $r(T) = \|T\|$.*

Dowód. Wykonujemy obliczenia

$$\|T^{2^n}\|^2 = \|(T^{2^n})^*T^{2^n}\| = \|(T^*)^{2^n}T^{2^n}\| = \|(T^*T)^{2^n}\| = \|T^*T\|^{2^n} = \|T\|^{2^{n+1}}$$

Zatem

$$\|T^{2^n}\|^{1/2^n} = \|T\|.$$

Przechodząc do granicy otrzymujemy tezę. \square

Wniosek 1.19. *Jeśli $T \in B(\mathcal{H})$ jest operatorem normalnym, to $\|T^n\| = \|T\|^n$.*

Dowód. Mamy

$$\|T^n\| = r(T^n) = \lim_k \|T^{nk}\|^{1/k} = (\lim_k \|T^{nk}\|^{1/nk})^n = r(T)^n = \|T\|^n.$$

\square

Przykład 1.20. Rozważmy operator $T : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1)$ zadany wzorem

$$(Tf)(x) = \int_0^x f(y) dy.$$

Obraz $\text{Im } T$ jest zawarty w $C[0, 1]$. Istotnie, z nierówności Schwarz'a mamy dla $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1$

$$\begin{aligned} |(Tf)(x_2) - (Tf)(x_1)| &= \left| \int_{x_1}^{x_2} f(y) dy \right| = \left| \int_0^1 f(y) \chi_{[x_1, x_2]}(y) dy \right| \\ &\leq \|f\|_2 \|\chi_{[x_1, x_2]}\|_2 = \sqrt{x_2 - x_1} \|f\|_2. \end{aligned}$$

Zatem T nie jest operatorem odwracalnym. Obliczmy T^2 .

$$(T^2 f)(x) = \int_0^x (Tf)(y) dy = \int_0^x \left(\int_0^y f(z) dz \right) dy \\ \int_0^x f(z) \left(\int_z^x dy \right) dz = \int_0^x (x-z)f(z) dz.$$

Udowodnimy przez indukcję, że

$$(T^n f)(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-y)^{n-1} f(y) dy. \quad (1.5)$$

Zakładamy, że wzór jest prawdziwy i sprawdzamy następną potęgę.

$$(T^{n+1} f)(x) = \int_0^x (T^n f)(y) dy = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x \left(\int_0^y (y-z)^{n-1} f(z) dz \right) dy \\ \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x f(z) \left(\int_z^x (y-z)^{n-1} dy \right) dz = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-z)^n f(z) dz.$$

Korzystając z (1.5) otrzymujemy

$$\|T^{n+1} f\|_2^2 = \int_0^1 |(T^{n+1} f)(x)|^2 dx = \frac{1}{(n!)^2} \int_0^1 \left| \int_0^x (x-y)^n f(y) dy \right|^2 dx \\ \leq \frac{1}{(n!)^2} \int_0^1 \left(\int_0^x |f(y)|^2 dy \right) \left(\int_0^x (x-y)^{2n} dy \right) dx \leq \|f\|_2^2 \frac{1}{(n!)^2} \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} dx \\ = \frac{1}{(n!)^2 (2n+1)(2n+2)} \|f\|_2^2 \leq \frac{1}{((n+1)!)^2} \|f\|_2^2.$$

Zatem $\|T^{n+1}\| \leq \frac{1}{(n+1)!}$. Stąd $\lim_n \|T^n\|^{1/n} = 0$. W rezultacie $\sigma(T) = \{0\}$.

Twierdzenie 1.21. Dla $T \in B(\mathcal{H})$ mamy

$$\sigma(T^*) = \overline{\sigma(T)} := \{\bar{z} : z \in \sigma(T)\}.$$

Dowód. Wiemy, że jeśli operator $A \in B(\mathcal{H})$ jest odwracalny, to A^* jest też odwracalny oraz $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. Niech $z \notin \sigma(T)$. Tzn. $zI - T$ jest operatorem odwracalnym. Zatem $\bar{z}I - T^*$ jest też odwracalny, czyli $\bar{z} \notin \sigma(T^*)$. To daje

$$\sigma(T^*) \subseteq \overline{\sigma(T)}.$$

Stąd wynika, że

$$\sigma(T) = \sigma((T^*)^*) \subseteq \overline{\sigma(T^*)},$$

czyli

$$\overline{\sigma(T)} \subseteq \sigma(T^*).$$

□

Wniosek 1.22. Niech $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ będzie operatorem unitarnym, tzn. $U^*U = UU^* = I$, lub równoważnie $U^* = U^{-1}$. Wtedy $\sigma(U) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Dowód. Mamy

$$\|U\|^2 = \|U^*U\| = \|I\| = 1.$$

Zatem $\|U\| = 1$, skąd wynika $\sigma(U) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$. Niech $|z| < 1$. Chcemy pokazać, że $zI - U$ jest odwracalny. Zauważmy, że

$$zI - U = zU^*U - U = -(I - zU^*)U.$$

U jest odwracalny. Operator $I - zU^*$ jest również odwracalny, bo $\|zU^*\| = |z| < 1$. Stąd $zI - U$ jest odwracalny, co dowodzi tezy wniosku. □

Uwaga 1.23. Jeśli U jest unitarny, to $\|Ux\| = \|x\|$ dla $x \in \mathcal{H}$. Rzeczywiście

$$\|Ux\|^2 = \langle Ux, Ux \rangle = \langle U^*Ux, x \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

Podobnie $\|U^*x\| = \|x\|$.

Twierdzenie 1.24. Jeśli operator $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ jest normalny, to $\|Tx\| = \|T^*x\|$ dla $x \in \mathcal{H}$.

Dowód. Mamy

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle = \langle TT^*x, x \rangle = \langle T^*x, T^*x \rangle = \|T^*x\|^2.$$

□

Wniosek 1.25. *Jeśli T jest operatorem normalnym, to*

$$\|(\lambda I - T)x\| = \|(\bar{\lambda}I - T^*)x\|$$

dla $x \in \mathcal{H}$. Ponadto, jeśli λ jest wartością własną operatora T , to $\bar{\lambda}$ jest wartością własną operatora T^* , z tym samym wektorem własnym.

Dowód. Z założenia wynika, że $\lambda I - T$ jest operatorem normalnym, więc możemy zastosować poprzednie twierdzenie. Druga część wniosku wynika z obserwacji, że $Tx = \lambda x$ oznacza $(\lambda I - T)x = 0$. \square

Twierdzenie 1.26. *Wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym operatora normalnego są ortogonalne.*

Dowód. Niech $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ będzie operatorem normalnym oraz $Tx = \lambda x$ i $Ty = \mu y$ dla $\lambda \neq \mu$ oraz pewnych niezerowych wektorów $x, y \in \mathcal{H}$. Obliczamy

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle = \langle x, \bar{\mu}y \rangle = \bar{\mu} \langle x, y \rangle.$$

Zatem $\langle x, y \rangle = 0$. \square

Wniosek 1.27. *Niech T będzie operatorem normalnym na $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. Wtedy istnieje baza ortonormalna v_1, v_2, \dots, v_n w \mathbb{C}^n złożona z wektorów własnych operatora T .*

Uwaga 1.28. Teza wniosku oznacza, że w bazie wektorów $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ macierz operatora T ma postać diagonalną z liczbami $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ na przekątnej.

Dowód. Utożsamimy operator T z macierzą w standardowej bazie przestrzeni \mathbb{C}^n . Rozwiązujemy równanie

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - T)$$

ze względu na λ . Wtedy $p(z)$ jest wielomianem stopnia n , więc na podstawie Zasadniczego Twierdzenia Algebry istnieje rozwiązanie $\lambda_1 \in \mathbb{C}$. Wtedy λ_1 jest wartością własną odpowiadającą pewnemu wektorowi $v_1 \in \mathbb{C}^n$. Tzn. $Tv_1 = \lambda_1 v_1$. Rozkładamy przestrzeń na

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{C}v_1 \oplus \mathcal{M}_1, \quad \text{gdzie } \mathcal{M}_1 = \{v_1\}^\perp.$$

Mamy $\mathcal{M}_1 \simeq \mathbb{C}^{n-1}$ oraz $T(\mathcal{M}_1) \subseteq \mathcal{M}_1$. Rzeczywiście, niech $v \in \mathcal{M}_1$. Chcemy sprawdzić, czy $Tv \in \mathcal{M}_1$. W tym celu obliczamy

$$\langle Tv, v_1 \rangle = \langle v, T^*v_1 \rangle = \langle v, \overline{\lambda_1}v_1 \rangle = \overline{\lambda_1}\langle v, v_1 \rangle = 0.$$

Traktujemy T jako operator na $\mathcal{M}_1 \simeq \mathbb{C}^{n-1}$. Powtarzamy całe wcześniejsze rozumowanie, aby znaleźć wektor własny v_2 i wartość własną λ_2 i następną podprzestrzeń \mathcal{M}_2 . Itd. \square

Twierdzenie 1.29. *Dla ograniczonego operatora samosprzężonego w przestrzeni Hilberta spektrum jest zawarte w osi rzeczywistej.*

Dowód. Załóżmy, że $z = \lambda + \mu i$, gdzie $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, oraz $\mu \neq 0$. Pokażemy, że operator $zI - T$ jest odwracalny, tzn. $z \notin \sigma(T)$. Wykonujemy obliczenia

$$\begin{aligned} \|(zI - T)v\|^2 &= \langle (zI - T)v, (zI - T)v \rangle = \langle (\overline{z}I - T)(zI - T)v, v \rangle \\ &= \langle (\lambda^2 + \mu^2)I - 2\lambda T + T^2)v, v \rangle = \langle [(\lambda I - T)^2 + \mu^2 I]v, v \rangle \\ &= \langle (\lambda I - T)v, (\lambda I - T)v \rangle + \mu^2 \langle v, v \rangle \geq \mu^2 \|v\|^2. \end{aligned}$$

Otrzymaliśmy więc

$$\|(zI - T)v\| \geq |\mu| \|v\|. \quad (1.6)$$

To oznacza, że operator $zI - T$ jest różnowartościowy oraz, że obraz $\text{Im}(zI - T)$ jest domknięty. Korzystając z zadania 83 [[5]] mamy

$$\mathcal{H} = \ker(\overline{z}I - T) \oplus \text{Im}(zI - T).$$

Pierwsza podprzestrzeń jest zerowa, bo $\overline{z} \notin \mathbb{R}$. Zatem $\mathcal{H} = \text{Im}(zI - T)$, tzn. $zI - T$ jest operatorem „1-1” i „na”. Stąd $zI - T$ jest odwracalny algebraicznie. Ponadto z (1.6) wynika ograniczoność operatora odwrotnego. \square

2 Operatory dodatnie

Definicja 2.1. *Operator $A \in B(\mathcal{H})$ nazywamy dodatnim, jeśli $\langle Av, v \rangle \geq 0$ dla wszystkich wektorów $v \in \mathcal{H}$. Piszemy wtedy $A \geq 0$.*

Fakt 2.2. *Każdy operator dodatni jest samosprzężony.*

Dowód. Z założenia mamy w szczególności, że $\langle Av, v \rangle = \langle v, Av \rangle$. Na podstawie tożsamości polaryzacyjnej otrzymujemy

$$\langle Av, w \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \langle A(v+i^k w), v+i^k w \rangle i^k = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \langle v+i^k w, A(v+i^k w) \rangle i^k = \langle v, Aw \rangle = \langle A^* v, w \rangle.$$

Stąd $A^* = A$. □

Uwaga 2.3. Warto zapamiętać, że z tożsamości polaryzacyjnej wynika, że jeśli dla dwu operatorów A i B z $B(\mathcal{H})$ mamy $\langle Av, v \rangle = \langle Bv, v \rangle$, to $A = B$.

Przykłady. (a) $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ oraz A jest macierzą postaci

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{bmatrix}$$

Wtedy $\langle Av, v \rangle = \sum_{k=1}^n k|v_k|^2 \geq 0$, dla $v = (v_k)_{k=1}^n$.

(b) Dla $\mathcal{H} = L^2(0, 1)$ określamy $(Af)(x) = xf(x)$. Wtedy

$$\langle Av, v \rangle = \int_0^1 x|f(x)|^2 dx \geq 0.$$

Lemat 2.4. Jeśli $A \geq 0$ oraz $C \in B(\mathcal{H})$, to $C^*AC \geq 0$.

Dowód.

$$\langle C^*ACv, v \rangle = \langle A(Cv), Cv \rangle \geq 0.$$

□

Lemat 2.5. Jeśli $A, B \geq 0$ oraz $A + B = 0$, to $A = B = 0$.

Dowód. Mamy

$$\langle Av, v \rangle + \langle Bv, v \rangle = \langle (A + B)v, v \rangle = 0.$$

Ponieważ oba składniki są nieujemne, to oba muszą się zerować dla dowolnego wektora v . Stąd $A = B = 0$. □

Lemat 2.6. *Mamy*

$$\sqrt{1-x} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2(2n-1)4^n} x^n, \quad |x| \leq 1,$$

oraz szereg jest zbieżny jednostajnie.

Dowód. Wzór jest znany z kursu Analiza 1. Wiemy, że

$$\sqrt{1-x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{1/2}{n} (-x)^n, \quad |x| < 1. \quad (2.1)$$

Po przekształceniu i zastosowaniu wzoru Stirlinga mamy

$$\binom{1/2}{n} (-1)^{n+1} = \frac{(2n)!}{(n!)^2(2n-1)4^n} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi n}\sqrt{n}}.$$

Zatem szereg jest zbieżny jednostajnie w przedziale $[-1, 1]$. Obie strony (2.6) reprezentują więc funkcje ciągłe w przedziale $[-1, 1]$. Stąd równość rozszerza się na przedział domknięty. \square

Lemat 2.7. *Jeśli A jest operatorem samosprzężonym, to*

$$\|A\| = \sup_{\|v\| \leq 1} |\langle Av, v \rangle| = \sup_{\|v\|=1} |\langle Av, v \rangle|.$$

Dowód. Mamy

$$\|A\| = \sup_{\substack{\|u\| \leq 1 \\ \|v\| \leq 1}} |\langle Av, w \rangle| = \sup_{\substack{\|u\| \leq 1 \\ \|v\| \leq 1}} \operatorname{Re} \langle Av, w \rangle,$$

bo można dobrać liczbę zespoloną α o module 1 taką, że

$$|\langle Av, w \rangle| = \langle Av, \alpha w \rangle.$$

Z tożsamości polaryzacyjnej otrzymujemy

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \langle Av, w \rangle &= \frac{1}{4} \langle A(v+w), v+w \rangle - \frac{1}{4} \langle A(v-w), v-w \rangle \\ &= \frac{1}{4} [\|v+w\|^2 \langle Ay, y \rangle - \|v-w\|^2 \langle Az, z \rangle], \end{aligned}$$

gdzie

$$y = \frac{v+w}{\|v+w\|}, \quad z = \frac{v-w}{\|v-w\|},$$

o ile $v \pm w \neq 0$. Zatem

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \langle Av, w \rangle &\leq \frac{1}{4} [\|v+w\|^2 + \|v-w\|^2] \sup_{\|y\|=1} |\langle Ay, y \rangle| \\ &= \frac{1}{4} [2\|v\|^2 + 2\|w\|^2] \sup_{\|y\|=1} |\langle Ay, y \rangle|. \end{aligned}$$

W rezultacie mamy

$$\|A\| \leq \sup_{\|y\|=1} |\langle Ay, y \rangle|.$$

Oczywiście nierówność przeciwna jest też spełniona, bo

$$|\langle Ay, y \rangle| \leq \|Ay\| \|y\| \leq \|A\| \|y\|^2.$$

Czyli

$$\sup_{\|y\|=1} |\langle Ay, y \rangle| \leq \|A\|.$$

□

Twierdzenie 2.8. *Dla dodatniego operatora $A \in B(\mathcal{H})$ istnieje jedyny operator dodatni B spełniający $B^2 = A$, nazywany pierwiastkiem z A i oznaczany $A^{1/2}$.*

Dowód. Możemy założyć, że $\|A\| \leq 1$, dzieląc w razie potrzeby przez liczbę dodatnią. Oznaczmy $X = I - A$. Wtedy

$$\langle Xv, v \rangle = \langle v, v \rangle - \langle Av, v \rangle \geq \|v\|^2 - \|A\|^2 \|v\|^2 \geq 0.$$

Ponadto

$$0 \leq \langle Xv, v \rangle = \langle v, v \rangle - \langle Av, v \rangle \leq \|v\|^2.$$

Z Lematu 2.7 otrzymujemy więc

$$\|X\| = \sup_{\|v\|=1} |\langle Xv, v \rangle| \leq 1.$$

Oznaczmy

$$c_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2 (2n-1) 4^n}.$$

Określmy

$$B = I - \sum_{n=1}^{\infty} c_n X^n,$$

przez analogię ze wzorem z Lematu 2.6, bo $A = I - X$. B jest dobrze określonym operatorem, bo szereg jest bezwzględnie zbieżny znowu z Lematu 2.6.

Uwaga 2.9. W przestrzeni $B(\mathcal{H})$ można pomnożyć metodą Cauchy'ego dwa szeregi bezwzględnie zbieżne i otrzymany szereg będzie bezwzględnie zbieżny. Dowód jest taki sam jak dla szeregów liczbowych, tylko symbol wartości bezwzględnej $|\cdot|$ trzeba zamienić symbolem normy $\|\cdot\|$. Jedyńa różnica polega na tym, że

$$|ab| = |a| |b|, \quad \|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

Sprawdzamy, czy $B^2 = A$.

$$B^2 = \left(I - \sum_{n=1}^{\infty} c_n X^n \right) \left(I - \sum_{n=1}^{\infty} c_n X^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n X^n,$$

gdzie prawa strona jest iloczynem Cauchy'ego szeregu $I - \sum_{n=1}^{\infty} c_n X^n$ przez siebie. Ale z Lematu 2.6 mamy

$$\left(1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n \right)^2 = 1 - x,$$

zatem $d_0 = 1$, $d_1 = -1$ oraz $d_n = 0$ dla $n \geq 2$. Czyli

$$B^2 = I - X = A.$$

Sprawdzimy nieujemność operatora B . Mamy

$$\begin{aligned} \langle Bv, v \rangle &= \langle v, v \rangle - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \langle X^n v, v \rangle \\ &\geq \|v\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \|X^n\| \|v\|^2 \geq \|v\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \|v\|^2 = 0. \end{aligned}$$

Skorzystaliśmy z faktu, że $\|X^n\| \leq \|X\|^n \leq 1$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = 1$, co wynika z Lematu 2.6.

Pozostaje sprawdzić jedyność. Załóżmy, że dla innego operatora $C \geq 0$ mamy $C^2 = A$. Wtedy $CA = C^3 = AC$, tzn. C i A są przemiennie ze sobą.

Wtedy również C i B są przemienne, co wynika z określenia operatora B . Wykonujemy obliczenie

$$\begin{aligned} (B - C)B(B - C) + (B - C)C(B - C) \\ = (B - C)(B + C)(B - C) = (B^2 - C^2)(B - C) = 0. \end{aligned}$$

Każdy z początkowych składników jest operatorem dodatnim z Lematu 2.5. Zatem

$$(B - C)B(B - C) = (B - C)C(B - C) = 0.$$

Odejmując te operatory otrzymujemy

$$0 = (B - C)B(B - C) - (B - C)C(B - C) = (B - C)^3.$$

Operator $B - C$ jest samosprzężony, więc z Lematu 1.19 wynika, że

$$0 = \|(B - C)^3\| = \|B - C\|^3,$$

czyli $C = B$. □

Definicja 2.10. Dla $A \in B(\mathcal{H})$ określamy

$$|A| = (A^*A)^{1/2}.$$

Definicja 2.11. Operator $U \in B(\mathcal{H})$ nazywamy częściową izometrią, jeśli U jest izometrią po obcięciu do podprzestrzeni $(\ker U)^\perp$, tzn.

$$\|Uv\| = \|v\|, \quad \text{dla wszystkich } v \perp \ker U.$$

Uwaga 2.12. Zbiór $\text{Im } U$ jest domknięty jako izometryczny obraz przestrzeni domkniętej $(\ker U)^\perp$ przez operator U . Rzeczywiście, ponieważ

$$\mathcal{H} = \ker U \oplus (\ker U)^\perp,$$

to

$$\text{Im } U = U(\mathcal{H}) = U((\ker U)^\perp).$$

Lemat 2.13. Operator U jest częściową izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy operator UU^* jest rzutem, tzn. $(UU^*)^2 = UU^*$.

Dowód.

(\Rightarrow) Wiemy, że $(\ker U)^\perp = \overline{\operatorname{Im} U^*}$. Ponadto $\|UU^*v\| = \|U^*v\|$. Zatem

$$\langle (UU^*)^2v, v \rangle = \langle UU^*v, UU^*v \rangle = \|UU^*v\|^2 = \|U^*v\|^2 = \langle UU^*v, v \rangle.$$

Stąd $(UU^*)^2 = UU^*$.

(\Leftarrow) Jeśli $(UU^*)^2 = UU^*$, to korzystając z wcześniejszych obliczeń otrzymamy, że U jest izometrią na $\operatorname{Im} U^*$. Zatem U jest izometrią na domknięciu $\overline{\operatorname{Im} U^*}$, czyli na $(\ker U)^\perp$. \square

Dla częściowej izometrii U mamy dwa ortogonalne rozkłady przestrzeni

$$\mathcal{H} = \ker U \oplus (\ker U)^\perp, \quad \mathcal{H} = (\operatorname{Im} U)^\perp \oplus \operatorname{Im} U.$$

Operator U jest izometrią z $(\ker U)^\perp$ na $\operatorname{Im} U$.

Lemat 2.14. *Jeśli U jest częściową izometrią, to U^* jest też częściową izometrią.*

Dowód. Wiemy, że $(UU^*)^2 = UU^*$. Z Lematu 2.13 wystarczy dowieść, że $(U^*U)^2 = U^*U$. Mamy $UU^*(UU^* - I) = 0$. Ponieważ U jest izometrią na $(\ker U)^\perp = \overline{\operatorname{Im} U^*}$, to U jest „1-1” na $\operatorname{Im} U^*$. Stąd $U^*(UU^* - I) = 0$. Przez sprzężenie otrzymujemy $(UU^* - I)U = 0$ czyli

$$UU^*U = U. \tag{2.2}$$

Mnożymy z lewej strony przez U^* i uzyskujemy $(U^*U)^2 = U^*U$. \square

Jako częściowa izometria U^* jest izometrią z $(\ker U^*)^\perp$ na $\operatorname{Im} U^*$, czyli z $\operatorname{Im} U$ na $(\ker U)^\perp$ (odwrotnie niż U).

Ponadto UU^* jest rzutem na $\operatorname{Im} U$. Istotnie, z (2.2) mamy $UU^*(Uv) = Uv$, tzn. UU^* jest identycznością na $\operatorname{Im} U$. Co więcej UU^* zeruje się na $(\operatorname{Im} U)^\perp = \ker U^*$. Po zamianie rolami U i U^* wnioskujemy, że U^*U jest rzutem ortogonalnym na $\operatorname{Im} U^* = (\ker U)^\perp$.

Twierdzenie 2.15 (Rozkład polarny). *Dla operatora $A \in B(\mathcal{H})$ istnieje jedyna częściowa izometria U spełniająca $A = U|A|$ oraz $\ker A = \ker U$. Ponadto $\operatorname{Im} U = \overline{\operatorname{Im} A}$.*

Dowód. Mamy

$$\langle Av, Av \rangle = \langle A^*Av, v \rangle = \langle |A|^2v, v \rangle = \langle |A|v, |A|v \rangle$$

Zatem

$$\|Av\| = \||A|v\|.$$

Stąd wynika, że jeśli $|A|v_1 = |A|v_2$, to $Av_1 = Av_2$, bo

$$\||A|v_1 - |A|v_2\| = \||A|(v_1 - v_2)\| = \|A(v_1 - v_2)\| = \|Av_1 - Av_2\|.$$

Określamy odwzorowanie U najpierw na podprzestrzeni $\text{Im } |A|$ wzorem

$$U(|A|v) = Av.$$

Z poprzednich obliczeń operator U jest dobrze określony i jest izometrią z $\text{Im } |A|$ na $\text{Im } A$. Zatem U rozszerza się do izometrii z $\overline{\text{Im } |A|}$ na $\overline{\text{Im } A}$ w oparciu o znany fakt z topologii metrycznej. Połóżmy $Uv = 0$ dla $v \in (\text{Im } |A|)^\perp = \ker |A|$. Wtedy U staje się częściową izometrią oraz $\ker U = \ker |A| = \ker A$. Z definicji operatora U mamy $U|A| = A$.

Pozostaje sprawdzić jedyność. Załóżmy, że V jest również częściową izometrią spełniającą $A = V|A|$ oraz $\ker V = \ker A$. Zatem

$$V|A|v = Av = U|A|v,$$

tzn. V i U są równe na $\text{Im } |A|$. Stąd $V = U$ na $\overline{\text{Im } |A|}$, przez ciągłość. Z kolei na dopełnieniu ortogonalnym

$$\overline{\text{Im } |A|}^\perp = \ker |A| = \ker A = \ker V = \ker U$$

operatory U i V są równe, bo oba się tam zerują. To oznacza, że $U = V$. \square

Uwaga 2.16. Zauważmy U^*U jest rzutem na

$$(\ker U)^\perp = (\ker A)^\perp = (\ker |A|)^\perp = \overline{\text{Im } |A|}.$$

Czyli

$$U^*A = U^*U|A| = |A|.$$

Uwaga 2.17. Jeśli A jest operatorem odwracalnym, to również A^* i iloczyn A^*A są odwracalne. W związku z tym $|A|$ jest odwracalny. Wtedy $U = A|A|^{-1}$. To oznacza, że U i U^* są odwracalne. Dalej

$$U^*U = |A|^{-1}A^*A|A|^{-1} = I,$$

zatem $U^* = U^{-1}$ co oznacza, że U jest operatorem unitarnym.

Przykłady. (a) Niech $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. Wtedy operator A jest dodatni wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie wartości własne macierzy A są nieujemne. Rzeczywiście, niech $A \geq 0$. Wtedy jeśli $Av = \lambda v$, dla $v \neq 0$, to $0 \leq \langle Av, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle$. Zatem $\lambda \geq 0$. Odwrotnie, założmy, że wartości własne dla A są nieujemne. Wiemy, że A można przedstawić w postaci $A = CDC^{-1}$, gdzie D jest macierzą diagonalną oraz C jest macierzą unitarną. Tzn. $A = CDC^*$. Elementy na przekątnej macierzy D są nieujemne jako wartości własne macierzy A . Zatem D jest operatorem dodatnim, bo jeśli

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

to

$$\langle Dv, v \rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k |v_k|^2 \geq 0.$$

Zatem $A \geq 0$. Ponadto $A^{1/2} = CD^{1/2}C^{-1}$, gdzie

$$D^{1/2} = \begin{bmatrix} \lambda_1^{1/2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^{1/2} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n^{1/2} \end{bmatrix},$$

(b) Niech $\mathcal{H} = L^2(0, 1)$ oraz $(Af)(x) = xf(x)$. Wtedy

$$\langle Af, f \rangle = \int_0^1 (Af)x \overline{f(x)} dx = \int_0^1 x |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

Ponadto

$$(A^{1/2}f)(x) = \sqrt{x} f(x).$$

(b) Niech $\mathcal{H} = \ell^2$. Określmy

$$U(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots).$$

U jest izometrią na $V = e_0^\perp$, gdzie $e_k = (0, \dots, 0, \underset{k}{1}, 0, \dots)$. Ponadto U zeruje się na $\mathbb{C}e_0$. Zatem U jest częściową izometrią. Mamy

$$U^*(x_0, x_1, x_2, \dots) = (0, x_0, x_1, \dots).$$

Rzeczywiście

$$\langle U^*x, y \rangle = \langle x, Uy \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} x_n \overline{y_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} x_{n-1} \overline{y_n}.$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} U^*U(x_0, x_1, x_2, \dots) &= U^*(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots), \\ UU^*(x_0, x_1, x_2, \dots) &= U(0, x_0, x_1, \dots) = (x_0, x_1, x_2, \dots). \end{aligned}$$

Tzn. $UU^* = I$ oraz U^*U jest rzutem na e_0^\perp .

3 Zbieżność operatorów

Niech X i Y będą przestrzeniami unormowanymi. Rozważmy $T_n, T \in B(X, Y)$.

Definicja 3.1. (a) Mówimy, że ciąg operatorów T_n jest zbieżny do operatora T w normie operatorowej, jeśli

$$\|T_n - T\|_{B(X, Y)} \xrightarrow{n} 0.$$

(b) Mówimy, że ciąg T_n jest zbieżny do T mocno, jeśli dla wszystkich elementów $x \in X$ mamy

$$\|T_n x - Tx\|_Y \xrightarrow{n} 0.$$

(c) Mówimy, że ciąg T_n jest zbieżny do T słabo, jeśli dla wszystkich elementów $x \in X$ oraz wszystkich funkcjonalów $y^* \in Y^*$ mamy

$$|y^*(T_n x) - y^*(Tx)| \xrightarrow{n} 0.$$

Z nierówności

$$\begin{aligned} |y^*(T_n x) - y^*(Tx)| &= |y^*(T_n x - Tx)| \leq \|y^*\|_{Y^*} \|T_n x - Tx\|_Y \\ &= \|y^*\|_{Y^*} \|(T_n - T)x\|_Y \leq \|y^*\|_{Y^*} \|x\|_X \|T_n - T\|_{B(X, Y)} \end{aligned}$$

wynika, że (a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c).

Przykład 3.2. Niech $X = Y = \ell^2$ oraz

$$U(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots).$$

Dla $T_n = U^n$ mamy

$$T_n(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots).$$

Zatem

$$\|T_n x\|^2 = \sum_{k=n}^{\infty} |x_k|^2 \xrightarrow{n} 0.$$

To oznacza, że ciąg T_n jest zbieżny mocno do zera. Ponieważ

$$\|T_n\| \geq \|T_n e_n\| = \|e_0\| = 1,$$

to ciąg T_n nie dąży do 0 w normie operatorowej.

Mamy

$$U^*(x_0, x_1, x_2, \dots) = (0, x_0, x_1, \dots).$$

Wtedy

$$(U^*)^n(x_0, x_1, x_2, \dots) = (\underbrace{0, \dots, 0}_n, x_0, x_1, \dots).$$

Zatem

$$\|(U^*)^n x\|_2 = \|x\|_2.$$

Dalej

$$\langle (U^*)^n x, y \rangle = \langle (U^n)^* x, y \rangle = \langle x, U^n y \rangle \xrightarrow{n} 0,$$

bo $U^n y \xrightarrow{n} 0$. To oznacza, że $(U^*)^n$ dąży do 0 słabo, ale nie dąży do 0 mocno.

Uwaga 3.3. Dla $T_n, T \in B(\mathcal{H})$ mamy $T_n \xrightarrow[\text{słabo}]{} T$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\langle T_n x, y \rangle \xrightarrow{n} \langle T x, y \rangle, \quad x, y \in \mathcal{H}.$$

Twierdzenie 3.4. Załóżmy, że X jest przestrzenią Banacha, a Y przestrzenią unormowaną. Wtedy każdy słabo zbieżny ciąg operatorów $T_n \in B(X, Y)$ jest ograniczony, tzn. $\sup_n \|T_n\| < \infty$.

Dowód. Załóżmy, że $T_n \xrightarrow{n} T$ słabo, tzn. dla dowolnego elementu $x \in X$ ciąg $T_n x$ jest słabo zbieżny w przestrzeni Y . Wtedy ciąg $T_n x$ jest ograniczony w Y . Zatem z twierdzenia Banacha-Steinhausa normy $\|T_n\|$ są wspólnie ograniczone. \square

Rozważmy przestrzeń Hilberta \mathcal{H} . Dla $A, B \in B(\mathcal{H})$ piszemy $A \geq B$ jeśli $A^* = A$, $B^* = B$ oraz $A - B \geq 0$. Ta relacja jest przechodnia, bo jeśli $A \geq 0$ oraz $B \geq 0$, to $A + B \geq 0$.

Lemat 3.5. *Dla $A \geq 0$ mamy*

$$|\langle Au, v \rangle| \leq \langle Au, u \rangle^{1/2} \langle Av, v \rangle^{1/2}, \quad (3.1)$$

$$\|Au\| \leq \|A\|^{1/2} \langle Au, u \rangle^{1/2}. \quad (3.2)$$

Dowód. Dla $z \in \mathbb{C}$ i $u, v \in \mathcal{H}$ rozważamy wyrażenie

$$0 \leq \langle A(zu + v), zu + v \rangle = |z|^2 \langle Au, u \rangle + \langle Av, v \rangle + 2\operatorname{Re} \{z \langle Au, v \rangle\}.$$

Założmy, że $\langle Au, v \rangle \neq 0$. Niech $z = -\lambda \overline{\operatorname{sgn} \langle Au, v \rangle}$ dla $\lambda \in \mathbb{R}$. Wtedy

$$0 \leq \langle A(zu + v), zu + v \rangle = \langle Au, u \rangle \lambda^2 - 2|\langle Au, v \rangle| \lambda + \langle Av, v \rangle.$$

Otrzymaliśmy nieujemny trójmian kwadratowy zmiennej λ . Zatem wyróżnik Δ trójmianu musi być niedodatni. Czyli

$$0 \geq \frac{\Delta}{4} = |\langle Au, v \rangle|^2 - \langle Au, u \rangle \langle Av, v \rangle.$$

To dowodzi (3.1). W (3.1) podstawmy $v = Au$. Wtedy z nierówności Schwartzera otrzymujemy

$$\|Au\|^2 \leq \langle Au, u \rangle^{1/2} \|A\|^{1/2} \|Au\|.$$

Przy założeniu $Au \neq 0$ otrzymujemy (3.1). □

Twierdzenie 3.6. *Niech $T_n \in B(\mathcal{H})$ będzie rosnącym i ograniczonym ciągiem operatorów dodatnich, tzn. $T_n \leq T_{n+1}$, oraz $\sup_n \|T_n\| < \infty$. Wtedy ciąg T_n jest zbieżny mocno.*

Dowód. Dla $v \in \mathcal{H}$ mamy

$$0 \leq \langle T_n v, v \rangle \leq \langle T_{n+1} v, v \rangle.$$

Ponadto

$$|\langle T_n v, v \rangle| \leq \|T_n\| \|v\|^2 \leq c \|v\|^2,$$

gdzie $c = \sup_n \|T_n\|$. Zatem ciąg liczbowy $\langle T_n v, v \rangle$ jest rosnący i ograniczony, więc jest zbieżny dla dowolnego elementu v . Z tożsamości polaryzacyjnej

wynika, że również ciąg $\langle T_n u, v \rangle$ jest zbieżny dla dowolnych elementów u i v . Oznaczmy

$$B(u, v) = \lim_n \langle T_n u, v \rangle.$$

Wtedy

$$|B(u, v)| \leq \sup_n |\langle T_n u, v \rangle| \leq c \|u\| \|v\|.$$

Zatem $B(u, v)$ jest ograniczoną formą hermitowską na $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$. Z Twierdzenia 3.24 i zadania 72 [[5]] istnieje operator samosprzężony T taki, że $B(u, v) = \langle Tu, v \rangle$. Tzn.

$$\lim_n \langle T_n u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle.$$

Zatem ciąg T_n jest zbieżny do T słabo. Operator T jest dodatni, bo

$$0 \leq \langle T_n u, u \rangle \nearrow \langle Tu, u \rangle.$$

Co więcej $T \geq T_n$. Stosujemy (3.2) do $A = T - T_n$ i otrzymujemy

$$\begin{aligned} \|Tu - T_n u\| &= \|(T - T_n)u\| \leq \|T - T_n\|^{1/2} \langle (T - T_n)u, u \rangle^{1/2} \\ &\leq \|T - T_n\|^{1/2} \langle Tu - T_n u, u \rangle^{1/2}. \end{aligned}$$

Ponieważ

$$\|T - T_n\| \leq \|T\| + \|T_n\| \leq \|T\| + c,$$

to

$$\|Tu - T_n u\| \leq (\|T\| + c)^{1/2} \langle Tu - T_n u, u \rangle^{1/2}.$$

Zatem $\|Tu - T_n u\| \xrightarrow[n]{} 0$. Czyli T_n dąży do T mocno □

4 Operatory zwarte

Definicja 4.1. *Ograniczony operator liniowy $T : X \rightarrow Y$, gdzie X i Y są przestrzeniami unormowanymi, nazywamy zwartym jeśli obraz dowolnego ograniczonego podzbioru w X jest warunkowo zwartym podzbiorem w Y , tzn. z każdego ciągu elementów tego obrazu można wybrać podciąg zbieżny.*

Uwaga 4.2. Aby operator $T : X \rightarrow Y$ był zwarty wystarczy, aby zbiór $T(B_1)$ był warunkowo zwarty, gdzie B_1 jest kulą jednostkową w X , tzn. $B_1 = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$. Rzeczywiście, każdy ograniczony zbiór jest zawarty w wielokrotności kuli jednostkowej. Więc obraz takiego zbioru jest zawarty w wielokrotności obrazu kuli jednostkowej.

Przykład 4.3. Niech $T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ będzie określony wzorem

$$(Tf)(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy,$$

gdzie $k(x, y)$ jest funkcją ciągłą dwu zmiennych. Wtedy

$$\|Tf\|_\infty \leq \sup_{0 \leq x, y \leq 1} |k(x, y)| \|f\|_\infty.$$

Stąd

$$\|T\| \leq \|k\|_\infty := \sup_{0 \leq x, y \leq 1} |k(x, y)|.$$

Rozważmy zbiór $T(\{f \in C[0, 1] : \|f\|_\infty \leq 1\})$. Ten zbiór jest ograniczony, bo operator T jest ograniczony. Sprawdzamy jednakową ciągłość funkcji z tego zbioru.

$$\begin{aligned} |(Tf)(x) - (Tf)(x')| &= \left| \int_0^1 [k(x, y) - k(x', y)] f(y) dy \right| \\ &\leq \int_0^1 |k(x, y) - k(x', y)| |f(y)| dy \leq \|f\|_1 \sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)| \\ &\leq \|f\|_\infty \sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)|. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Funkcja $k(x, y)$ jest jednostajnie ciągła. Zatem dla ustalonej liczby dodatniej ε istnieje liczba dodatnia δ taka, że jeśli $|x - x'| < \delta$ oraz $|y - y'| < \delta$ to $|k(x, y) - k(x', y)| < \varepsilon$. Zatem jeśli $|x - x'| < \delta$, to

$$\sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)| \leq \varepsilon.$$

Czyli $|(Tf)(x) - (Tf)(x')| \leq \varepsilon$. Reasumując obraz kuli jednostkowej przez operator T jest ograniczony i warunkowo zwarty. Zatem z twierdzenia Arzeli-Ascoliego ten obraz jest warunkowo zwarty, więc operator T jest zwarty.

Twierdzenie 4.4. Niech X, Y, V , i W będą przestrzeniami unormowanymi, natomiast operatory $T : X \rightarrow Y$, $A : V \rightarrow X$ oraz $B : Y \rightarrow W$ będą ograniczonymi operatorami liniowymi. Jeśli operator T jest zwarty, to zwarty jest również operator $BTA : V \rightarrow W$.

Uwaga 4.5. Aby pokazać operator $T : X \rightarrow Y$ jest zwarty, trzeba udowodnić, że dla każdego ograniczonego ciągu x_n w X ciąg Tx_n zawiera podciąg zbieżny w Y .

Dowód. Niech v_n będzie ograniczonym ciągiem w V . Wtedy ciąg Av_n jest ograniczony w X . Zatem ciąg $T(Av_n)$ zawiera podciąg $T(Av_{n_k})$ zbieżny. Z ciągłości operatora B mamy, że podciąg $BTAv_{n_k}$ jest też zbieżny. \square

Przykład 4.6. Rozważmy operator $T : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1)$

$$(Tf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy,$$

gdzie $k(x, y)$ jest funkcją ciągłą dwu zmiennych. Określmy operatory $S_1 : C[0, 1] \rightarrow L^2(0, 1)$ oraz $S_2 : L^2(0, 1) \rightarrow C[0, 1]$ wzorami

$$S_1f = f, \quad (S_2f)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Oba operatory są ograniczone, bo

$$\|S_1f\|_2 = \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq \|f\|_\infty,$$

oraz

$$\begin{aligned} |(S_2f)(x)| &\leq \int_0^1 |k(x, y)| |f(y)| dy \leq \|k\|_\infty \int_0^1 |f(y)| dy \\ &\leq \|k\|_\infty \left(\int_0^1 |f(y)|^2 dy \right)^{1/2} = \|k\|_\infty \|f\|_2, \end{aligned}$$

czyli $\|S_2f\|_\infty \leq \|k\|_\infty \|f\|_2$. Mamy $T = S_1S_2$. Pokażemy, że operator S_2 jest zwarty, zatem T też będzie zwarty z poprzedniego twierdzenia. Wykażemy, że obraz kuli w $L^2(0, 1)$ przez S_1 jest warunkowo zwarty w $C[0, 1]$. Oczywiście obraz kuli jest ograniczony, bo operator S_2 jest ograniczony. Sprawdzamy jednakową ciągłość funkcji z obrazu kuli. Niech $\|f\|_2 \leq 1$. Wtedy korzystając z (4.1) otrzymamy

$$|(S_2f)(x) - (S_2f)(x')| \leq \sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)| \|f\|_1 \leq \sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)| \|f\|_2,$$

więc

$$|(S_2f)(x) - (S_2f)(x')| \leq \sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)|.$$

Ponieważ funkcja $k(x, y)$ jest jednostajnie ciągła, to funkcje $S - 2f$, dla $\|f\|_2 \leq 1$ są jednakowo ciągłe.

Przykład 4.7. Operatory skończenie wymiarowe, tzn. $\dim \operatorname{Im} T < \infty$, są zwarte. Istotnie, niech $T : X \rightarrow Y$ będzie ograniczonym operatorem liniowym, dla którego $T(X)$ jest przestrzenią skończonego wymiaru m . Wtedy przestrzeń $T(X)$ jest izomorficzna z \mathbb{C}^m z normą euklidesową. W takiej przestrzeni każdy zbiór ograniczony jest warunkowo zwarty. W szczególności obraz kuli jednostkowej przez operator ograniczony T jest taki.

Twierdzenie 4.8. Niech X przestrzenią unormowaną, a Y przestrzenią Banacha. Załóżmy, że operatory $T_n \in B(X, Y)$ są zwarte oraz zbieżne do operatora $T \in B(X, Y)$ w normie operatorowej. Wtedy operator T też jest zwarty.

Dowód. Rozważamy ciąg x_m elementów z kuli jednostkowej w X . Z założenia istnieje podciąg $x_m^{(1)}$ ciągu x_m taki, że ciąg $Tx_m^{(1)}$ jest zbieżny, np. do y_1 . Z kolei istnieje podciąg $x_m^{(2)}$ ciągu $x_m^{(1)}$ taki, że ciąg $T_2x_m^{(2)}$ jest zbieżny, np. do y_2 . Postępując tak dalej znajdziemy podciąg $x_m^{(n)}$ ciągu $x_m^{(n-1)}$ taki, że ciąg $T_nx_m^{(n)}$ jest zbieżny, np. do y_n . Określimy nowy ciąg $\tilde{x}_m = x_m^{(m)}$. Dla $m \geq n$ ciąg \tilde{x}_m jest podciągiem ciągu $x_m^{(n)}$. Zatem $T_n\tilde{x}_m \xrightarrow{m} y_n$. Sprawdzimy, że ciąg y_n jest zbieżny. Mamy

$$\|y_l - y_k\| = \lim_m \|T_l\tilde{x}_m - T_k\tilde{x}_m\|.$$

Ale

$$\|T_l\tilde{x}_m - T_k\tilde{x}_m\| = \|(T_l - T_k)\tilde{x}_m\| \leq \|T_l - T_k\| \|\tilde{x}_m\| \leq \|T_l - T_k\|.$$

Zatem ciąg y_n spełnia warunek Cauchy'ego. Z zupełności przestrzeni Y ciąg y_n jest zbieżny do pewnego elementu y . Pokażemy, że $T\tilde{x}_m \xrightarrow{m} y$. Mamy

$$\begin{aligned} \|T\tilde{x}_m - y\| &\leq \|T\tilde{x}_m - T_n\tilde{x}_m\| + \|T_n\tilde{x}_m - y_n\| + \|y_n - y\| \\ &\leq \|T - T_n\| + \|T_n\tilde{x}_m - y_n\| + \|y_n - y\|. \end{aligned}$$

Dla liczby dodatniej ε wybieramy n odpowiednio duże tak, aby $\|T - T_n\| < \varepsilon/3$ oraz $\|y_n - y\| < \varepsilon/3$. Następnie dla ustalonej wartości n istnieje liczba

m_0 tak, że dla $m \geq m_0$ zachodzi $\|T_n \tilde{x}_m - y_n\| < \varepsilon/3$. Wtedy dla $m \geq m_0$ otrzymujemy

$$\|T \tilde{x}_m - y\| < \varepsilon.$$

□

Przykład 4.9. Rozważmy ponownie operator $T : L^2(0,1) \rightarrow L^2(0,1)$ z Przykładu 4.6. Na podstawie twierdzenia Stone'a-Weierstrassa kombinacje liniowe funkcji postaci $a(x)b(y)$ leżą gęsto z przestrzeni $C([0,1]^2)$. Zatem istnieje ciąg funkcji $k_n(x,y)$ postaci $k_n(x,y) = \sum_{k=1}^N a_k(x)b_k(y)$ (przy czym N i funkcje a_k oraz b_k zależą od n) takich, że $k_n(x,y) \xrightarrow[n]{\Rightarrow} k(x,y)$. Określmy operatory

$$(T_n f)(x) = \int_0^1 k_n(x,y) f(y) dy = \sum_{k=1}^N a_k(x) \int_0^1 b_k(y) f(y) dy.$$

Zatem

$$\text{Im } T_n \subseteq \text{lin}\{a_1(x), a_2(x), \dots, a_N(x)\}.$$

To oznacza, że T_n jest operatorem skończenie wymiarowym. W szczególności T_n jest operatorem zwartym. Ponadto

$$\begin{aligned} |[(T_n - T)f](x)| &= \left| \int_0^1 [k_n(x,y) - k(x,y)] f(y) dy \right| \leq \int_0^1 |k_n(x,y) - k(x,y)| |f(y)| dy \\ &\leq \sup_{0 \leq x, y \leq 1} |k_n(x,y) - k(x,y)| \|f\|_1 \leq \sup_{0 \leq x, y \leq 1} |k_n(x,y) - k(x,y)| \|f\|_2. \end{aligned}$$

Stąd otrzymujemy

$$\|(T_n - T)f\|_2 \leq \sup_{0 \leq x, y \leq 1} |k_n(x,y) - k(x,y)| \|f\|_2.$$

Zatem

$$\|T_n - T\| \leq \sup_{0 \leq x, y \leq 1} |k_n(x,y) - k(x,y)| \xrightarrow[n]{\rightarrow} 0.$$

Twierdzenie 4.10. Niech T będzie ograniczonym operatorem liniowym na przestrzeni Hilberta. T jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy T^* jest zwarty.

Dowód. Wiemy, że operator T można zapisać w postaci $T = U|T|$ oraz $U^*T = |T|$. Jeśli T jest zwarty, to zwarty jest też $|T|$. Wtedy również $T^* = |T|U$ jest zwarty. □

Twierdzenie 4.11. *W óśrodkowej przestrzeni Hilberta \mathcal{H} ograniczony operator liniowy T jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy przekształca ciągi słabo zbieżne do zera w ciągi zbieżne do zera w normie przestrzeni.*

Dowód.

(\Rightarrow) Załóżmy, że ciąg elementów x_n przestrzeni \mathcal{H} dąży słabo do zera. Ten ciąg jest więc ograniczony. Zatem Tx_n zawiera podciąg zbieżny Tx_{n_k} . Oznaczmy $Tx_{n_k} \xrightarrow{k} y$. Dla $z \in \mathcal{H}$ otrzymujemy

$$\langle y, z \rangle = \lim_k \langle Tx_{n_k}, z \rangle = \lim_k \langle x_{n_k}, T^*z \rangle = 0.$$

Zatem $\langle y, z \rangle = 0$ dla wszystkich $z \in \mathcal{H}$, czyli $y = 0$.

Z powyższego rozumowania wynika, że każdy podciąg ciągu Tx_n zawiera podciąg zbieżny do zera. Stąd otrzymujemy, że Tx_n dąży do zera.

(\Leftarrow) Niech x_n będzie ograniczonym ciągiem elementów z \mathcal{H} . Z twierdzenia Banacha-Alaoglu możemy wybrać podciąg x_{n_k} , który jest $*$ -słabo, czyli słabo, zbieżny. Niech $x_{n_k} \xrightarrow{k} x$ słabo. Zatem $x_{n_k} - x \xrightarrow{k} 0$ słabo. Z założenia ciąg $T(x_{n_k} - x)$ jest zbieżny do zera w normie. Czyli $\|Tx_{n_k} - Tx\| \xrightarrow{k} 0$. \square

Lemat 4.12. *Niech X, Y i Z będą przestrzeniami unormowanymi. Załóżmy, że operator $T : X \rightarrow Y$ jest zwarty oraz, że ciąg ograniczonych operatorów $S_n : Y \rightarrow Z$ jest mocno zbieżny do operatora $S : Y \rightarrow Z$. Wtedy ciąg operatorów $S_n T$ jest zbieżny do ST w normie operatorowej.*

Dowód. Załóżmy, że $S_n T$ nie jest zbieżny do ST w normie operatorowej. Zatem dla pewnej dodatniej liczby ε można znaleźć rosnący ciąg liczb naturalnych n_k oraz ciąg elementów $x_k \in X$ takich, że

$$\|x_k\| = 1, \quad \|(S_{n_k} T - ST)x_k\| \geq \varepsilon.$$

Ze zwartości operatora T ciąg Tx_k zawiera podciąg zbieżny. Bez straty ogólności założymy, że Tx_k jest zbieżny do pewnego elementu $y \in Y$. Wtedy

$$\begin{aligned} \varepsilon &\leq \|(S_{n_k} T - ST)x_k\| \leq \|S_{n_k} Tx_k - S_{n_k} y\| + \|S_{n_k} y - Sy\| + \|Sy - STx_k\| \\ &\|S_{n_k}\| \|Tx_k - y\| + \|S_{n_k} y - Sy\| + \|S\| \|y - Tx_k\| \xrightarrow{k} 0. \quad \perp \end{aligned}$$

\square

Twierdzenie 4.13. *Każdy zwarty operator pomiędzy przestrzeniami Hilberta jest granicą w normie operatorowej ciągu operatorów skończenie wymiarowych.*

Dowód. Niech $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ będzie zwarty. Rozważmy przestrzeń $T(\mathcal{H}_1)$. Oznaczmy symbolem B kulę jednostkową w \mathcal{H}_1 . Wtedy

$$T(\mathcal{H}_1) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(nB) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nT(B) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} n\overline{T(B)}.$$

Zatem przestrzeń $T(\mathcal{H}_1)$ jest zawarta w przeliczalnej sumie zbiorów zwartych. Z kursu topologii metrycznej wiemy, że przestrzeń $T(\mathcal{H}_1)$ jest więc ośrodkowa. Zatem również domknięcie $\mathcal{H}_3 := \overline{T(\mathcal{H}_1)}$ jest ośrodkową przestrzenią Hilberta. Niech $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ oznacza bazę ortonormalną w przestrzeni \mathcal{H}_3 . Wtedy dla dowolnego elementu $x \in \mathcal{H}_3$ mamy

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Oznaczmy

$$I_n x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Wtedy $I_n x \xrightarrow{n} x$, czyli $I_n \xrightarrow{n} I_{\mathcal{H}_3}$ mocno. Z Lematu 4.12 otrzymujemy, że $I_n T \xrightarrow{n} I_{\mathcal{H}_3} T = T$ w normie operatorowej. \square

Twierdzenie 4.14 (Alternatywa Fredholma). *Niech T będzie operatorem zwartym w przestrzeni Hilberta. Wtedy dla liczby $\lambda \neq 0$ operator $\lambda I - T$ jest odwracalny albo liczba λ jest wartością własną operatora T .*

Dowód. Mamy $\lambda I - T = \lambda(I - \lambda^{-1}T)$. Zamieniając operator T na $\lambda^{-1}T$, który też jest zwarty możemy ograniczyć się do przypadku $\lambda = 1$. Rozważamy więc operator $I - T$. Z poprzedniego lematu można znaleźć operator skończenie wymiarowy K_0 taki, że $\|T - K_0\| < 1$. Wtedy

$$I - T = I - (T - K_0) - K_0.$$

Operator $I - (T - K_0)$ jest odwracalny na podstawie Twierdzenia 1.7. Zatem

$$I - T = \{I - K_0[I - (T - K_0)]^{-1}\} [I - (T - K_0)].$$

Oznaczmy

$$K_1 = K_0[I - (T - K_0)]^{-1}.$$

Wtedy

$$I - T = (I - K_1)(I - T + K_0). \quad (4.2)$$

Operator K_1 jest skończenie wymiarowy, bo $\text{Im } K_1 \subseteq \text{Im } K_0$. Ze wzoru (4.2) wynika, że $I - T$ jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy $I - K_1$ jest odwracalny. Ponadto $I - T$ jest różnowartościowy wtedy i tylko wtedy, gdy $I - K_1$ jest różnowartościowy. Wystarczy zatem pokazać, że jeśli $I - K_1$ jest nieodwracalny, to $I - K_1$ nie jest różnowartościowy.

Założmy nie wprost, że $I - K_1$ jest różnowartościowy. Pokażemy, że $I - K_1$ jest „na”. Ustalmy $y \in \mathcal{H}$. Chcemy rozwiązać równanie

$$(I - K_1)x = y. \quad (4.3)$$

Wybieramy bazę ortonormalną e_1, e_2, \dots, e_n w $\text{Im } K_1$. Będziemy szukać rozwiązania x w postaci

$$x = y + \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k. \quad (4.4)$$

Mamy

$$K_1 x = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e_k. \quad (4.5)$$

Zapis jest jednoznaczny, zatem $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ zależą liniowo od zmiennej x . Podstawmy (4.4) i (4.5) do (4.3). Wtedy

$$y + \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k - \sum_{k=1}^n \alpha_k(y) e_k - \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_j \alpha_k(e_j) e_k = y.$$

Po uproszczeniu y porównujemy współczynniki przy wektorach bazowych i dostajemy układ n równań z n niewiadomymi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

$$\lambda_k - \sum_{j=1}^n \lambda_j \alpha_k(e_j) = \alpha_k(y), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Macierz układu ma postać $I - A$, gdzie $A = (\alpha_k(e_j))_{j,k=1}^n$. Układ równań ma postać macierzową

$$(I - A)\lambda = b, \quad \lambda, b \in \mathbb{C}^n,$$

gdzie

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \alpha_1(y) \\ \alpha_2(y) \\ \vdots \\ \alpha_n(y) \end{pmatrix}.$$

Wyznacznik układu $\det(I - A)$ jest niezerowy. Istotnie, gdyby $\det(I - A) = 0$, to równanie $(I - A)\lambda = 0$ miałoby niezerowe rozwiązanie $\lambda \in \mathbb{C}^n$. Równoważnie, przyjmując $y = 0$ uzyskamy niezerowe rozwiązanie równania $(I - K_1)x = 0$, bo można przyjąć $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$. To jest sprzeczne z założeniem o różnowartościowości $I - K_1$. Zatem $\det(I - A) \neq 0$. Wtedy równanie $(I - A)\lambda = b$ posiada rozwiązanie λ . Ale to oznacza, że równanie $(I - K_1)x = y$ ma rozwiązanie. W rezultacie operator $I - K_1$ jest „na”. \square

Twierdzenie 4.15 (Riesz-Schauder). *Spektrum operatora zwartego na przestrzeni Hilberta składa się z co najwyżej przeliczalnego zbioru liczb zespolonych nie mających punktu skupienia poza być może punktem 0. Każda niezerowa liczba w spektrum jest wartością własną o skończonej krotności (tzn. przestrzeń wektorów własnych odpowiadająca tej liczbie ma skończony wymiar).*

Dowód. Niech $\lambda \neq 0$ oraz $\lambda \in \sigma(T)$ dla zwartego operatora T . Z alternatywy Fredholma wynika, że λ jest wartością własną operatora T . Niech $Tx = \lambda x$, oraz $x \neq 0$. Ustalmy liczbę $\varepsilon > 0$. Pokażemy, że przestrzeń wektorów własnych odpowiadających wartościom własnym λ , $|\lambda| \geq \varepsilon$, ma skończony wymiar. To zakończy dowód tezy twierdzenia.

Założmy nie wprost, że istnieje nieskończony układ liniowo niezależny $(x_n)_{n=1}^\infty$ taki, że $Tx_n = \lambda_n x_n$ oraz $|\lambda_n| \geq \varepsilon$. Zastosujemy proces ortogonalizacji Grama-Schmidta do tego ciągu i otrzymamy układ ortonormalny $(y_n)_{n=1}^\infty$ o własności

$$y_n \in E_n := \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad y_n \perp E_{n-1}.$$

Niech

$$y_n = \sum_{k=1}^n \alpha_{k,n} x_k.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} T(y_n) &= \sum_{k=1}^n \alpha_{k,n} T x_k = \sum_{k=1}^n \alpha_{k,n} \lambda_k x_k \\ &= \lambda_n \alpha_{n,n} x_n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_{k,n} \lambda_k x_k = \lambda_n y_n - \lambda_n \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_{k,n} x_k + \sum_{k=1}^n \alpha_{k,n} \lambda_k x_k. \end{aligned}$$

Tzn.

$$T(y_n) = \lambda_n y_n + v_n, \quad v_n \in E_{n-1}.$$

Zatem

$$\langle Ty_n, y_n \rangle = \lambda_n \langle y_n, y_n \rangle = \lambda_n.$$

Założmy, że $n > m$. Wtedy $Ty_m \in E_m \subset E_{n-1}$, więc $Ty_m \perp y_n$. Dalej

$$\|Ty_n - Ty_m\| \geq |\langle Ty_n - Ty_m, y_n \rangle| = |\langle Ty_n, y_n \rangle| = |\lambda_n| \geq \varepsilon.$$

To oznacza, że ciąg Ty_n nie posiada podciągu zbieżnego co przeczy zwartości operatora T . \perp □

Lemat 4.16. *Jeśli T jest zwartym operatorem liniowym na przestrzeni Hilberta, to obraz $\text{Im}(I - T)$ jest domkniętą podprzestrzenią liniową.*

Dowód. Wystarczy udowodnić nierówność $\|(I - T)x\| \geq c\|x\|$ dla pewnej stałej $c > 0$ oraz wszystkich $x \perp \ker(I - T)$. Rzeczywiście, dla

$$\mathcal{H}_0 = \ker(I - T)^\perp$$

rozważmy operator $I - T : \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{H}$. Zauważmy, że

$$(I - T)(\mathcal{H}) = (I - T)(\mathcal{H}_0).$$

Wtedy z nierówności $\|(I - T)x\| \leq c\|x\|$ dla $x \in \mathcal{H}_0$ wynika, że $I - T$ jest operatorem różnowartościowym na \mathcal{H}_0 i jego obraz jest domknięty.

Założmy nie wprost, że nierówność nie jest spełniona dla żadnej stałej $c > 0$. Zatem istnieje ciąg elementów $x_n \perp \ker(I - T)$ spełniający $\|x_n\| = 1$ oraz $\|(I - T)x_n\| \xrightarrow{n} 0$. Z ciągu Tx_n można wybrać podciąg zbieżny Tx_{n_k} . Niech $Tx_{n_k} \xrightarrow{k} y$. Wtedy $\|x_{n_k} - Tx_{n_k}\| \xrightarrow{k} 0$. Zatem $x_{n_k} \xrightarrow{k} y$. Stąd

$$(I - T)y = \lim_k (I - T)x_{n_k} = 0,$$

czyli $y \in \ker(I - T)$. Z drugiej strony ponieważ $x_{n_k} \xrightarrow{k} y$, to $y \in \ker(I - T)^\perp$. Zatem $y = 0$. Ale $\|y\| = \lim_k \|x_{n_k}\| = 1$. \perp □

Uwaga 4.17. Jeśli operator T jest zwarty, to również $\text{Im}(\lambda I - T)$ dla $\lambda \neq 0$ jest domkniętą podprzestrzenią liniową, bo

$$\text{Im}(\lambda I - T) = \text{Im}(I - \lambda^{-1}T).$$

Twierdzenie 4.18. *Niech T będzie zwartym operatorem liniowym w $B(\mathcal{H})$. Równanie $(I - T)x = y$ ma rozwiązanie $x \in \mathcal{H}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $y \perp \ker(I - T^*)$.*

Dowód. Mamy rozkład ortogonalny

$$\mathcal{H} = \ker(I - T^*) \oplus \overline{\operatorname{Im}(I - T)} = \ker(I - T^*) \oplus \operatorname{Im}(I - T).$$

Zatem $y \in \operatorname{Im}(I - T)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $y \perp \ker(I - T^*)$. \square

Twierdzenie 4.19. *Niech $T \in B(\mathcal{H})$ będzie zwartym operatorem samosprężonym w ośrodkowej przestrzeni Hilberta. Wtedy istnieje baza ortonormalna złożona z wektorów własnych operatora T . Tzn. istnieje baza ortonormalna $\{\varphi_n\}_{n=1}^N$ taka, że $T\varphi_n = \mu_n\varphi_n$, gdzie $\mu_n \in \mathbb{R}$ oraz $\mu_n \xrightarrow{n} 0$. (gdy $\dim \mathcal{H} = \infty$, to $N = \infty$)*

Dowód. Przeprowadzimy dowód w przypadku $\dim \mathcal{H} = \infty$. Operator T nie jest odwracalny, bo dla ciągu ortonormalnego e_n mamy $e_n \xrightarrow[\text{ślabo}]{} 0$, zatem $\|Te_n\| \xrightarrow{n} 0$. Czyli $0 \in \sigma(T)$. Wiemy, że $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$. Ponadto

$$\sigma(T) = \{\mu_n\}_{n=1}^N \cup \{0\},$$

gdzie $\mu_n \neq 0$. Przestrzeń własna

$$E_n = \{x \in \mathcal{H} : Tx = \mu_n x\}$$

ma skończony wymiar. Wiemy też, że jeśli $T^* = T$, to wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym są ortogonalne. Niech $E_0 = \ker T$. Oznaczmy

$$\mathcal{H}_0 = \bigoplus_{n=1}^N E_n \oplus E_0.$$

Tzn. \mathcal{H}_0 jest najmniejszą domkniętą podprzestrzenią zawierającą podprzestrzenie E_n dla $n = 0, 1, 2, \dots, N$. Pokażemy, że $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H}$. Załóżmy nie wprost, że $\mathcal{H}_0 \subsetneq \mathcal{H}$. Zauważmy, że $T(\mathcal{H}_0) \subset \mathcal{H}_0$, bo $T(E_n) \subset E_n$ dla każdego $n = 0, 1, 2, \dots, N$.

Lemat 4.20. *Niech $T \in B(\mathcal{H})$ oraz $T^* = T$. Jeśli dla pewnego podzbioru $M \subset \mathcal{H}$ mamy $T(M) \subset M$, to $T(M^\perp) \subset M^\perp$.*

Dowód. Niech $x \in M^\perp$. Dla $y \in M$ mamy $Ty \in M$, więc

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle = 0.$$

To oznacza, że $Tx \in M^\perp$. \square

Z lematu mamy $T(\mathcal{H}_0^\perp) \subset \mathcal{H}_0^\perp$. Niech \tilde{T} oznacza operator T ograniczony do podprzestrzeni niezmienniczej \mathcal{H}_0^\perp . Operator \tilde{T} jest nadal samosprężony. \tilde{T} nie posiada wartości własnych, bo wszystkie wektory własne zostały uwzględnione w \mathcal{H}_0 . Operator ten jest też zwarty. Zatem $\sigma(\tilde{T}) = \{0\}$. Tzn. promień spektralny $r(\tilde{T})$ jest zerowy. Ale z samosprężności mamy

$$\|\tilde{T}\| = r(\tilde{T}) = 0.$$

Czyli $\tilde{T} = 0$. Otrzymujemy sprzeczność za wyjątkiem sytuacji $\mathcal{H}_0^\perp = \{0\}$. Zatem

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n=1}^N E_n \oplus E_0.$$

Wiemy, że $\dim E_n < \infty$. W każdej podprzestrzeni E_n wybieramy bazę ortonormalną. Połączenie tych zbiorów da nam bazę ortonormalną całej przestrzeni \mathcal{H} . Ustawmy elementy bazy w ciąg $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$. Wtedy $T\varphi_n = \mu_n\varphi_n$, dla pewnych liczb $\mu_n \in \sigma(T)$. Ponieważ elementy φ_n dążą słabo do zera, to $\mu_n \xrightarrow{n} 0$. \square

Uwaga 4.21. Dla $x \in \mathcal{H}$ mamy

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n.$$

Zatem

$$Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, \varphi_n \rangle T\varphi_n = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n.$$

Twierdzenie 4.22. Dla operatora zwarteo $T \in B(\mathcal{H})$ istnieją układy ortonormalne $\{\varphi_n\}_{n=1}^N$, $\{\psi_n\}_{n=1}^N$ oraz liczby dodatnie $\{\lambda_n\}_{n=1}^N$ takie, że

$$Tx = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle x, \varphi_n \rangle \psi_n.$$

Dowód. Stosujemy rozkład polarny $T = U|T|$. Wartości własne operatora $|T|$ są nieujemne. Rzeczywiście, jeśli $A \geq 0$ oraz $Ax = \lambda x$, dla $x \neq 0$, to

$$0 \leq \langle Ax, x \rangle = \lambda \|x\|^2.$$

Zatem $\lambda \geq 0$. Z poprzedniego twierdzenia istnieje baza ortonormalna $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ taka, że

$$|T|x = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n.$$

Zatem

$$Tx = U|T|x = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n \langle x, \varphi_n \rangle U\varphi_n = \sum_{\substack{n=1 \\ \mu_n \neq 0}}^{\infty} \mu_n \langle x, \varphi_n \rangle U\varphi_n.$$

Dla $\mu_n \neq 0$ oznaczmy $U\varphi_n = \psi_n$. Mamy $|T|\varphi_n = \mu_n\varphi_n$. Stąd $\varphi_n \in \text{Im } |T|$. Wiemy, że U jest izometrią na $\text{Im } |T|$. Zatem

$$\langle \psi_n, \psi_m \rangle = \langle U\psi_n, U\psi_m \rangle = \langle \varphi_n, \varphi_m \rangle = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 1, & n = m. \end{cases}$$

Stąd układ $\{\psi_n\}_{n=1, \mu_n \neq 0}^{\infty}$ jest ortonormalny. Niezerowe liczby μ_n ustawiamy w ciąg $\{\lambda_n\}_{n=1}^N$, aby uzyskać tezę twierdzenia. \square

Uwaga 4.23. Gdy $N = \infty$, to $\lambda_n \rightarrow 0$.

Definicja 4.24. Wielkości λ_n nazywamy liczbami singularnymi operatora zwartego T . Możemy założyć, że $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \dots$.

Twierdzenie 4.25 (Zasada minimaksu). Dla operatora zwartego T w przestrzeni Hilberta n -ta liczba singularna wyraża się wzorem

$$\lambda_n = \min_{\substack{V \subset \mathcal{H} \\ \dim V = n-1}} \max_{\substack{x \in V^\perp \\ \|x\|=1}} \|Tx\|.$$

Dowód. Niech

$$Tx = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle x, \varphi_n \rangle \psi_n, \quad \lambda_n \searrow 0.$$

Oznaczmy $V_n = \text{lin}\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}\}$. Mamy

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle = \langle |T|^2x, x \rangle = \langle |T|x, |T|x \rangle = \||T|x\|^2$$

Wtedy element $x \in V_n^\perp$ ma postać

$$x = \sum_{k=n}^N \langle x, \varphi_k \rangle \varphi_k + x_0, \quad \text{gdzie } x_0 \in \ker T = \ker |T|.$$

Zatem

$$|T|x = \sum_{k=n}^N \lambda_k \langle x, \varphi_k \rangle \varphi_k.$$

Z nierówności Bessela otrzymujemy

$$\|Tx\|^2 = \sum_{k=n}^N \lambda_k^2 |\langle x, \varphi_k \rangle|^2 \leq \lambda_n^2 \sum_{k=n}^N |\langle x, \varphi_k \rangle|^2 \leq \lambda_n^2 \|x\|^2.$$

W rezultacie

$$\|Tx\| = \| |Tx| \| \leq \lambda_n \|x\| \leq \lambda_n, \quad \text{dla } \|x\| \leq 1.$$

To daje nierówność „ \leq ” we wzorze tezy twierdzenia.

Dla dowodu przeciwnej nierówności niech $V < \mathcal{H}$ będzie podprzestrzenią wymiaru $n - 1$. Wtedy istnieje wektor $x \in V_{n+1}$ taki, że $x \perp V$ oraz $\|x\| = 1$. Dalej

$$Tx = \sum_{k=1}^N \lambda_k \langle x, \varphi_k \rangle \varphi_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x, \varphi_k \rangle \varphi_k.$$

Zatem

$$\|Tx\|^2 = \| |Tx| \|^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2 |\langle x, \varphi_k \rangle|^2 \geq \lambda_n^2 \sum_{k=1}^n |\langle x, \varphi_k \rangle|^2 = \lambda_n^2 \|x\|^2 = \lambda_n^2.$$

Stąd $\max_{\substack{x \in V^\perp \\ \|x\|=1}} \|Tx\| \geq \lambda_n$. Biorąc kres dolny względem V otrzymujemy

$$\min_{\substack{V < \mathcal{H} \\ \dim V = n-1}} \max_{\substack{x \in V^\perp \\ \|x\|=1}} \|Tx\| \geq \lambda_n.$$

□

Uwaga 4.26. Jeśli $\lambda_n < \lambda_{n-1}$ oraz $V \neq V_n$ i $\dim V = n - 1$, to

$$\max_{\substack{x \in V^\perp \\ \|x\|=1}} \|Tx\| > \lambda_n.$$

Tzn. $V = V_n$ jest jedyną podprzestrzenią, dla której osiągnięte jest minimum.

Uwaga 4.27. Prawdziwy jest też inny wzór

$$\lambda_n = \max_{\substack{V < \mathcal{H} \\ \dim V = n}} \max_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} \|Tx\|.$$

Wniosek 4.28. Jeśli T jest operatorem zwartym, to $\|T\| = \|Tx_0\|$ dla pewnego elementu $x_0 \in \mathcal{H}$ takiego, że $\|x_0\| = 1$.

Dowód. Istotnie, z zasady minimaksu wynika, że

$$\lambda_1 = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \|T\|.$$

Liczba λ_1 jest największą wartością własną operatora $|T|$. Niech $x_0 \in \mathcal{H}$ będzie odpowiadającym jednostkowym wektorem własnym. Wtedy

$$\|Tx_0\| = \||T|x_0\| = \lambda_1\|x_0\| = \lambda_1 = \|T\|.$$

□

Uwaga 4.29. *Wniosek można udowodnić bezpośrednio. Mamy $\|T\| = \lim_n \|Tx_n\|$ dla pewnego ciągu wektorów spełniających $\|x_n\| = 1$. Na podstawie Twierdzenia Banacha-Alaoglu z ciągu x_n można wybrać podciąg słabo zbieżny. Niech $x_n \xrightarrow{s} x_0$. Wtedy $\|x_0\| \leq 1$. Ponadto $x_n - x_0 \xrightarrow{s} 0$. Zatem $Tx_n - Tx_0 \rightarrow 0$ w normie przestrzeni \mathcal{H} . To oznacza, że $\|Tx_0\| = \lim_n \|Tx_n\| = \|T\|$. Ponieważ $\|T\| = \|Tx_0\| \leq \|T\|\|x_0\|$, to $\|x_0\| \geq 1$. Czyli $\|x_0\| = 1$.*

Definicja 4.30. *Operator $T \in B(\mathcal{H})$ nazywamy operatorem Hilberta-Schmidta jeśli dla pewnej bazy ortonormalnej $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ mamy $\sum_{n=1}^\infty \|Te_n\|^2 < \infty$. Klasę tych operatorów oznaczamy symbolem HS.*

Przykład 4.31. Niech $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ będzie odwzorowaniem liniowym z macierzą $a_{ij} = \langle Te_j, e_i \rangle$, gdzie $\{e_n\}_{n=1}^N$ oznacza standardową bazę w przestrzeni \mathbb{C}^N . Wtedy

$$\sum_{n=1}^N \|Te_n\|^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}|^2,$$

tnz. otrzymujemy sumę kwadratów wartości bezwzględnych wszystkich wyrazów macierzy.

Przykład 4.32. *Rozważmy odwzorowanie liniowe $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$. Oznaczmy $a_{ij} = \langle Te_j, e_i \rangle$, gdzie $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ oznacza standardową bazę w przestrzeni ℓ^2 . Wtedy*

$$\sum_{n=1}^\infty \|Te_n\|^2 = \sum_{i=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty |a_{ij}|^2.$$

Twierdzenie 4.33. *Wielkość $\sum_{n=1}^\infty \|Te_n\|^2$ nie zależy od wyboru bazy ortonormalnej. Ponadto jeśli $T \in HS$, to $T^* \in HS$.*

Dowód. Niech $\{f_m\}_{m=1}^{\infty}$ będzie dowolną bazą ortonormalną przestrzeni \mathcal{H} . Wtedy z równości Parsewala mamy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |\langle Te_n, f_m \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |\langle e_n, T^* f_m \rangle|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \|T^* f_m\|^2. \quad (4.6)$$

Podstawiając $\{f_m\}_{m=1}^{\infty} = \{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ otrzymamy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|T^* e_n\|^2. \quad (4.7)$$

Dalej stosujemy (4.6) do operatora T^* i (4.7) do bazy $\{f_m\}_{m=1}^{\infty}$, aby uzyskać

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|T^* e_n\|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \|(T^*)^* f_m\|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \|Tf_m\|^2.$$

□

Twierdzenie 4.34. *Każdy operator Hilberta-Schmidta jest zwarty. Ponadto liczby singularne operatora Hilberta-Schmidta są sumowalne z kwadratem.*

Dowód. Możemy założyć, że operator T jest nieskończenie wymiarowy, no teza jest w oczywisty sposób spełniona dla operatora skończenie wymiarowego. Ustalmy bazę ortonormalną $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$. Dla operatora $T \in HS$ rozważmy operatory

$$T_N x = \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle T e_n.$$

Tzn. $T_N = TP_N$, gdzie P_N jest rzutem ortogonalnym na podprzestrzeń $\text{lin}\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$. Operator T_N jest skończenie wymiarowy, więc jest zwarty. Mamy

$$Tx = T \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle T e_n.$$

Zatem z nierówności Schwarzera mamy

$$\begin{aligned} \|Tx - T_N x\|^2 &= \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle T e_n \right\|^2 \leq \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle| \|T e_n\| \right)^2 \\ &\leq \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \right) \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \|T e_n\|^2 \right) \leq \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \|T e_n\|^2 \right) \|x\|^2. \end{aligned}$$

Stąd

$$\|T - T_N\| \leq \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \|Te_n\|^2 \right)^{1/2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Zatem T jest zwarty jako granica w normie operatorowej operatorów skończenie wymiarowych.

Wiemy, że

$$|T|x = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n,$$

gdzie $\lambda_n \searrow 0$ oraz $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest bazą ortonormalną obrazu operatora $|T|$. Niech $\{f_k\}_{k=1}^K$ będzie bazą ortonormalną dla $\ker |T| = \ker T$. Wtedy układ $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \cup \{f_k\}_{k=1}^K$ jest bazą ortonormalną całej przestrzeni \mathcal{H} . Ponadto

$$\infty > \sum_{n=1}^{\infty} \|T\varphi_n\|^2 + \sum_{k=1}^K \|Tf_k\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|T\varphi_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2.$$

□

Twierdzenie 4.35. *Operatory Hilberta-Schmidta tworzą ideał.*

Dowód. Niech $T, S \in HS$. Dla bazy ortonormalnej $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ na podstawie nierówności trójkąta w ℓ^2 mamy

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|(T+S)e_n\|^2 \right)^{1/2} &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n + Se_n\|^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} (\|Te_n\| + \|Se_n\|)^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n\|^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|Se_n\|^2 \right)^{1/2} < \infty. \end{aligned}$$

Czyli $T + S \in HS$. Niech $T \in HS$ oraz $S \in B(\mathcal{H})$. Wtedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|STe_n\|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|S\|^2 \|Te_n\|^2 = \|S\|^2 \sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n\|^2 < \infty,$$

co oznacza $ST \in HS$. Z Twierdzenia 4.33 mamy $T^* \in HS$. Zatem $S^*T^* \in HS$. Znowu z Twierdzenia 4.33 otrzymujemy $TS = (S^*T^*)^* \in HS$. □

Uwaga 4.36. Operatory HS z normą

$$\|T\|_{HS} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|Te_n\|^2 \right)^{1/2}$$

tworzą unormowaną przestrzeń liniową, w której norma pochodzi od iloczynu skalarnego

$$\langle T, S \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle T e_n, S e_n \rangle.$$

Można udowodnić, że przestrzeń HS jest zupełna, czyli jest przestrzenią Hilberta.

5 Operatory unitarne

Operator $U \in B(\mathcal{H})$ nazywamy unitarnym, jeśli $UU^* = U^*U = I$, tzn. $U^* = U^{-1}$. Mamy $\|U\|^2 = \|U^*U\| = \|I\| = 1$. Zatem spektrum $\sigma(U) \subseteq \{z : |z| \leq 1\}$. Ale dla $|z| < 1$ mamy

$$zI - U = zUU^* - U = -U(I - zU^*).$$

Zatem operator $zI - U$ jest odwracalny. Ostatecznie otrzymujemy, że

$$\sigma(U) \subseteq \{z : |z| = 1\} = \mathbb{T}.$$

Definicja 5.1. Wielomianem trygonometrycznym nazywamy wyrażenie postaci

$$p(z) = \sum_{k=-m}^n a_k z^k,$$

gdzie $a_k \in \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{T}$. Wielomian sprzężony $\bar{p}(z)$ określamy wzorem

$$\bar{p}(z) = \overline{p(z)} = \sum_{k=-m}^n \bar{a}_k z^{-k}$$

(Uwaga: $\bar{z} = z^{-1}$ dla $z \in \mathbb{T}$).

Dla operatora unitarnego U oraz wielomianu trygonometrycznego $p(z)$ określamy

$$p(U) = \sum_{k=-m}^n a_k z^k, \quad \text{gdzie } U^0 = I.$$

Lemat 5.2.

- (i) $(p + q)(U) = p(U) + q(U)$.

- (ii) $p(U)^* = \bar{p}(U)$.
 (iii) $(pq)(U) = p(U)q(U)$.
 (iv) $p(U)$ jest operatorem normalnym.

Dowód.

(ii) Mamy $p(U)^* = \sum_{k=-m}^n \bar{a}_k U^{-k} = \bar{p}(U)$.

(iii) Niech $q(U) = \sum_{l=-m'}^{n'} b_l z^l$. Wtedy

$$(pq)(U) = \left(\sum_{k=-m}^n \sum_{l=-m'}^{n'} a_k b_l z^{k+l} \right) (U) = \sum_{k=-m}^n \sum_{l=-m'}^{n'} a_k b_l U^{k+l} = p(U)q(U).$$

Ponieważ $p(z)q(z) = q(z)p(z)$, to $p(U)q(U) = q(U)p(U)$.

(iv) Mamy

$$p(U)p(U)^* = p(U)\bar{p}(U) = |p|^2(U) = \bar{p}(U)p(U) = p(U)^*p(U).$$

□

Twierdzenie 5.3. *Mamy $\sigma(p(U)) = p(\sigma(U))$.*

Dowód. Załóżmy, że $\mu \in \sigma(p(U))$. Wtedy z zasadniczego twierdzenia algebry otrzymujemy

$$\mu I - p(z) = z^{-n}[z^n \mu - z^n p(z)] = cz^{-n}(z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \dots (z - \lambda_N). \quad (5.1)$$

Zatem

$$\mu I - p(U) = cU^{-n}(U - \lambda_1 I)(U - \lambda_2 I) \dots (U - \lambda_N I).$$

Lewa strona jest operatorem nieodwracalnym. Zatem przynajmniej jeden z operatorów $U - \lambda_j I$ jest nieodwracalny. Wtedy $\lambda_j \in \sigma(U)$. W szczególności $\lambda_j \neq 0$. Podstawiając $z = \lambda_j$ w (5.1) otrzymamy $\mu = p(\lambda_j) \in p(\sigma(U))$. Udowodniliśmy więc zawieranie $\sigma(p(U)) \subseteq p(\sigma(U))$.

Niech teraz $\mu \in p(\sigma(U))$, tzn. $\mu = p(\lambda)$ dla pewnej liczby $\lambda \in \sigma(U)$. Wtedy

$$\begin{aligned} p(\lambda)I - p(U) &= \sum_{k=-m}^n a_k (\lambda^k I - U^k) = \sum_{k=1}^n a_k (\lambda^k I - U^k) + \sum_{k=1}^m a_{-k} (\lambda^{-k} U^{-k} (U^k - \lambda^k I)) \\ &= (\lambda I - U)V + V(\lambda I - U), \quad (5.2) \end{aligned}$$

dla pewnego operatora V . Pokażemy, że $p(\lambda) \in \sigma(p(U))$. Załóżmy nie wprost, że operator $p(\lambda)I - p(U)$ jest odwracalny. Niech A oznacza operator odwrotny do $p(\lambda)I - p(U)$. Wtedy z (5.2) otrzymamy

$$(\lambda I - U)VA = AV(\lambda I - U) = I,$$

co oznacza, że operator $\lambda I - U$ jest odwracalny, co przeczy założeniu $\lambda \in \sigma(U)$. W rezultacie udowodniliśmy, że $p(\sigma(U)) \subseteq \sigma(p(U))$. \square

Wniosek 5.4. $\|p(U)\| = \max\{|p(z)| : z \in \sigma(U)\} = \|p\|_{C(\sigma(U))}$.

Dowód. Ponieważ operator $p(U)$ jest normalny, to

$$\begin{aligned} \|p(U)\| &= \max\{|\mu| : \mu \in \sigma(p(U))\} \\ &= \max\{|\mu| : \mu \in p(\sigma(U))\} = \max\{|p(z)| : z \in \sigma(U)\} \end{aligned}$$

\square

Wniosek 5.5. *Jeśli $p(z) \geq 0$ dla $z \in \mathbb{T}$, to $p(U) \geq 0$.*

Dowód. Załóżmy, że $0 \leq p(z) \leq 1$. Określmy $q(z) = 2p(z) - 1$. Wtedy $q(z)$ jest wielomianem rzeczywistym oraz $|q(z)| \leq 1$. Z poprzedniego wniosku mamy $\|q(U)\| \leq 1$. Ponadto $q(U)^* = \bar{q}(U) = q(U)$, tzn. $q(U)$ jest operatorem samosprzężonym. Z Lematu 2.7 wynika, że $-I \leq q(U) \leq I$. W szczególności $2p(U) - I \geq -I$, czyli $p(U) \geq 0$. \square

Wniosek wynika też z następnego lematu.

Lemat 5.6 (Riesz-Fejér). *Założmy, że wielomian trygonometryczny $p(z)$ jest nieujemny dla $z \in \mathbb{T}$. Wtedy istnieje wielomian trygonometryczny $h(z)$ taki, że $p(z) = |h(z)|^2$.*

Dowód. Najpierw rozpatrzmy przypadek, gdy $p(z) > 0$ dla $|z| = 1$. Niech $p(z) = \sum_{k=-n}^n c_k z^k$. Z dodatniości otrzymujemy

$$p(z) = \overline{p(z)} = \sum_{k=-n}^n \bar{c}_k z^{-k} = \sum_{k=-n}^n \bar{c}_{-k} z^k.$$

Zatem $c_k = \bar{c}_{-k}$ dla dowolnego wskaźnika k . Zauważmy, że stąd wynika $c_n \neq 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $c_{-n} \neq 0$.

Założmy, że $c_{-n} \neq 0$. Określmy $G(z) = z^n p(z)$. Wtedy $G(z)$ jest zwykłym wielomianem stopnia $2n$. Wielomian $G(z)$ nie zeruje się na okręgu $|z| = 1$. Pokażemy, że

$$G(z) = z^{2n} \overline{G(\bar{z}^{-1})}, \quad \text{dla } z \neq 0, z \in \mathbb{C}. \quad (5.3)$$

Nietrudno zauważyć, że obie strony są wielomianami zmiennej z . Wystarczy zatem sprawdzić równość dla $|z| = 1$. Dla $|z| = 1$ mamy $p(z) = \overline{p(\bar{z})}$. Zatem $z^{-n} G(z) = z^n \overline{G(z)}$. Ponieważ $z = \bar{z}^{-1}$, to po przekształceniu otrzymujemy (5.3).

Rozkładamy wielomian $G(z)$ na czynniki liniowe

$$G(z) = c \prod_{j=1}^r (z - \alpha_j) \prod_{k=1}^s (z - \beta_k),$$

gdzie $|\alpha_j| < 1$ i $|\beta_k| > 1$, oraz $r + s = 2n$. Ze wzoru (5.3) wynika, że jeśli α jest pierwiastkiem wielomianu $G(z)$, to również $(\bar{\alpha})^{-1}$ jest pierwiastkiem i to tej samej krotności. To oznacza, że pierwiastki α_j i β_k można połączyć w pary, czyli

$$G(z) = c \prod_{j=1}^n (z - \alpha_j) \prod_{j=1}^n (z - (\bar{\alpha}_j)^{-1}),$$

Zatem

$$p(z) = z^{-n} G(z) = c_n \prod_{j=1}^n (z - \alpha_j) \prod_{j=1}^n (\bar{z} - \bar{\alpha}_j) = c \left| \prod_{j=1}^n (z - \alpha_j) \right|^2.$$

W szczególności $c > 0$. Teza jest spełniona dla $h(z) = \sqrt{c} \prod_{j=1}^n (z - \alpha_j)$.

Założmy, że $p(z) \geq 0$ dla $|z| = 1$. Wtedy $p_N(z) = p(z) + \frac{1}{N} > 0$ dla $|z| = 1$. Z pierwszej części dowodu istnieją wielomiany $h_N(z)$, których stopień jest wspólnie ograniczony, takie, że $p_N(z) = |h_N(z)|^2$. Współczynniki wielomianów h_N są również wspólnie ograniczone, bo

$$|h_N(z)|^2 \leq |p(z)| + 1.$$

Zatem z ciągu $h_N(z)$ można wybrać zbieżny podciąg do wielomianu $h(z)$, który spełnia $p(z) = |p(z)|^2$ dla $|z| = 1$. \square

Powracamy do alternatywnego dowodu Wniosku 5.5 Mamy

$$p(U) = |h|^2(U) = (\bar{h}h)(U) = \bar{h}(U)h(U) = h(U)^*h(U) \geq 0.$$

Dotychczas potrafiliśmy określić $p(U)$, gdzie p jest wielomianem trygonometrycznym. Naszym celem jest zdefiniowanie $f(U)$, gdzie f jest funkcją ciągłą określoną na zbiorze $\sigma(U) \subset \mathbb{T}$. Z twierdzenia Tietzego funkcję f możemy rozszerzyć do funkcji ciągłej $F : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ tak, że

$$\sup_{|z| \leq 1} |F(z)| = \sup_{z \in \sigma(U)} |(f)(z)|.$$

Z twierdzenia Weierstrassa można znaleźć ciąg wielomianów trygonometrycznych $p_n(z)$ zbieżny jednostajnie do funkcji $F(z)$ dla $|z| = 1$. Pokażemy, że

- (1) Ciąg operatorów $p_n(U)$ jest zbieżny w normie operatorowej.
- (2) Granica ciągu $p_n(U)$ nie zależy od wyboru wielomianów p_n .
- (3) Granica ciągu $p_n(U)$ nie zależy od wyboru rozszerzenia F .

Dowód. Mamy

$$\begin{aligned} \|p_n(U) - p_m(U)\| &= \|(p_n - p_m)(U)\| = \max_{z \in \sigma(U)} |p_n(z) - p_m(z)| \leq \max_{|z|=1} |p_n(z) - p_m(z)| \\ &\leq \max_{|z|=1} |p_n(z) - F(z)| + \max_{|z|=1} |F(z) - p_m(z)| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Ciąg operatorów $p_n(U)$ spełnia warunek Cauchy'ego. Zatem jest zbieżny. Załóżmy, że również inny ciąg wielomianów q_n jest zbieżny jednostajnie do F . Wtedy ciąg naprzemienny

$$p_1, q_1, p_2, q_2, \dots, p_n, q_n, \dots$$

jest też zbieżny jednostajnie do funkcji F . Z pierwszej części dowodu wynika, że ciąg operatorów

$$p_1(U), q_1(U), p_2(U), q_2(U), \dots, p_n(U), q_n(U), \dots$$

jest zbieżny. To oznacza, że ciągi $p_n(U)$ i $q_n(U)$ są zbieżne do tego samego operatora.

Oznaczmy symbolem \tilde{F} inne ciągłe rozszerzenie funkcji f do okręgu $|z| = 1$. Niech q_n będzie ciągiem wielomianów zbieżnym jednostajnie do \tilde{F} na okręgu

\mathbb{T} . Z pierwszej części dowodu wiemy, że ciąg operatorów $q_n(U)$ jest zbieżny. Ponadto mamy

$$\begin{aligned} \|p_n(U) - q_n(U)\| &= \|(p_n - q_n)(U)\| = \max_{z \in \sigma(U)} |p_n(z) - q_n(z)| \\ &\leq \max_{z \in \sigma(U)} |p_n(z) - f(z)| + \max_{z \in \sigma(U)} |q_n(z) - f(z)| \\ &\leq \max_{|z|=1} |p_n(z) - F(z)| + \max_{|z|=1} |q_n(z) - \tilde{F}(z)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

□

Wcześniejsze rozumowanie pokazuje, że granica $p_n(U)$ zależy jedynie od funkcji ciągłej f na spektrum operatora unitarnego U . Przyjmujemy oznaczenie

$$f(U) = \lim_n p_n(U).$$

Uwaga 5.7. Jeśli f jest wielomianem trygonometrycznym, np. $f(z) = z^k$, to $f(U) = U^k$.

Twierdzenie 5.8. Niech $f, g \in C(\sigma(U))$. Wtedy

- (i) $(f + g)(U) = f(U) + g(U)$.
- (ii) $(fg)(U) = f(U)g(U) = g(U)f(U)$.
- (iii) $f(U)^* = \bar{f}(U)$.
- (iv) $\|f(U)\| = \max_{z \in \sigma(U)} |f(z)|$.
- (v) $\sigma(f(U)) = f(\sigma(U))$.

Uwaga 5.9. Twierdzenie mówi, że rodzina operatorów $\{f(U) : f \in C(\sigma(U))\}$ tworzy algebrę ze sprzężeniem i normą operatorową. Tę algebrę można utożsamić z algebrą $C(\sigma(U))$.

Dowód.

(i) Niech p_n i q_n będą jednostajnie zbieżnymi ciągami wielomianów trygonometrycznych takimi, że $p_n(z) \xrightarrow{n} f(z)$ oraz $q_n(z) \xrightarrow{n} g(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Wtedy

$$\begin{aligned} f(U) + g(U) &= \lim_n p_n(U) + \lim_n q_n(U) = \lim_n [p_n(U) + q_n(U)] \\ &= \lim_n (p_n + q_n)(U) = (f + g)(U), \end{aligned}$$

bo ciąg wielomianów $p_n + q_n$ jest jednostajnie zbieżny oraz $p_n(z) + q_n(z) \xrightarrow{n} f(z) + g(z)$ dla $z \in \sigma(U)$.

(ii) Przy oznaczeniach jak w (i) mamy

$$f(U)g(U) = \lim_n p_n(U) \lim_n q_n(U) = \lim_n p_n(U)q_n(U) = \lim_n (p_n q_n)(U) = (fg)(U),$$

bo ciąg wielomianów $p_n q_n$ jest zbieżny jednostajnie oraz $p_n(z)q_n(z) \xrightarrow{n} f(z)g(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Dalej $g(U)f(U) = (gf)(U) = (fg)(U) = f(U)g(U)$.

(iii) Jeśli p_n jest zbieżny jednostajnie oraz $p_n(z) \xrightarrow{n} f(z)$ dla $z \in \sigma(U)$, to ciąg $\overline{p_n}$ jest też zbieżny jednostajnie oraz $\overline{p_n}(z) \rightarrow \overline{f}(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Zatem z Lematu 5.2(ii) mamy

$$\overline{f}(U) = \lim_n \overline{p_n}(U) = \lim_n p_n(U)^* = f(U)^*.$$

(iv) Przy oznaczeniach jak w (i), na podstawie Wniosku 5.4 otrzymujemy

$$\|f(U)\| = \lim_n \|p_n(U)\| = \lim_n \max_{z \in \sigma(U)} |p_n(z)| = \max_{z \in \sigma(U)} \|f(z)\|.$$

(v) Niech $\mu \notin f(\sigma(U))$. Rozważmy funkcję $g(z) = [\mu - f(z)]^{-1}$. Mamy $g \in C(\sigma(U))$. Z własności (ii) otrzymujemy

$$g(U)(\mu - f)(U) = (\mu - f)(U)g(U) = [(\mu - f)g](U) = 1(U) = I.$$

To oznacza, że operator $(\mu - f)(U) = \mu I - f(U)$ jest odwracalny. Czyli $\mu \notin \sigma(f(U))$. Zatem $\sigma(f(U)) \subseteq f(\sigma(U))$. Niech teraz $\mu \in f(\sigma(U))$. Tzn. $\mu = f(\lambda)$ dla pewnej liczby $\lambda \in \sigma(U)$. Wybierzmy jednostajnie zbieżny ciąg wielomianów trygonometrycznych p_n taki, że $p_n(z) \xrightarrow{n} f(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Wiemy, że operator $p_n(\lambda)I - p_n(U)$ nie jest odwracalny dla $\lambda \in \sigma(U)$ (por. Twierdzenie 5.3). Ale

$$p_n(\lambda)I - p_n(U) \xrightarrow{n} f(\lambda)I - f(U)$$

w normie operatorowej. Zbiór operatorów odwracalnych jest otwarty w $B(\mathcal{H})$, więc zbiór operatorów nieodwracalnych jest domknięty. Zatem operator $f(\lambda)I - f(U)$ nie jest odwracalny. To oznacza, że $\mu = f(\lambda) \in \sigma(f(U))$. Czyli $f(\sigma(U)) \subseteq \sigma(f(U))$. \square

Twierdzenie 5.10. *Jeśli funkcja $f \in C(\sigma(U))$ jest nieujemna, to $f(U) \geq 0$.*

Dowód. Załóżmy, że $0 \leq f(z) \leq 2$ dla $z \in \sigma(U)$. Wtedy funkcja $g(z) = f(z) - 1$ spełnia $|g(z)| \leq 1$. Z Twierdzenia 5.8(iii), (iv) mamy $\|g(U)\| \leq 1$ oraz $g(U)^* = g(U)$. Zatem $-I \leq g(U) \leq I$. Wtedy

$$f(U) = g(U) + I \geq 0.$$

□

Naszym kolejnym celem jest określenie operatora $f(U)$ dla pewnych funkcji nieciągłych f określonych na $\sigma(U)$. Na przykład niech $f(z)$ przyjmuje wartość jeden na otwartym łuku okręgu jednostkowego oraz wartość zero w pozostałych punktach okręgu. Funkcję f można uzyskać jako granicę rosnącego ciągu funkcji nieujemnych i ciągłych $f_n \in C(\mathbb{T})$. Ta własność umożliwia określenie operatora $f(U)$.

Niech f_n będzie ciągiem nieujemnych funkcji ciągłych takim, że $f_n(z) \nearrow f(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Załóżmy, że funkcje $f_n(z)$ są wspólnie ograniczone na $\sigma(U)$, np. przez stałą $c > 0$. Mamy $0 \leq f_n(z) \leq f_{n+1}(z) \leq c$. Zatem $0 \leq f_n(U) \leq f_{n+1}(U) \leq cI$. Ciąg operatorów $f_n(U)$ jest wtedy rosnący i ograniczony. Zatem ciąg $f_n(U)$ jest mocno (punktowo) zbieżny. Oznaczmy mocną granicę symbolem A , tzn. niech

$$Av = \lim_N f_n(U)v, \quad v \in \mathcal{H}.$$

Mocna granica A nie zależy tylko od funkcji f a nie od wyboru ciągu f_n . Rzeczywiście, niech $g_n \in C(\sigma(U))$ oraz $g_n(z) \nearrow f(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Mamy $g_n(z) \leq c$, bo $f(z) \leq c$ dla $z \in \sigma(U)$. Zatem ciąg operatorów $g_n(U)$ jest też mocno zbieżny na podstawie wcześniejszego rozumowania dla ciągu $f_n(U)$. Niech

$$Bv = \lim_n g_n(U)v, \quad v \in \mathcal{H}.$$

Chcemy pokazać, że $A = B$. Dla liczby naturalnej k określmy funkcje

$$h_n(z) = \min\{f_n(z), g_k(z)\}, \quad z \in \sigma(U).$$

Mamy $h_n \in C(\sigma(U))$. Ponadto

$$0 \leq h_n(z) \nearrow g_k(z), \quad z \in \sigma(U).$$

Ponieważ funkcja g_k jest ciągła na zbiorze $\sigma(U)$, to z twierdzenia Diniego wnioskujemy, że $h_n \rightrightarrows g_k$, gdy $n \rightarrow \infty$. Zatem $h_n(U) \xrightarrow{n} g_k(U)$ w normie

operatorowej na podstawie Twierdzenia 5.8(iv). Dalej mamy $h_n(z) \leq f_n(z)$, więc $h_n(U) \leq f_n(U)$ z Twierdzenia 5.10. Przechodząc do mocnej granicy, gdy $n \rightarrow \infty$, otrzymujemy $g_k(U) \leq A$. Następnie przechodzimy do mocnej granicy, gdy $k \rightarrow \infty$, aby otrzymać $B \leq A$.

Uwaga 5.11. Skorzystaliśmy z faktu, że jeśli $0 \leq C_n \leq D_n$ oraz operatory C_n i D_n są słabo zbieżne do C i D odpowiednio, to $0 \leq C \leq D$. Rzeczywiście

$$\langle Dv, v \rangle - \langle Cv, v \rangle = \lim_n \langle D_n v, v \rangle - \lim_n \langle C_n v, v \rangle = \lim_n \langle (D_n - C_n)v, v \rangle \geq 0.$$

Twierdzenie 5.12. Niech f i g będą ograniczonymi funkcjami określonymi na $\sigma(U)$ będącymi granicami punktowymi rosnących i nieujemnych funkcji ciągłych określonych na $\sigma(U)$. Wtedy

- (i) $(f + g)(U) = f(U) + g(U)$.
- (ii) $(fg)(U) = f(U)g(U) = g(U)f(U)$.
- (iii) $f(U) \geq 0$.
- (iv) $\|f(U)\| = \sup_{z \in \sigma(U)} f(z)$.

Dowód.

(i) Niech f_n i g_n będą ciągami nieujemnych funkcji ciągłych takimi, że $f_n(z) \nearrow f(z)$ i $g_n(z) \nearrow g(z)$ dla $z \in \sigma(U)$. Wtedy $f_n(z) + g_n(z) \nearrow f(z) + g(z)$. Zatem ciągi operatorów $f_n(U)$, $g_n(U)$ oraz $(f_n + g_n)(U)$ są zbieżne mocno do operatorów $f(U)$, $g(U)$ i $(f + g)(U)$, odpowiednio. Ponadto z Twierdzenia 5.8(i) mamy

$$\begin{aligned} (f + g)(U) &= \lim_n (f_n + g_n)(U) = \lim_n [f_n(U) + g_n(U)] \\ &= \lim_n f_n(U) + \lim_n g_n(U) = f(U) + g(U). \end{aligned}$$

(ii) Przy oznaczeniach z (i) mamy $f_n(z)g_n(z) \nearrow f(z)g(z)$. Zatem ciąg operatorów $(f_n g_n)(U)$ jest mocno zbieżny do $(fg)(U)$. Zatem z Twierdzenia 5.8(ii) otrzymujemy

$$\begin{aligned} (fg)(U) &= \lim_n (f_n g_n)(U) = \lim_b f_n(U) g_n(U) \\ &= \lim_n f_n(U) \lim_n g_n(U) = f(U)g(U). \end{aligned}$$

(iii) Przy oznaczeniach z (i) mamy $f_n(U) \geq 0$, na podstawie Twierdzenia 5.10. Zatem $f(U) \geq 0$, jako mocna granica operatorów nieujemnych $f_n(U)$.

(iv) Oznaczmy $c = \sup_{z \in \sigma(U)} f(z)$. Jeśli f_n jest ciągiem nieujemnych funkcji ciągłych na $\sigma(U)$ takim, że $f_n(z) \nearrow f(z)$ dla $z \in \sigma(U)$, to $0 \leq f_n(z) \leq c$ dla $z \in \sigma(U)$. Wtedy z Twierdzenia 5.8(iv) mamy $\|f_n(U)\| \leq c$. Stąd $\|f(U)\| \leq c$. Otrzymaliśmy $\|f(U)\| \leq \sup_{z \in \sigma(U)} f(z)$.

Ponieważ $0 \leq f_n(U) \leq f(U)$, to $\|f_n(U)\| \leq \|f(U)\|$. Zatem z Twierdzenia 5.8(v) mamy

$$\|f(U)\| \geq \sup_{z \in \sigma(U)} f_n(z), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Zatem

$$\|f(U)\| \geq \sup_n \sup_{z \in \sigma(U)} f_n(z) = \sup_{z \in \sigma(U)} f(z).$$

□

6 Zadania

1. Pokazać, że jeśli operator liniowy T z przestrzeni Banacha X w przestrzeń Banacha Y jest ograniczony, to T przekształca ciągi słabo zbieżne do zera w X w ciągi słabo zbieżne do zera w Y . Pokazać, że implikacja odwrotna też jest prawdziwa. W dowodzie skorzystać z twierdzenia o wykresie domkniętym.
2. Określić funkcjonały δ_n na przestrzeni ℓ^∞ wzorem

$$\delta_n(\{c_k\}_{k=1}^\infty) = c_n.$$

Pokazać, że $\{\delta_n\}$ nie zawiera podciągu zbieżnego $*$ -słabo.

3. $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ jest gęstym podzbiorem kuli jednostkowej w przestrzeni unormowanej X . W przestrzeni X^* wprowadzamy metrykę

$$d(x^*, y^*) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} |x^*(x_n) - y^*(x_n)|$$

Pokazać, że $d(\cdot, \cdot)$ jest istotnie metryką. Pokazać, że $*$ -słaba topologia w kuli jednostkowej jest równoważna topologii wyznaczonej przez metrykę $d(\cdot, \cdot)$. * Czy topologie te są równoważne na całej przestrzeni X^* ?

4. Pokazać, że jeśli ciąg elementów x_n przestrzeni Hilberta jest słabo zbieżny do x oraz $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, to $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. Czy można to uogólnić na przestrzenie ℓ^p dla $p > 1$?
5. $p > 1$. Pokazać, że ciąg x_n w przestrzeni ℓ^p jest słabo zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy liczby $\|x_n\|_p$ są wspólnie ograniczone oraz dla każdego m ciąg $x_n(m)$ jest zbieżny.
6. W przestrzeni ℓ^p , $p > 1$ znaleźć ciąg słabo zbieżny, ale nie zbieżny w normie przestrzeni. * Pokazać, że w ℓ^1 każdy ciąg słabo zbieżny jest też zbieżny w normie.
7. Ciąg $\{x_n\}$ elementów przestrzeni unormowanej X jest słabo zbieżny do x . Pokazać, że istnieje ciąg postaci $\{\sum_{i=1}^{m_n} \lambda_{i,n} x_i\}$ (gdzie $\lambda_{i,n} \in \mathbb{C}$) zbieżny do x w normie. **Wskazówka:** Rozważyć najmniejszą domkniętą podprzestrzeń liniową Y zawierającą $\{x_n\}$. Zauważyć, że teza zadania jest równoważna $x \in Y$. Skorzystać z faktu, że jeśli $x \notin Y$ to istnieje funkcjonal ograniczony x^* taki, że $x^*(x) = 1$ oraz $x^*(y) = 0$ dla $y \in Y$.
8. Pokazać, że jeśli ciąg x_n jest słabo zbieżny do x , to $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.
9. Pokazać, że ciąg funkcji f_n jest słabo zbieżny do f w $L^p(0, 1)$ jeśli normy $\|f_n\|_p$ są wspólnie ograniczone oraz f_n jest zbieżny do f według miary, tzn.

$$\lim_n |\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| = 0,$$

dla dowolnego $\varepsilon > 0$. Pokazać, że odwrotna implikacja jest fałszywa.

10. Funkcja rzeczywista f na $[0, 1]$ spełnia warunek Höldera z wykładnikiem α , jeśli istnieje stała C taka, że $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$. Określmy

$$\|f\|_\alpha = \max |f(x)| + \sup \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

Pokazać, że dla $0 < \alpha \leq 1$, zbiór funkcji spełniających $\|f\|_\alpha \leq 1$ jest zwartym podzbiorem w $C[0, 1]$.

11. Funkcje g_n są ciągłe na $[0, 1]$. Czy z ciągu funkcji

$$f_n(x) = \int_0^1 \sqrt{1 + x - y} \sin\{g_n(y^2)\} dy$$

można wybrać podciąg zbieżny ?

12. Niech $K(x, y)$ będzie funkcją ciągłą na \mathbb{R}^2 taką, że

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |K(x, y)|^2 dx dy < \infty.$$

Niech $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$. Rozważmy równanie całkowe

$$u(x) = f(x) + \lambda \int_{-\infty}^{\infty} K(x, y)u(y)dy,$$

gdzie λ jest liczbą zespoloną. Pokazać, że równanie ma jednoznaczne rozwiązanie $u(x) \in L^2(\mathbb{R})$, jeśli λ ma odpowiednio małą wartość bezwzględną. **Wskazówka:** Do operatora

$$Tu(x) = f(x) + \lambda \int K(x, y)u(y) dy$$

na $L^2(\mathbb{R})$ zastosować twierdzenie o odwzorowaniach zwężających.

13. Podprzestrzeń Y przestrzeni unormowanej X nazywamy niezmienniczą dla operatora liniowego $T : X \rightarrow X$ jeśli $T(Y) \subset Y$. Znaleźć podprzestrzeń niezmienniczą operatora przesunięcia S określonego na ℓ^2 wzorem

$$S(x_0, x_1, x_2, \dots) = (0, x_0, x_1, x_2, \dots).$$

14. Dla $X = C[0, 1]$ i $g \in X$ określamy operator $T : X \rightarrow X$ wzorem $Tf = gf$ (mnożenie punktowe przez funkcję g). Pokazać, że operator T jest ograniczony. Znaleźć $\sigma(T)$.
15. Rozwiązać poprzednie zadanie w przypadku, gdy $X = L^2(0, 1)$ oraz $g \in C[0, 1]$.
16. Operator $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ jest określony wzorem

$$(Tx)_n = \lambda_n x_n,$$

gdzie λ_n jest ustalonym ciągiem ograniczonym. Znaleźć $\sigma(T)$ oraz $\sigma_p(T)$.

17. Korzystając z poprzedniego zadania pokazać, że istnieje operator $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, którego spektrum jest z góry zadany zwartym podzbiorem $K \subset \mathbb{C}$.
18. Niech $T \in B(X)$. Pokazać, że $\|R_\lambda(T)\| \rightarrow 0$, gdy $|\lambda| \rightarrow \infty$.

19. Niech $T : \ell^p \rightarrow \ell^p$, $1 \leq p \leq \infty$, będzie określony wzorem

$$T(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots).$$

Znaleźć spektrum T .

20. Dla $T \in B(\mathcal{H})$ pokazać, że $\sigma(T^*) = \overline{\sigma(T)}$.

21. T jest ograniczonym operatorem na przestrzeni Hilberta \mathcal{H} . Pokazać, że

- (a) T jest różnowartościowy wtedy i tylko wtedy, gdy obraz T^* jest gęsty;
- (b) T^* jest różnowartościowy wtedy i tylko wtedy, gdy obraz T jest gęsty;
- (c) Jeśli T jest "na", to istnieje $S : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ taki, że $TS = I$.
- (d) T ma domknięty obraz wtedy i tylko wtedy T^* ma domknięty obraz.

22. Dla $T, S \in B(X)$ oraz $\lambda \in \rho(S) \cap \rho(T)$ wyprowadzić wzór

$$R_\lambda(T) - R_\lambda(S) = R_\lambda(S)(T - S)R_\lambda(T).$$

23. Obliczyć normę operatora T określonego wzorem

$$Tf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(y) dy$$

w przestrzeni $L^2(0, 1)$. Znaleźć operator sprzężony. Pokazać, że istnieje ciąg funkcji $f_n \in L^2$ taki, że $f_n \rightarrow 0$ słabo, ale $\|Tf_n\|_2$ nie dąży do 0. Wskazówka. Zauważyć, że

$$Tf(x) = \int_0^1 f(xy) dy.$$

Skorzystać z nierówności

$$\left(\int_0^1 \left(\int_0^1 g(x, y) dy \right)^2 dx \right)^{1/2} \leq \int_0^1 \left(\int_0^1 g(x, y)^2 dx \right)^{1/2} dy.$$

Zbadać jak zachowuje się iloraz $\|f\|_2^{-1} \|Tf\|_2$ dla $f(x) = x^a$, gdy $a \rightarrow -1/2^+$.

24. T jest operatorem na $L^2(0, +\infty)$ określonym przez

$$Tf(x) = \int_0^{\infty} e^{-xy} f(y) dy.$$

Dowieść, że T jest ograniczonym operatorem na L^2 i znaleźć jego normę. Obliczyć T^* i pokazać, że operator TT^* zadany jest wzorem

$$(TT^*f)(x) = \int_0^{+\infty} f(y)(x+y)^{-1} dy.$$

Wskazówka. Zauważyć, że

$$Tf(x) = \frac{1}{x} \int_0^{\infty} e^{-y} f\left(\frac{y}{x}\right) dy.$$

Skorzystać z nierówności

$$\left(\int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} g(x, y) dy \right)^2 dx \right)^{1/2} \leq \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} g(x, y)^2 dx \right)^{1/2} dy.$$

Zbadać zachowanie się ilorazu $\|f\|_2^{-1} \|Tf\|_2$ dla $f(x) = x^{-1/2+\delta} e^{-\varepsilon x}$, gdy $\delta, \varepsilon \rightarrow 0^+$.

25. T jest operatorem na $L^2(0, 1)$ takim, że $\dim \operatorname{Im} T < +\infty$. Pokazać, że istnieje funkcja $K(x, y)$ z $L^2((0, 1) \times (0, 1))$ taka, że

$$Tf(x) = \int_0^1 K(x, y) f(y) dy.$$

Wskazówka. Niech $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ oraz będzie bazą ortonormalną dla $\operatorname{Im} T^*$. Pokazać, że

$$K(x, y) = \sum_{i=1}^n (T\varphi_i)(x) \varphi_i(y).$$

26. Pokazać, że jeśli A nie jest samosprężony na \mathcal{H} , to równość

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle|$$

nie musi zachodzić.

27. Operator T jest określony na $L^2(0, 1)$ wzorem

$$(Tf)(x) = \int_0^x f(y)dy.$$

Znaleźć jawny wzór całkowy dla operatorów $(zI - T)^{-1}$, gdzie $z \neq 0$. Skorzystać z faktu, że $(zI - T)^{-1} = \sum_0^\infty z^{-(n+1)}T^n$ i ze wzoru całkowego na T^n podanego na wykładzie. Znaleźć wzór dla operatora sprzężonego T^* .

28. Ograniczony operator T na przestrzeni Banacha X spełnia warunek $p(T) = 0$, dla pewnego wielomianu $p(z) = a_n z^n + \dots + a_0$. Pokazać, że spektrum operatora T jest zawarte w zbiorze pierwiastków wielomianu $p(z)$.

29. Dla funkcji zespolonej $k(x, y)$ dwu zmiennych na $[0, 1] \times [0, 1]$ określamy operator całkowy na $L^2(0, 1)$ wzorem

$$(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Znaleźć wzór dla K^* .

30. Ograniczony operator P na przestrzeni Banacha X nazywamy rzutem jeśli $P^2 = P$. Pokazać, że $\text{Im}P$ jest domknięty. Znaleźć spektrum dla P . Znaleźć wzór na operatory rezolwenty $(zI - P)^{-1}$.

31. Rzut P na przestrzeni Hilberta \mathcal{H} nazywamy ortogonalnym jeśli $Px \perp x - Px$ dla dowolnego $x \in \mathcal{H}$. Pokazać, że następujące trzy warunki są równoważne:

(a) P jest ortogonalny.

(b) $\|P\| \leq 1$.

(c) $P^* = P$.

32. P i Q są rzutami ortogonalnymi w przestrzeni Hilberta takimi, że $PQ = QP$. Pokazać, że każdy z operatorów $I - P$, $I - Q$, PQ , $P + Q - PQ$ i $P + Q - 2PQ$ jest rzutem ortogonalnym. Opisać obrazy tych rzutów za pomocą podprzestrzeni $M = \text{Im}P$ i $N = \text{Im}Q$.

33. Dla ograniczonego ciągu liczb zespolonych $\{\lambda_n\}$ określamy operator T na przestrzeni ℓ^2 wzorem

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \dots).$$

Znaleźć T^* oraz $(zI - T)^{-1}$.

34. Dla ograniczonej zespolonej funkcji ciągłej $g(x)$ na prostej określamy operator T na $L^2(\mathbb{R})$ wzorem $(Tf)(x) = g(x)f(x)$. Znaleźć spektrum operatora T i jego normę. Pokazać, że T jest operatorem normalnym. Przy jakich warunkach T jest samosprężony ?
35. Pokazać, że jeśli T jest operatorem normalnym w przestrzeni Hilberta \mathcal{H} , to T jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\|Tv\| \geq c\|v\|, \quad v \in \mathcal{H},$$

dla pewnej stałej $c > 0$.

36. Pokazać, że jeśli liczba z leży w spektrum operatora normalnego T , to liczba $|z|^2$ leży w spektrum operatora T^*T .
37. Niech $p(x, y)$ będzie wielomianem dwu zmiennych. Pokazać, że jeśli liczba z leży w spektrum operatora normalnego T , to liczba $p(z, \bar{z})$ leży w spektrum operatora $p(T, T^*)$.
38. U jest ograniczonym i odwracalnym odwzorowaniem liniowym z przestrzeni Banacha X na przestrzeń Banacha Y . T i S są operatorami ograniczonymi na przestrzeni X i Y odpowiednio, spełniającymi związek $S = UTU^{-1}$. Pokazać, że spektra operatorów S i T są równe.
39. Dla funkcji ciągłej $g(x)$ o okresie 2π określimy operator T na przestrzeni $L^2(0, 2\pi)$ wzorem

$$Tf(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(x-y)f(y)dy.$$

Pokazać, że T jest operatorem ograniczonym i $\|T\| \leq (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} |g(x)|dx$.

* Znaleźć spektrum operatora T . Wskazówka: Rozważyć odwzorowanie $U : L^2(0, 2\pi) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$

$$(Uf)(n) = \hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx} dx.$$

Pokazać, że $(UTf)(n) = \widehat{g}(n)\widehat{f}(n) = \widehat{g}(n)(Uf)(n)$. Wywnioskować, że UTU^{-1} jest operatorem mnożenia przez ciąg $\{\widehat{g}(n)\}_{-\infty}^{\infty}$ określonym na $\ell^2(\mathbb{Z})$. Skorzystać z zadań 7 i 9.

40. Niech T będzie operatorem samosprzężonym w przestrzeni Hilberta. Pokazać, że:

- (a) $\|T\| \leq 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\sigma(T) \subset [-1, 1]$.
 (b) $\sigma(T) \subset [0, +\infty)$ wtedy i tylko wtedy, gdy T jest operatorem dodatnim.

Wskazówka: W (a) skorzystać z faktu, że $r(T) = \|T\|$. W (b) można założyć, że $\|T\| \leq 1$. Wtedy $\sigma(T) \subset [0, 1]$. Zatem $\sigma(2T - I) \subset [-1, 1]$. Z (a) mamy, że $\|I - 2T\| \leq 1$. To pociąga $\langle x - 2Tx, x \rangle \leq \langle x, x \rangle$, dla $x \in \mathcal{H}$.

41. Dla operatora samosprzężonego T określamy

$$m = \inf\{\langle Tx, x \rangle : \|x\| = 1\} \quad M = \sup\{\langle Tx, x \rangle : \|x\| = 1\}.$$

Pokazać, że $\sigma(T) \subset [m, M]$ oraz $m.M \in \sigma(T)$. **Wskazówka:** Zauważyć, że operatory $T - mI$ oraz $MI - T$ są dodatnie.

42. Udowodnić, że jeśli ciąg $A_n \in B(\mathcal{H})$ jest słabo zbieżny, to również ciąg A_n^* jest słabo zbieżny. Pokazać, że stwierdzenie nie jest prawdziwe dla mocnej zbieżności.
43. (a) Niech $A_n, A \in B(\mathcal{H})$. Pokazać, że jeśli $A_n \geq 0$ oraz A_n jest zbieżny do A w normie operatorowej, to $A \geq 0$ oraz $\sqrt{A_n} \rightarrow \sqrt{A}$ w normie operatorowej.
 (b) Pokazać, że jeśli $A_n \geq 0$ oraz $A_n \rightarrow A$ mocno, to również $\sqrt{A_n} \rightarrow \sqrt{A}$ mocno.
 (c) Pokazać, że jeśli $A_n \rightarrow A$ w normie operatorowej, to $|A_n| \rightarrow |A|$ w normie operatorowej.
 (d) Pokazać, że jeśli $A_n \rightarrow A$ oraz $A_n^* \rightarrow A^*$ mocno, to również $|A_n| \rightarrow |A|$ mocno.
 (e) Pokazać na przykładzie, że poprzednie stwierdzenie nie jest prawdziwe dla słabej zbieżności operatorowej.

44. (a) Niech X i Y będą przestrzeniami Banacha. Pokazać, że jeśli dla $T_n \in B(X, Y)$ oraz $\{T_n x\}$ jest ciągiem Cauchy'ego dla każdego $x \in X$, to istnieje $T \in B(X, Y)$ taki, że $T_n \rightarrow T$ mocno.
- (b) Czy poprzednie stwierdzenie jest prawdziwe dla ciągów uogólnionych T_α ?
45. Niech $T_t : f(x) \mapsto f(x+t)$ będzie operatorem na $L^2(\mathbb{R})$. Znaleźć normę T_t . Do czego są zbieżne operatory T_t , gdy $t \rightarrow \infty$, i w jaki sposób ? Odpowiedzieć na te same pytania dla $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$.
46. Niech \mathcal{H} będzie nieskończenie wymiarową przestrzenią Hilberta.
- (a) Pokazać, że jeśli $A_n, B_n \in B(\mathcal{H})$ są mocno zbieżne do A i B odpowiednio to $A_n B_n$ jest mocno zbieżny do AB .
- (b) Pokazać na przykładzie, że jeśli $A_n, B_n \in B(\mathcal{H})$ są słabo zbieżne do A i B odpowiednio to $A_n B_n$ nie musi być słabo zbieżny do AB .
47. Niech T będzie operatorem określonym na ℓ^p , $1 \leq p < \infty$, wzorem

$$(Tx)_n = \lambda_n x_n, \quad x \in \ell^p.$$

Pokazać, że T jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\lambda_n \xrightarrow{n} 0$.

48. Dla funkcji g ciągłej na $[0, 1]$ określamy operator $T : L^p(0, 1) \rightarrow L^p(0, 1)$ przez $(Tf)(x) = g(x)f(x)$. Pokazać, że T jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $g = 0$.
49. Niech $K(x, y)$ będzie funkcją całkowalną z kwadratem na $[0, 1] \times [0, 1]$. Pokazać, że operator T określony na $L^2(0, 1)$ wzorem

$$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy$$

jest ograniczony i zwarty. **Wskazówka:** Wskazać bazę ortonormalną w $L^2([0, 1] \times [0, 1])$ i rozwinąć $K(x, y)$ względem tej bazy.

50. Pokazać, że jeśli $T : X \rightarrow Y$ jest zwartym operatorem liniowym pomiędzy przestrzeniami Banacha X i Y , to T nie może być "na" chyba, że przestrzeń Y ma skończony wymiar.

51. Pokazać, że rodzina zwartych operatorów liniowych z przestrzeni Banacha X w przestrzeń Banacha Y tworzy domkniętą podprzestrzeń liniową w $B(X, Y)$.
52. T jest zwartym operatorem z przestrzeni Banacha X w przestrzeń Banacha Y . Pokazać, że jeśli obraz operatora zwartego $T(X)$ jest przestrzenią nieskończonego wymiaru, to obraz ten nie jest domknięty w Y .
53. Pokazać, że obraz operatora zwartego $T : X \rightarrow Y$ jest przestrzenią ośrodkową. **Wskazówka:** W zupełnej przestrzeni metrycznej podzbiór jest warunkowo zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest całkowicie ograniczony.
54. W przestrzeni ℓ^2 określamy operator T wzorem

$$(Tx)(n) = \begin{cases} 0, & \text{dla } n = 0, \\ \frac{1}{n} x_{n-1}, & \text{dla } n \geq 1. \end{cases}$$

Pokazać, że T jest zwarty. Obliczyć $\|T^n\|$ oraz promień spektralny.

55. Niech a_i, b_i będą elementami przestrzeni $L^2(0, 1)$ dla $i = 1, 2, \dots, n$. Niech $K(x, y) = \sum_{i=1}^n a_i(x)b_i(y)$. Określmy operator T na $L^2(0, 1)$ wzorem

$$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy.$$

Niech $0 \neq \lambda \in \mathbb{C}$. Pokazać, że dla dowolnej ustalonej funkcji $g \in L^2(0, 1)$ równanie $Tf - \lambda f = g$ ma jednoznaczne rozwiązanie $f \in L^2(0, 1)$, albo dla niektórych g równanie ma nieskończenie rozwiązań, a dla pozostałych g , nie ma ich wcale.

56. Niech

$$K(x, y) = \begin{cases} (1-x)y & \text{dla } 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ (1-y)x & \text{dla } 0 \leq x \leq y \leq 1. \end{cases}$$

Określmy operator T na $L^2(0, 1)$ wzorem

$$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy.$$

Pokazać, że wartościami własnymi T są liczby $(n\pi)^{-2}$, $n = 1, 2, \dots$, przy czym odpowiadająca podprzestrzeń własna jest jednowymiarowa. **Wskazówka:** Pokazać, że jeśli funkcja f spełnia $Tf = \lambda f$ dla $\lambda \neq 0$, to f jest klasy C^∞ i spełnia równanie $\lambda f'' + f = 0$ z warunkami $f(0) = f(1) = 0$. Przypadek $\lambda = 0$ rozpatrzeć oddzielnie. Zbadać rozwiązalność względem f równania $Tf - \lambda f = g$ dla $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \pi x$.

*57. Niech A, B będą operatorami ograniczonymi na przestrzeni Hilberta \mathcal{H} oraz $\text{Im } A \subset \text{Im } B$. Pokazać, że jeśli B jest zwarty, to A też jest zwarty.

58. Niech $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ będzie bazą ortonormalną w przestrzeni Hilberta \mathcal{H} . Pokazać, że operator T jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\limsup_n \{\|Tx\| : \|x\| = 1, x \perp e_1, e_2, \dots, e_n\} = 0.$$

59. Pokazać, że jeśli T jest zwartym operatorem w przestrzeni Hilberta, to równanie $Tx = x$ ma niezerowe rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy równanie $T^*x = x$ ma niezerowe rozwiązanie. Pokazać, że obie przestrzenie rozwiązań mają ten sam wymiar.

60. Niech T będzie zwartym operatorem na przestrzeni Hilberta \mathcal{H} . Pokazać, że dla dowolnej niezerowej wartości własnej λ operatora T każda z podprzestrzeni $\ker(\lambda I - T)^n$ ma skończony wymiar, oraz wymiary te są wspólnie ograniczone przez liczbę zależną tylko od λ .

61. Operator $A \geq 0$ jest zwarty. Pokazać, że $A^{1/2}$ też jest zwarty. Pokazać, że jeśli $0 \leq B \leq A$, to również B jest zwarty.

62. $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest bazą ortonormalną w \mathcal{H} . Dla operatora dodatniego $A \in B(\mathcal{H})$ określamy ślad wzorem

$$\text{tr } A = \sum_{n=1}^{\infty} \langle A\varphi_n, \varphi_n \rangle.$$

Pokazać, że $\text{tr } A$ nie zależy od wyboru bazy ortonormalnej. Udowodnić, że

$$(a) \text{tr } (A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B.$$

$$(b) \text{tr } (\lambda A) = \lambda \text{tr } A, \quad \lambda \geq 0.$$

- (c) $\operatorname{tr}(UAU^{-1}) = \operatorname{tr} A$ dla dowolnego operatora unitarnego U .
- (d) Jeśli $0 \leq A \leq B$, to $\operatorname{tr} A \leq \operatorname{tr} B$.
63. Operator $A \in B(\mathcal{H})$ nazywamy operatorem śladowym jeśli $\operatorname{tr}|A| < \infty$. Rodzinę operatorów śladowych oznaczamy symbolem C_1 . Pokazać, że
- (a) Jeśli $A \in C_1$, to $\lambda A \in C_1$.
- (b) Jeśli $A \in C_1$, to $A^* \in C_1$.
- (c) Jeśli $A \in C_1$ i $B \in B(\mathcal{H})$, to $AB \in C_1$ oraz $BA \in C_1$. **Wskazówka:** Wykorzystać zasadę minimaksu.
- (d) Jeśli $A, B \in C_1$, to $A + B \in C_1$. **Wskazówka:** Użyć rozkładu polarnego dla operatorów A, B i $A + B$.
64. Pokazać, że każdy operator śladowy jest zwarty. Wykazać, że operator zwarty A jest śladowy wtedy i tylko wtedy, gdy $\sum \lambda_n < \infty$, gdzie λ_n jest ciągiem liczb singularnych operatora A .
65. Pokazać, że funkcja $\|A\|_1 = \operatorname{tr}|A|$ jest normą na C_1 . Pokazać, że C_1 z normą $\|\cdot\|_1$ jest przestrzenią Banacha.
66. Niech C_2 oznacza rodzinę operatorów Hilberta-Schmidta. Pokazać, że jeśli $A, B \in C_2$, to $AB \in C_1$. Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów Hilberta-Schmidta.
67. Pokazać, że dla $A \in C_1$ i dowolnej bazy ortonormalnej $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \langle A\varphi_n, \varphi_n \rangle$ jest zbieżny i jego suma nie zależy od wyboru bazy. Określmy $\operatorname{tr} A = \sum_{n=1}^{\infty} \langle A\varphi_n, \varphi_n \rangle$. Pokazać, że $\operatorname{tr} AB = \operatorname{tr} BA$, gdzie $A \in C_1$ i $B \in B(\mathcal{H})$ lub $A, B \in C_2$.
68. Pokazać, że jeśli $A \in C_1$, to $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle A\varphi_n, \varphi_n \rangle| < \infty$ dla dowolnej bazy ortonormalnej. Czy prawdziwa jest implikacja odwrotna? Pokazać, że jeśli $\sum_{n=1}^{\infty} \|A\varphi_n\|$ dla pewnej bazy ortonormalnej, to $A \in C_1$.
- *69. P i Q są rzutami ortogonalnymi w przestrzeni Hilberta takimi, że $P - Q$ jest operatorem śladowym. Pokazać, że $\operatorname{tr}(P - Q)$ jest liczbą całkowitą. **Wskazówka:** P i Q są przemiennie z $(P - Q)^2$.

Literatura

- [1] N. I. Akhiezer, I. M. Glazman, *Teoriia lineinykh operatorov v gilbertovom prostranstve I*, Kharkov, Vyscha shkola, 1977-78 (ros.); *Theory of Linear Operators in Hilbert Space*, New York, Dover, 1993 (ang.).
- [2] N. Dunford, J. T. Schwartz, *Linear Operators, Spectral Theory, Self Adjoint Operators in Hilbert Space, Part 2*, New York, Wiley, 1988.
- [3] E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, New York, Wiley 1989.
- [4] M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics: Functional Analysis*, New York, Academic Press 1972.
- [5] R. Szwarz, *Analiza funkcjonalna I*,
<http://www.math.uni.wroc.pl/~szwarz/pdf/anfun2007/analiza-funkcjonalna1.pdf>.