

Szacowania.

Ćwiczenia tydzień 3: zad. 40-75

Kolokwium nr 3, 22.03.2010: materiał z zad. 1-75

41. Udowodnij, że $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$.
42. Udowodnij, że $3 < \pi < 2\sqrt{3}$.
43. Która z liczb jest większa
- a) $2^{1000!}$ czy $999^{999!}$?
- b) 26^{99} czy 10^{151} ?
- c) 26^{99} czy 123^{65} ?
44. Niech $a = \sqrt[16]{2}$. Która z liczb jest większa
 a^{256} czy 256^a ?
45. Uporządkować następujące liczby w kolejności rosnącej
- $$a = (5 - \sqrt{37})^{2008}$$
- $$b = (6 - \sqrt{37})^{2009}$$
- $$c = (7 - \sqrt{73})^{2011}$$
- $$d = (9 - \sqrt{73})^{2013}$$
46. Która z liczb jest większa $2^{2^{2^{1001}}}$ czy $1000^{2^{2^{1000}}}$?

Uwaga: Zgodnie z obowiązującą konwencją, w napisie typu a^{b^c} potęgowanie wykonuje się *od góry*, tzn.

$$a^{b^c} = a^{(b^c)} .$$

47. Która z liczb jest większa $\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{9}{4}}$ czy 6 ?

W rozwiązaniu wolno korzystać z własności potęgowania, wolno wykonywać obliczenia na liczbach naturalnych mniejszych od 100 oraz wolno wykorzystać równości $2^{11} = 2048$ i $3^7 = 2187$.

48. Która z liczb jest większa 45^{13} czy 2^{72} ?

W rozwiązaniu wolno korzystać z własności potęgowania oraz wolno wykonywać obliczenia na liczbach naturalnych mniejszych od 300.

49. Udowodnij, że dla naturalnych $n \geq 4$

$$n^2 \leq 2^n .$$

50. Dla ustalonej liczby naturalnej M wskazać taką liczbę naturalną $n > 1$, że

$$n^M \leq 2^n .$$

Wskazując odpowiednią liczbę całkowitą k udowodnić nierówności $10^k < L < 10^{2k}$.

51. $L = 3972^{257}$ 52. $L = 257^{3972}$ 53. $L = 700!$

54. Dla dodatnich liczb rzeczywistych a oraz b znaleźć ograniczenie dolne wyrażenia

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} .$$

55. Dla dowolnych liczb rzeczywistych a oraz b znaleźć ograniczenie górne wyrażenia

$$\frac{ab}{a^2 + 4b^2} .$$

Wskazując odpowiednie liczby dodatnie C, D udowodnić, że dla dowolnej liczby naturalnej n zachodzą nierówności $C < W(n) < D$.

56. $W(n) = \frac{n^4 + 16n + 3}{2n^4 + 7n^2}$ 57. $W(n) = \frac{13n^2 - 10n + 3}{2n^2 + 7n - 1}$ 58. $W(n) = \frac{\sqrt{n+7} + 3}{\sqrt{n+3} + 7}$

59. $W(n) = \frac{n}{n^2 - 3n + 1}$ 60. $W(n) = \sqrt{n^2 + n} - n$ 61. $W(n) = \sqrt[3]{n^3 + n^2} - n$

Wskazując odpowiednie liczby dodatnie C, D oraz liczbę rzeczywistą k udowodnić, że dla dowolnej liczby naturalnej n zachodzą nierówności

$$C \cdot n^k < W(n) < D \cdot n^k .$$

62. $W(n) = \frac{n^7 + 10n^3 + 3}{n^4 + 37}$ 63. $W(n) = \frac{5n^8 - n^4 + 3}{5n^{10} - 4}$ 64. $W(n) = \frac{n^6 + 2n^4 + 1}{\sqrt{n} + 2}$

65. $W(n) = \frac{n^3 + 2n^2 + 1}{\sqrt{n^6 + 2} + 2}$ 66. $W(n) = \frac{2n^3 - n^2 + 1}{\sqrt[3]{n^2 + 1} + 1}$ 67. $W(n) = \frac{\sqrt[5]{n^2 + 1}}{\sqrt[7]{n^3 + 1} + 1}$

Wskazując odpowiednią liczbę dodatnią C udowodnić, że dla dowolnej liczby naturalnej n zachodzą nierówności

$$1 - \frac{C}{n} < W(n) < 1 + \frac{C}{n} .$$

68. $W(n) = \frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 7n + 2}$ 69. $W(n) = \frac{3n^2 - 2n + 3}{3n^2 + 7n - 2}$ 70. $W(n) = \frac{\sqrt{4n^2 + 1}}{2n + 1}$

Wskazując odpowiednie liczby dodatnie C, g udowodnić, że dla dowolnej liczby naturalnej n zachodzą nierówności

$$g - \frac{C}{n} < W(n) < g + \frac{C}{n} .$$

71. $W(n) = \frac{2n^2 + 2n + 3}{3n^2 + 7n + 2}$ 72. $W(n) = \frac{4n^2 - 2n + 3}{2n^2 + 7n - 2}$ 73. $W(n) = \frac{\sqrt{4n^2 + 1}}{3n + 1}$

74. $W(n) = \sqrt{n^2 + n} - n$ 75. $W(n) = \sqrt[3]{n^3 + n^2} - n$