

ANALIZA MATEMATYCZNA 3. NO...TKI Z WYKŁADU 8A


PRZYKŁAD. (wprowadzający) Niech $F(x, y) = (x^2 + (y - \sqrt{3})^2 - 1) \cdot (|x| - 1)^2 + y^2 - 1$.

Rozwiązaniem równania $F(x, y) = 0$ jest zbiór Z będący sumą trzech okręgów (p.rys.).

Popatrzmy na punkty $p \in Z$ i ich dostatecznie małe otoczenia U_p .

Są cztery rodzaje takich punktów:

- punkty p , dla których $U_p \cap Z$ jest wykresem funkcji $y = y(x)$ i funkcji $x = x(y)$;
- ♣ punkty p , dla których $U_p \cap Z$ jest wykresem funkcji $y = y(x)$ i nie jest wykresem funkcji $x = x(y)$;
- ◇ punkty p , dla których $U_p \cap Z$ jest wykresem funkcji $x = x(y)$ i nie jest wykresem funkcji $y = y(x)$;
- ♡ punkty p , dla których $U_p \cap Z$ nie jest wykresem funkcji ani $y = y(x)$, ani $x = x(y)$.



Zaznacz na rysunku punkty typu ♣, ◇, ♡.

Powyższe jest łatwe, bo znamy pełne rozwiązanie owego równania. Poniższe twierdzenie pozwoli (nieco) zbadać szczególne rozwiązania skomplikowanych równań.

Na przykład pozwoli rozstrzygnąć, jakiego rodzaju (w powyższym sensie) jest punkt $(1, 2)$, będący jednym z rozwiązań równania $x^5y + x^3y^6 - 66 = 0$.

TWIERDZENIE 1. (o istnieniu funkcji uwikłanej)

Niech $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ będzie klasy \mathcal{C}^1 w otoczeniu punktu $p_0 \in D \subset \mathbb{R}^2$ i niech $F(p_0) = 0$.

Jeśli $F'_y(p_0) \neq 0$, to:

istnieje otoczenie $(a, b) \times (c, d) \subset D$ punktu p_0 i funkcja $\varphi : (a, b) \rightarrow (c, d)$ taka, że

$$(*) \quad F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x), \text{ dla wszystkich } (x, y) \in (a, b) \times (c, d).$$

Ponadto $\varphi'(x) = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$ dla wszystkich $x \in (a, b)$, $y = \varphi(x)$.

Gdy założymy, że $F \in \mathcal{C}^2$, to $\varphi''(x) = -\frac{F''_{xx} \cdot (F'_y)^2 - 2F''_{xy} \cdot F'_x \cdot F'_y + F''_{yy} \cdot (F'_x)^2}{(F'_y)^3}$,

gdzie pochodne po prawej są w punkcie (x, y) , gdzie $y = \varphi(x)$.

WNIOSEK. Przy założeniach jak w twierdzeniu i $F \in \mathcal{C}^2$.

Jeśli $F'_x(x, y) = 0$ (czyli $\varphi'(x) = 0$), to $\varphi''(x) = -\frac{F''_{xx}(x, y)}{F'_y(x, y)}$, gdzie $y = \varphi(x)$.

DOWÓD. (tu tylko części 'ponadto')

Z (*) wynika tożsamość $F(x, \varphi(x)) = 0$, dla wszystkich $x \in (a, b)$, którą różniczkujemy stronami po x (i korzystamy z reguły łańcucha):

$$F'_x(x, \varphi(x)) + F'_y(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0,$$

skąd otrzymujemy pierwszą część 'ponadto': $\varphi'(x) = -\frac{F'_x(x, \varphi(x))}{F'_y(x, \varphi(x))}$.

Gdy $F \in \mathcal{C}^2$, otrzymaną tożsamość $\varphi' = -\frac{F'_x}{F'_y}$ (piszemy już bez argumentów, by skrócić zapis) jeszcze raz różniczkujemy stronami po x (pamiętając o regule łańcucha):

$$\varphi'' = -\frac{(F''_{xx} + F''_{xy} \cdot \varphi') \cdot F'_y - F'_x \cdot (F''_{yx} + F''_{yy} \cdot \varphi'(x))}{(F'_y)^2}.$$

Uwzględniając, że $\varphi' = -F'_x/F'_y$ i porządkując dostajemy finalnie

$$\varphi''(x) = -\frac{F''_{xx} \cdot (F'_y)^2 - 2F''_{xy} \cdot F'_x \cdot F'_y + F''_{yy} \cdot (F'_x)^2}{(F'_y)^3},$$

gdzie pochodne po prawej są liczone w punkcie $(x, \varphi(x))$. □

UWAGI.

Twierdzenie NIC nie mówi, jak znaleźć p_0 , pewne rozwiązanie równania $F(p) = 0$. Trzeba je np. zgadnąć lub obliczyć jakimiś sprytnymi metodami.

Twierdzenie 'NIECO' mówi, jak 'wyglądają' inne rozwiązania w pobliżu pewnego rozwiązania p_0 , ('w pobliżu' tzn. w pewnym 'małym' prostokącie zawierającym p_0).

Problem z terminologią:

- . . .
- . . .


1. Jak wygląda rozwiązanie równania $x^3y^6+x^4y^2 = 20+x^2y^4$ w pobliżu punktu $(2,1)$?

Dla $F(x, y) = x^3y^6+x^4y^2-20-x^2y^4$ i $p_0 = (2,1)$ równanie jest tożsame z $F(x, y) = 0$.

Mamy $F'_y = 6x^3y^5 + 2x^4y - 4x^2y^3$ i $F'_y(2, 1) = 64 \neq 0$, więc w pewnym otoczeniu p_0 rozwiązanie jest wykresem (jakiejś) funkcji $y = y(x)$, o której można powiedzieć, że:

- maleje w pobliżu p_0 , bo $F'_x = 3x^2y^6 + 4x^3y^2 - 2xy^4$ i $F'_x(2, 1) = 40$, więc owa funkcja ma pochodną $y'(2) = -\frac{40}{64} = -\frac{5}{8} < 0$ i, z ciągłości, jest też ujemna w pobliżu,
- ma styczną o równaniu $y = -\frac{5}{8} \cdot (x - 2) + 1$,
- jest wypukła (skąd leży powyżej tej stycznej) w pobliżu, bo $y''(2) = \dots = \frac{9}{128} > 0$.

Podobnie można zbadać rozwiązanie tego równania w pobliżu punktu $(\sqrt[9]{20}, \sqrt[9]{20})$. (Nie ma ogólnego sposobu znajdowania takich punktów, trzeba je jakoś odgadnąć.)




2. Gdzie rozwiązanie równania $x^3+y^3=2xy$ ma poziomą styczną (równoległą do OX)?

Na pewno tam, gdzie (dla $F(x, y) = x^3 + y^3 - 2xy$):

$$\begin{cases} -\frac{F'_x}{F'_y} = 0 \\ F'_y \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \\ \dots \\ \dots \end{cases}$$

Z powyższego nie wiadomo, co z $(0, 0)$.



UWAGA. Powyżej widać linię $x^3+y^3=2xy$. Podobny kształt ma linia $x^3+y^3=3xy$. Linia $x^3+y^3=3xy+48$ nie ma 'samoprzecięć'. Warto ją zbadać w punktach: $p_0 = (-4, 4)$, $p_1 = (2, 4)$, $p_2 = (-\sqrt[3]{6}, (-\sqrt[3]{6})^2)$. Jeszcze ciekawiej wyglądają linie $x^3+y^3=3xy+p$, przy $p \in [-1, 0]$.

3. Znaleźć ekstrema lalne funkcji uwikłanej $x^2y^2 + y^4 = 5 + x^4$.

Dla $F(x, y) = x^2y^2 + y^4 - 5 - x^4$ mamy $F'_x = 2xy^2 - 4x^3$, $F'_y = y(2x^2 + 4y^2)$, $F''_{xx} = 2y^2 - 12x^2$.

Punkty, w krytyczne (podejrzane) spełniają układ:

$$\begin{cases} -\frac{F'_x}{F'_y} = 0 \\ F'_y \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \\ \dots \\ \dots \end{cases}$$

Badając znak drugiej pochodnej $= -\frac{F''_{xx}}{F'_y}$ funkcji uwikłanej rozstrzygamy jakie ekstreum lokalne ma f. uwikłana w poszczególnych punktach krytycznych:

- w $(0, \sqrt[4]{5})$ jest maksimum lokalne f. uwikłanej, (bo $-\frac{2(\sqrt[4]{5})^2-0}{\sqrt[4]{5}(0+4(\sqrt[4]{5})^2)} = -\frac{\geq 0}{> 0} < 0$)
- w $(0, -\sqrt[4]{5})$ jest minimum lokalne f. uwikłanej, (bo $-\frac{2(-\sqrt[4]{5})^2-0}{-\sqrt[4]{5}(0+4(-\sqrt[4]{5})^2)} = -\frac{\geq 0}{< 0} > 0$)
- w $(1, \sqrt{2})$ jest
- w $(1, -\sqrt{2})$ jest
- w
- w

